

Handwritten signature or mark, possibly reading "S. H. H." or similar, with a stylized flourish extending to the right.

فهرسك

تأليف

محمّد عوض محمّد

أستاذ الجغرافيا بمعهد الدراسات السودانية

بجامعة فؤاد الأول

الطبعة الثالثة

١٩٥٢

القاهرة

طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر

5212
A82CM

کتابخانه مسجد کائنات

تِلْكَ نَارُ

سُورَةُ

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ

(قرآن کریم)

مکتبہ اسلامیہ

۲۰۶۱

قرآن

کتابخانه مسجد کائنات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الإيمان

ليس موضوع هذا الكتاب بطريف ولا جديد . فكل سالك في هذا الوادى قد تلقى درسه الأول في الجغرافيا بمراقبة هذا النهر ، حين يفيض وحين يفيض . وقد يما تعلم أجدادنا بمراقبته عدد السنين والحساب ... فهو الدرس الذى يتلقاه كل مصرى . أى أو غير أى ، عن عمد أو غير عمد ، سواء أتعلّمه على ضفة النهر ، أم فى المزرعة والحقل ، أم فى حجرة الدراسة بين الخرائط والأشجار . وليس فى العالم كله نهر ، له من الفضل على قطر كبير وساكنيه ، ما لنهر النيل من الفضل على مصر وساكنيه مصر ... بل إن للنيل لفضلا على العالم كله ، الذى تعلم أبناؤه من وادى النيل مبادئ الحضارة والعمران ، يوم لم يكن حضارة ولا عمران ، إلا ما نشأ ونما فى هذا الوادى الخصيب .

فبديهي إذن أن ليس فى ميدان الجغرافيا التفسير موضوع — مهما ألقناه ودرسناه — أحق بأن يتناوله المصرى بالبحث والدرس ، من موضوع نهر النيل . وليس بالمؤلف حاجة لأن يعتذر لقرائه ، حين يفصل لهم الحديث عن هذا النهر .

وفى هذا الكتاب بحوث شتى فى الجغرافيا الطبيعية لنهر النيل والأقطار التى تحف بمجرهه ، وفى نهاية الكتاب بحث فى مشروعات الرى . وهو موضوع قد يكون خارجا عن اختصاص الجغرافى . على أن المؤلف عذراً ، إذا طرق هذا الموضوع ، أنه أمس بحياة المصريين ورخاء مصر من أى موضوع آخر . وأجدر بأن يعنى به كل من يتناول هذا النهر بالوصف والشرح .

والمؤلف يحس من نفسه قصوراً عن أن يفي هذه الأبحاث جميعاً حقها . ومن

أسباب هذا القصور أنه لم تنجح له فرصة للسياحة في وادى النيل كله . وقد حاول معالجة هذا القصور بمطالعة كل ما استطاع الوصول إليه مما كتب عن نهر النيل . وعن الأقطار التي يمر فيها . وقد اضطر بالطبع لأن يلجأ إلى المراجع الإفرنجية ، ولأن ينقل عنها أسماء مواضع صغيرة . وإذا يكون هنالك شك في صحة كتابة بعض الأسماء ، فقد رأى أن يورد الأسماء بالحروف اللاتينية أيضا .

وهنالك أسماء كثيرة قد ألفنا كتابتها بشكل خاص . فقد اعتدنا مثلا أن نسمى البحيرة التي ينبع منها النيل الأزرق بحيرة تسانا ، واسمها الحقيقي بحيرة طانا . وهكذا تدعى في جميع الكتب والخرائط ، اللهم إلا في المراجع الإنكليزية القديمة التي نقلنا عنها . وكذلك نجد بلدة مثل منجلا تكتب مرة بالقاف وأخرى بالعين . . . وستبقى هذه الفوضى إلى أن يتفق المشتغلون بالجغرافيا في مصر على وسيلة لضبط هذه الأسماء . والمؤلف يرجو ممن يلاحظ مثل هذه المفوات هنا أن ينبه إليها .

وسيجد القارئ إشارات بالهامش إلى مراجع مختلفة . أكثرها مراجع أوروبية . وقد يكتب اسم المرجع بلغته الأصلية أو ترجمته بالعربية إذا كان الكتاب مشهورا معروفا ككتاب الرى في مصر لولكوكس وكريمج أو كتاب نهر النيل لليونز . وكذلك ربما ورد ذكر أسماء بعض المجلات العلمية بالاختصار . وأهم هذه الاختصارات :

Ann. de J.	: Annales de Géographie
G. J.	: Geographical Journal.
P. M.	: Petermanns Mitteilungen.
C. S. J.	: Cairo Scientific Journal.
Z. d. G. f. Erd.	: Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde
Q. J. G. S.	: Quarterly Journal, of the Geological Society

وهنالك اختصارات أخرى ظاهرة لا تحتاج لأن ينص عليها .

الطبعة الثانية

في هذه الطبعة فصول جديدة أضيفت إلى ما سبق نشره ، كما أن كثيراً من الفصول القديمة قد أعيدت كتابتها من جديد ، وقد حاول المؤلف — بعد أن أتاحت له زيارة أعالي النيل في عام ١٩٣٩ — أن يصحح كثيراً من الأسماء الواردة في الكتاب . وهو يتميز هذه الفرصة لكي يتقدم بحزيل الشكر إلى كثير من المشتغلين بشئون نهر النيل ، وما أبدوه له من المقترحات المفيدة . ويرجو أن يلقى منهم دائماً ما يجودون به من الآراء والإرشادات .

القاهرة في مايو سنة ١٩٤٨ م . ع . م .

الطبعة الثالثة

تتضمن هذه الطبعة على طائفة من التعديلات والإضافات ، ولكنها فيما عدا ذلك لا تختلف في جوهرها عن الطبعة السابقة .

القاهرة في ١٥ نوفمبر ١٩٥٢ م . ع . م .

الفهرس

صفحة	
٣	المقدمة : تمهيد تاريخي عن تدرج علمنا بنهر النيل
٢٣	الفصل الثاني : حوض النيل : تمهيد جغرافي عام
٣٦	الفصل الثالث : منابع النيل الاستوائية
٦١	الفصل الرابع : أعلى النيل : بحر الجبل ، بحر الزراف ، بحر الغزال
٨٢	الفصل الخامس : السواط والنيل الأبيض
١٠٩٤	الفصل السادس : هضبة الحبشة وأنهارها
١١٤	الفصل السابع : النيل بين الخرطوم والبحر المتوسط
١٤١	الفصل الثامن : تطور نهر النيل
١٩٩	الفصل التاسع : مناخ وادي النيل
٢٦٣	الفصل العاشر : الأقاليم النباتية
٢٧٧ ...	الفصل الحادي عشر : الأحوال المائية (الأيدروlogية) لنهر النيل
٢٩٩	الفصل الثاني عشر : مشروعات الري
٣٣٧	ملحق : اتفاقية ٧ مايو سنة ١٩٢٩

Ann. de J. : Annales de Géographie
 O. J. : Geographical Journal
 P. M. : Petermanns Mitteilungen
 C. S. J. : Cairo Scientific Journal
 Z. d. G. u. Erd. : Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde
 Q. J. O. S. : Quarterly Journal of the Geological Society

وهذا الفصل آخر قائمة لا تسجل لأن بعض عليها

فهرس الخرائط والرسوم الإيضاحية

رقم الشكل	صفحة
١	نهر النيل كما تصوره بطليموس الجغرافى ... ١٢
٢	منابع النيل الاستوائية ... ٣٨
٣	مخرج النيل من بحيرة فكتوريا ... ٤٥
٤	الطرف الشمالى لمضبة البحيرات ... ٤٧
٥	منظر عام لجبال مفمبيرو ... ٥٦
٦	الأخدود الألبرتى وعلاقته بنهر النيل ... ٦٦
٧	إقليم السدود ... ٧١
٨	بحر الجبل فى منطقة المستنقعات ... ٧٣
٩	اتصال بحر الزراف والجبل ... ٧٥
١٠	نهر السوبات والجبل ... ٨٤
١١	منابع النيل الحبشية ... ١٠٠
١٢	منبع نهر الآبى ... ١٠٤
١٣	قطاع مستعرض لنهر الآبى ... ١٠٦
١٤	التقاء النيل الأبيض والأزرق ... ١٠٩
١٥ و ١٦	خانق سبلوقة ... ١١٨
١٧	جزيرة مقرات (مجلات) ... ١٢١
١٨	الشلال الأول ... ١٢٦
١٩	خريطة جيولوجية للقطر المصرى ... ١٢٨
٢١	وادى النيل من ديروط إلى بنى سويف ... ١٣٠
٢١	الدوامات المائية ... ١٣٢

رقم الشكل	صفحة
٢٢	خريطة لجنوب الدلتا ... ١٣٤
٢٣	قطاع للمقطم ... ١٣٨
٢٤	قطاع لنهر النيل (عن إدورد هل) ... ١٤٦
٢٥	» » » (عن جون بول) ... ١٥١
٢٦	الحوض الأخدودى فى كينيا ... ١٦١
٢٧	» » فى جنوب الحبشة ... ١٦٢
٢٨	النيل اللبى القديم ... ١٦٨
٢٩	تطور النيل فى بلاد النوبة كما توهمه أرلت ... ١٧٥
٣٠	بحيرة السد كما صورها (بول) ... ١٨٦
٣١	خريطة كنتورية للدلتا ... ١٨٩
٣٢	بعض الفروع القديمة للدلتا ... ١٩١
٣٣	توزيع الضغط الجوى ... ٢٠٤
٣٤	توزيع درجات الحرارة ... ٢٠٦
٣٥	توزيع المطر ... ٢١٠
٣٦	رسوم بيانية للمطر ... ٢١٣
٣٧	رسم بيانى يوضح ظاهرة تدهور النظام المدارى ... ٢١٥
٣٨	مقارنة الحرارة فى الخرطوم والقاهرة ... ٢٢٠
٣٩	خريطة توزيع التربة فى السودان ... ٢٢٦
٤٠	خريطة توضح مشروع خزان ألبرت ... ٣٣٣

٨٦١ ... ٨٦٢ ... ٨٦٣ ... ٨٦٤ ... ٨٦٥ ... ٨٦٦ ... ٨٦٧ ... ٨٦٨ ... ٨٦٩ ... ٨٧٠ ... ٨٧١ ... ٨٧٢ ... ٨٧٣ ... ٨٧٤ ... ٨٧٥ ... ٨٧٦ ... ٨٧٧ ... ٨٧٨ ... ٨٧٩ ... ٨٨٠ ... ٨٨١ ... ٨٨٢ ... ٨٨٣ ... ٨٨٤ ... ٨٨٥ ... ٨٨٦ ... ٨٨٧ ... ٨٨٨ ... ٨٨٩ ... ٨٩٠ ... ٨٩١ ... ٨٩٢ ... ٨٩٣ ... ٨٩٤ ... ٨٩٥ ... ٨٩٦ ... ٨٩٧ ... ٨٩٨ ... ٨٩٩ ... ٩٠٠ ... ٩٠١ ... ٩٠٢ ... ٩٠٣ ... ٩٠٤ ... ٩٠٥ ... ٩٠٦ ... ٩٠٧ ... ٩٠٨ ... ٩٠٩ ... ٩١٠ ... ٩١١ ... ٩١٢ ... ٩١٣ ... ٩١٤ ... ٩١٥ ... ٩١٦ ... ٩١٧ ... ٩١٨ ... ٩١٩ ... ٩٢٠ ... ٩٢١ ... ٩٢٢ ... ٩٢٣ ... ٩٢٤ ... ٩٢٥ ... ٩٢٦ ... ٩٢٧ ... ٩٢٨ ... ٩٢٩ ... ٩٣٠ ... ٩٣١ ... ٩٣٢ ... ٩٣٣ ... ٩٣٤ ... ٩٣٥ ... ٩٣٦ ... ٩٣٧ ... ٩٣٨ ... ٩٣٩ ... ٩٤٠ ... ٩٤١ ... ٩٤٢ ... ٩٤٣ ... ٩٤٤ ... ٩٤٥ ... ٩٤٦ ... ٩٤٧ ... ٩٤٨ ... ٩٤٩ ... ٩٥٠ ... ٩٥١ ... ٩٥٢ ... ٩٥٣ ... ٩٥٤ ... ٩٥٥ ... ٩٥٦ ... ٩٥٧ ... ٩٥٨ ... ٩٥٩ ... ٩٦٠ ... ٩٦١ ... ٩٦٢ ... ٩٦٣ ... ٩٦٤ ... ٩٦٥ ... ٩٦٦ ... ٩٦٧ ... ٩٦٨ ... ٩٦٩ ... ٩٧٠ ... ٩٧١ ... ٩٧٢ ... ٩٧٣ ... ٩٧٤ ... ٩٧٥ ... ٩٧٦ ... ٩٧٧ ... ٩٧٨ ... ٩٧٩ ... ٩٨٠ ... ٩٨١ ... ٩٨٢ ... ٩٨٣ ... ٩٨٤ ... ٩٨٥ ... ٩٨٦ ... ٩٨٧ ... ٩٨٨ ... ٩٨٩ ... ٩٩٠ ... ٩٩١ ... ٩٩٢ ... ٩٩٣ ... ٩٩٤ ... ٩٩٥ ... ٩٩٦ ... ٩٩٧ ... ٩٩٨ ... ٩٩٩ ... ١٠٠٠

١٧ ... ١٨ ... ١٩ ... ٢٠ ... ٢١ ... ٢٢ ... ٢٣ ... ٢٤ ... ٢٥ ... ٢٦ ... ٢٧ ... ٢٨ ... ٢٩ ... ٣٠ ... ٣١ ... ٣٢ ... ٣٣ ... ٣٤ ... ٣٥ ... ٣٦ ... ٣٧ ... ٣٨ ... ٣٩ ... ٤٠ ... ٤١ ... ٤٢ ... ٤٣ ... ٤٤ ... ٤٥ ... ٤٦ ... ٤٧ ... ٤٨ ... ٤٩ ... ٥٠ ... ٥١ ... ٥٢ ... ٥٣ ... ٥٤ ... ٥٥ ... ٥٦ ... ٥٧ ... ٥٨ ... ٥٩ ... ٦٠ ... ٦١ ... ٦٢ ... ٦٣ ... ٦٤ ... ٦٥ ... ٦٦ ... ٦٧ ... ٦٨ ... ٦٩ ... ٧٠ ... ٧١ ... ٧٢ ... ٧٣ ... ٧٤ ... ٧٥ ... ٧٦ ... ٧٧ ... ٧٨ ... ٧٩ ... ٨٠ ... ٨١ ... ٨٢ ... ٨٣ ... ٨٤ ... ٨٥ ... ٨٦ ... ٨٧ ... ٨٨ ... ٨٩ ... ٩٠ ... ٩١ ... ٩٢ ... ٩٣ ... ٩٤ ... ٩٥ ... ٩٦ ... ٩٧ ... ٩٨ ... ٩٩ ... ١٠٠

١٧ ... ١٨ ... ١٩ ... ٢٠ ... ٢١ ... ٢٢ ... ٢٣ ... ٢٤ ... ٢٥ ... ٢٦ ... ٢٧ ... ٢٨ ... ٢٩ ... ٣٠ ... ٣١ ... ٣٢ ... ٣٣ ... ٣٤ ... ٣٥ ... ٣٦ ... ٣٧ ... ٣٨ ... ٣٩ ... ٤٠ ... ٤١ ... ٤٢ ... ٤٣ ... ٤٤ ... ٤٥ ... ٤٦ ... ٤٧ ... ٤٨ ... ٤٩ ... ٥٠ ... ٥١ ... ٥٢ ... ٥٣ ... ٥٤ ... ٥٥ ... ٥٦ ... ٥٧ ... ٥٨ ... ٥٩ ... ٦٠ ... ٦١ ... ٦٢ ... ٦٣ ... ٦٤ ... ٦٥ ... ٦٦ ... ٦٧ ... ٦٨ ... ٦٩ ... ٧٠ ... ٧١ ... ٧٢ ... ٧٣ ... ٧٤ ... ٧٥ ... ٧٦ ... ٧٧ ... ٧٨ ... ٧٩ ... ٨٠ ... ٨١ ... ٨٢ ... ٨٣ ... ٨٤ ... ٨٥ ... ٨٦ ... ٨٧ ... ٨٨ ... ٨٩ ... ٩٠ ... ٩١ ... ٩٢ ... ٩٣ ... ٩٤ ... ٩٥ ... ٩٦ ... ٩٧ ... ٩٨ ... ٩٩ ... ١٠٠

الفصل الأول

المقدمة

تمهيد تاريخي عن تدرج علمنا بجغرافية النيل

في جميع العصور منذ بدء التاريخ حتى المتكروون بأمر النيل ووصفه ومحاولة
تفسير ظواهره المختلفة. ذلك لأن حضارة من أقدم الحضارات وأرقاها نشأت في
أدنى وادي النيل ونمت وازدهرت. وكانت يتبوءا امتدت منه أم كثيرة
حضارتها ووقتها.

نهر النيل

وكان ظاهراً لجميع سكان مصر وروما أن النيل الذي ترتب عليه جميع ما لمصر من الثروة والرخاء،
فكان من الطبيعي أن يفكر المصريون وغيرهم في أمر النيل وفي مصدر ذلك
التضخم الذي يعم الرادي كل عام بانتظام تام. وكان طبعياً أن ينشأ حق في
فلك العهد البعيد تلك المسألة الجغرافية المشهورة «مسألة النيل» أو «سر النيل»
ذلك السر الذي لم يتم حله إلا في عصرنا هذا، وقد شغل للتفكيرين منذ ستة آلاف
من السنين.

فاما المصريون الأول فقد كانوا في بدء أمرهم — أي في العصر الليتورجي
قبل الأسرة الأولى — لا يعرفون عن مجرى النيل فيما وراء الشلال الأول شيئاً
كثيراً، كانت دنيام التي أنبأها وعرفوها منحصرة في ذلك الوادي الخصيب
الذي كانوا يعيشون فيه، تحده الصحراء من جهتيه والبحر من شماله والجنادل من
جنوبه، وكانوا يجهلون أن هناك بحراً في أسفل الأرض متصلاً بالنيل عند جنادله

الفصل الأول

المقدمة

تمهيد تاريخي عن تدرج علمنا بجغرافية النيل

في جميع العصور منذ بدء التاريخ عنى المفكرون بأمر النيل ووصفه ومحاولة تفسير ظاهراته المختلفة . ذلك لأن حضارة من أقدم الحضارات وأرقاها نشأت في أدنى وادى النيل ونمت وازدهرت . وكانت ينبوعا استمدت منه أم كثيرة حضارتها ورقيا .

وكان ظاهراً لجميع سكان مصر ولغيرهم ممن خالطوهم واتصلوا بهم أن حضارة مصر مصدرها الأكبر هو النيل الذى ترتب عليه جميع ما لمصر من الثروة والرخاء . فكان من الطبيعي أن يفكر المصريون وغيرهم في أمر النيل وفي مصدر ذلك الفيضانات الذى يعم الوادى كل عام بانتظام تام . وكان طبيعياً أن ينشأ حتى في ذلك العهد البعيد تلك المسألة الجغرافية المشهورة : « مسألة النيل » أو « سر النيل » ، ذلك السر الذى لم يتم حله إلا في عصرنا هذا ، وقد شغل المفكرين منذ ستة آلاف من السنين .

فأما المصريون الأول فقد كانوا في بدء أمرهم — أى في العصر الميثولوجي قبل الأسرة الأولى — لا يعرفون عن مجرى النيل فيما وراء الشلال الأول شيئاً كثيراً . كانت دنياهم التى ألفوها وعرفوها منحصرة في ذلك الوادى الخصيب الذى كانوا يعيشون فيه ، تحده الصحراء من جانبيه والبحر من شماله والجنادل من جنوبه ، وكانوا يتوهمون أن هناك بحراً في أسفل الأرض متصلاً بالنيل عند جنادله

الجنوبية من جهة وعند البحر من جهة أخرى . وهذا البحر « المحيط » هو الذى تغيب فيه الشمس والكواكب مساء ثم تسبح فيه ليلا وتعود فتظهر منه فى الصباح (١) .

(١) بهذه المناسبة نذكر قطعة من تلك الأنشودة الدينية الجميلة التى ألفها اخناتون والتى ذكر فيها النيل بأنه نهر أرضى يخرج من باطن الأرض .
وهذه هى القطعة مترجمة عن برستد (تاريخ مصر ص ٣٧٤) — والخطاب لآتون الإله الأعظم :
أنت خلقت النيل فى العالم الأرضى .
وأنت تخرجه بأمرك فتحفظ به الناس .
يا إله الجميع ، حين يتسرب إليهم الضعف .
يارب كل منزل ، أنت تشرق من أجلهم .
يا شمس النهار ، يا من تخشاه البلاد القاصية .
أنت موجد حياتهم .
أنت الذى خلقت فى السماء نيلا .
لكى ينزل عليهم ولهم .
يتساقط الفيضان على الجبال كالبحر الزاخر .
فيسقى مزارعهم وسط ديارهم .
ما أبدع تدابيرك يا إله الأبدية .
فى السماء نيل للأمم الغربية .
ولماشية البلاد الأخرى ودواها .
ولكل ما يعشى على رجلين .
أما النيل الذى يروى مصر فإنه يجىء من باطن الأرض .
وفى هذه القصيدة عدا جلالها الشعرى — مقارنة جميلة بين البلاد القاصية التى تروىها الأمطار من السماء — وبين مصر التى يروىها نهر يجرى فى الأرض .
ومن المفيد أن نورد هنا قصيدة أخرى فى تمجيد النيل ترجع إلى القرن التاسع عشر قبل الميلاد ، نقبس منها الجزء الآتى :
حمدا لك أيها النيل ! الذى يتفجر من باطن الأرض ؛ ثم يجرى ليقضى مصر فهو الذى يسقى المروج ، وقد خلقه رع لى يطعم كل دابة وماشية .
ويرسل الماء إلى الجهات البعيدة ، فيروى مجديها ، ويطغى ظمأها .
إله الزراعة (كاب) يحبه ، وإله الصناعة (فتاح) معجب به .
فلولاه ما ازدهرت الزراعة ولا الصناعة .
ولولاه ما حصد القمح والشعير وامتلاّت بهما الخزائن ،
وأقامت الهياكل حفلات الشكر على الغلة الوفيرة والخير العميم .
والويل للأرض ومن عليها حين يقل مأؤه . ويجىء فيضانه شحيهاً قليلا .
هنالك تهلك النفوس وينادى الجميع بالويل والثبور .
حتى إذا ارتفع وفاض ، انتشر الفرح والابتهاج فى كل مكان .

مثل هذه الفكرة لا بد أن نشأت بين قوم لم يعرفوا عن أعلى النيل شيئاً .
فهى ولا شك ترجع إلى ما قبل التاريخ وما قبل عهد مينيس بقرون عديدة جداً .
ولكنها أقدمها ولمزلتها فى الميثولوجيا المصرية قد اكتسبت شيئاً من الحرمة
الدينية فتداولتها الألسنة وبقيت آثارها حتى فى الأعصر التاريخية ، أى بعد أن علم
المصريون عن أعلى النيل الشيء الكثير^(١) .

وفكرة البحر المحيط بالأرض التى منشؤها الميثولوجيا المصرية هى بعينها
الفكرة التى انتقلت إلى اليونان الذين سمو المحيط بالأوقيانوس^(٢) ولم تزل هذه
الكلمة مستعملة إلى يومنا وإن يكن استعمالها فى غير معناها الأول .

على أن جهل المصريين القدماء بأعلى النيل لم يدم طويلاً . بل سرعان
ما اتسع أفقهم واتصلوا بشعوب وبلاد أخرى تقطن وادى النيل . وقد رأى ملوك
مصر حتى فى الأسرة الأولى أن بعض الأقوام التى تسكن جنوب الشلال كانت
تعتدى أحياناً على حدود مصر فاتخذوا التدابير اللازمة لردم . حتى جاء زوسر
واصفروا فأرسلوا البعثات الحربية لإخضاع البلاد التى ندعوها اليوم بلاد النوبة .

ضحك الجميع حتى بدت أسنانهم .
هو الذى أنبت الشجر فى كل بقعة ، ووفر الأخشاب لبناء السفن
ولولاه ما كانت الجوارى تشق عباب اليم .
فواجبا له من ملك عظيم ! ولكنه ملك لا يجي إتاوة
ولا يفرض ضريبة ... صادق الوعد ، وفى بالعهد .
يحيى خيره كل عام باطراد وانتظام إلى مصر العليا ومصر السفلى .
يسبقه على الغنى والفقير ، والقوى والضعيف من غير تمييز أو محاباة .
إن الخير الذى يجلبه أجل نفعاً من الذهب والفضة . وأعلى قدراً من الجواهر .
إن الناس لن تأكل الذهب وإن كان صرفاً ،
ولن تتغذى بالجواهر ، وإن كان حراً نقياً .

(١) راجع برستد تاريخ مصر الفصل الرابع (ص ٥٤ وما بعدها) وراجع أيضاً الخريطة
الأولى فى أطلس سمو الأمير يوسف كمال .

(٢) برستد ص ٥٦ .

وليس هذا بمقام سرد فتوحات المصريين القدماء ، وإنما يهمنا أن نعرف مبلغ علمهم بأعلى النيل ، وبالبلاذ الواقعة جنوب حدود مصر الأولى . ويصعب جداً أن نذكر بشيء من الدقة جميع الأقطار التي اتصل بها المصريون والتي كان لهم بها علم . غير أننا نعرف أنهم كان لهم اتصال وثيق بثلاثة أقطار هامة في جنوب مصر . وهذه هي :

أولاً : البلاد التي جنوب مصر مباشرة والتي صارت فيما بعد جزءاً من مصر وكانوا يدعونها بلاد كوش ، وهذه أخضعها المصريون لسلطانهم في عهد الأسرة الثالثة . وإنا وإن كنا لا نعلم تماماً حدود كوش غير أننا لا نكون بعيدين عن الصواب إذا قلنا إن المصريين كانوا يطلقون هذا الاسم على جميع البلاد الخاضعة لهم الواقعة جنوب مصر مباشرة . وأن درجة اتساعها كانت تختلف من عصر إلى عصر فتتكشف في وقت الضعف وتكبر في عهد القوة .

ثانياً : بلاد « يام » وهي واقعة غربي نهر النيل كما يقول المؤرخون معتمدين على أساطير المصريين أنفسهم . فبرستد مثلاً يرى أنها هي البلاد الواقعة غرب بلاد كوش : فلعلها لم تسكن بعيدة عن البلاد التي ندعوها اليوم بكردوفان أو دارفور .

ويجمل بنا قبل التسليم بهذا الرأي أن نذكر أن بلاد يام المذكورة كانت ذات شهرة بأفزامها . فإن پي الثاني أرسل وزيره حرقوف إلى بلاد يام حيث أمكن للوزير أن يجمع كثيراً من التحف والهدايا النادرة ومن جعلتها قزم يجيد الرقص . ولم يفرح الملك الطفل بشيء فرحه بهذا القزم ، فأرسل الأوامر إلى وزيره أن يحافظ على هذا الذخر الثمين ، وأن يهتم بأمر راحته أثناء الرحلة الطويلة من بلاد يام إلى مصر^(١) . وكان بمصر في ذلك الوقت عدد من الأفزام وكانوا

(١) راجع برستد ص ١٤٠ .

يشتهلون في مختلف الحرف والصناعات وقد صورهم المصريون بإتقان فيما خلفوه من النقوش والرسوم^(١).

إذن لا بد أن تكون بلاد يام لها اتصال بمواطن هؤلاء الأقزام أو أن تكون فيها سوق أو أسواق يباعون فيها ويشتررون . فإن كان الرأي الأول هو الصواب وكانت بلاد يام قريبة من مواطن الأقزام فليس من المعقول أن تكون هي البلاد التي ندعوها اليوم كردوفان . فإن مواطن الأقزام اليوم هي أواسط أفريقية وأعلى نهر الكونغو ولكن مواطنهم في عهد المصريين كانت أوسع مما هي اليوم وكانت تشمل بلاد بحر الغزال ، وجزءاً من أعلى النيل .

يجوز لنا إذن أن نفترض أن حرقوف ربما حصل على قزمه هذا بالقرب من مواطن الأقزام في ذلك العهد ، أي قريباً من إقليم بحر الغزال أو أعلى النيل الأبيض . وربما لم نكن بعيدين عن الصواب إذا افترضنا أن المصريين كان لهم علم بمجرى النيل وبأعليه إلى نقطة اتصال النيل بالسوبات كما كان لهم بعض العلم بإقليم بحر الغزال .

وليس بدليل على خطأ هذا الرأي أن المصريين أنفسهم كانوا يشيرون إلى بلاد يام أنها واقعة في الغرب في بلاد الأرواح ، لأن كثيراً من الجغرافيين القدماء كانوا يحسبون أن منابع النيل واقعة في الغرب^(٢) .

ثالثاً : كان المصريون يعرفون بلاد بنت ، وكانوا يطلقون هذا الاسم على البلاد الواقعة على الساحل الجنوبي للبحر الأحمر ، وتشمل البلاد التي نسميها اليوم بالأريتيرية وبلاد السومال ، وبعض العلماء يرى أن بنت كانت تشمل بلاد اليمن . وقد كان

(١) برستد ص ٩٤ .

(٢) راجع كتاب السير هاري جونسون ص ١٥ The Nile Quest ؛ ولابد من الإشارة إلى أن بعض الكتاب يرى أن بلاد يام ما هي إلا بعض الواحات المصرية مثل الداخلة أو الخارجة ولكن يصعب أن نتصور أن تجهز بعثة عظيمة كالتي قادها حرقوف لمجرد الوصول إلى مثل تلك الواحات .

اتصال المصريين بهذه البلاد قديماً يرجع على الأقل إلى عهد خوفو وساهورع ، بل ربما كان لهم بها اتصال قبل ذلك ^(١) . وبلاد بنت قريية جداً من ايثيوبيا ومن منابع النيل في بلاد الحبشة . ولكننا لسنا على ثقة مما إذا كان للمصريين علم بأنهار الحبشة وعلاقتها بنهر النيل ، لأن اتصالهم ببلاد بنت كان عن طريق البحر الأحمر . وإن كان الراجح أنهم كانوا عالمين ببلاد الحبشة ذاتها .

والمصريون إذن ، حتى في أوائل عهدهم ، لم يكونوا بالأمة المنعزلة عن العالم القانعة بالبقاء في وادئها الخصب ، بل كانوا مجدين في الاستكشاف والاتصال بالبلاد الأخرى . وكان لهم علم بكثير من الأقطار التي يتألف منها حوض النيل . وإن كنا للأسف عاجزين عن تقرير مبلغ علمهم بهذا النهر . ومن الثابت على كل حال أنهم بذلوا مجهوداً ليس باليسير في إزاحة القناع عن جزء عظيم من مجراه ^(٢) . ثم جاء اليونان فتناولوا مسألة النيل ومنابعه بالبحث والاستقصاء . فرأوا أنه نهر ليس له في العالم الذي يعرفونه نظير ، وجهلهم التام بمجره الأعلى أثار في أنفسهم الرغبة الشديدة لمعرفة شيء عن منابع النيل . وحين زار هيروودوتس مصر عام ٤٥٧ قبل الميلاد سافر إلى الشلال الأول . وهناك حاول عبثاً أن يحصل على معلومات أكيدة ثابتة عن منابع النيل بالاستفسار من التجار والمترجلين . وكل ما اهتدى إليه أن منابع النيل الأصلية مجهولة ، وأن جزءاً من مياه النيل يأتي من بلاد ايثيوبيا ، وأما منابعه الكبرى فربما كانت في الغرب !

وبعد فتح الإسكندر لمصر وتأسيس دولة البطالسة كثر وفود اليونان إلى مصر من تجار وعلماء ، وكثرت أريادهم لأعلى النيل ، لكنهم لم يكونوا يتوغلون إلى ما وراء نقطة التقاء النيل الأزرق والأبيض إلا نادراً . وأول جغرافي درس مجرى

(١) راجع برستد ص ١٢٧ — ١٢٨ .

(٢) كان المصريون يسمون النيل حابي وكان له عندهم منزلة مقدسة . وكذلك كانوا يدعونه باسم بي يوما ويقال إن هذا أصل اشتقاق لفظ الفيوم ، وكذلك كانوا يسمون الوادي بآتور . وراجع كتاب جونستون The Nile Quest ص ٧ .

النيل بشيء من الدقة هو ايراتوستين ، وكان أميناً لمكتبة الإسكندرية ومن أكبر الجغرافيين في زمانه . وقد وصف نهر النيل وصفاً جيداً إلى ملتقى النيل الأبيض والأزرق وأشار إلى أن هنالك بحيرات ينبع منها النهر .

وأكبر جغرافي جاء بعد ايراتوستين وهو اسطرابون لم يزد على أن زار مصر وساح فيها حتى وصل إلى الشلال الأول وتوغل قليلاً فيما وراءه ، لكنه لم يستطع أن يزيد الشيء الكثير على ما أتى به سلفه .

ولعل التوغل في بلاد السودان في ذلك العهد إلى ما وراء ملتقى النهرين كان محفوفاً بالمخاطر فلم يحاول أحد أن يقدم على هذا الأمر حتى جاء الامبراطور نيرون وكان على استبداده محباً للعلم شغفاً بالاستطلاع . فأرسل في سنة ٦٦ بعد الميلاد اثنين من ضباط جيشه في بعثة لاستكشاف منابع النيل الأبيض وقد ركبت هذه البعثة الزوارق وسافرت إلى الجنوب حتى بلغت منطقة السدود والمستنقعات وهنالك رأت أن المضي في طريقها ضرب من المحال فعادت أدراجها حاملة إلى روما من المعلومات عن الرحلة ما يثبطهمة ، فلم يجرؤ أحد بعدها على التوغل في أعالي النيل من هذه الجهة . وبقى شرف اجتياز منطقة المستنقعات لم يحزه أحد فيما نعلمه إلى أن أحرزه رجال محمد علي ، على النحو الذي سندكره فيما بعد .

ثم توالى السنون حتى جاء عهد بطليموس الجغرافي . ومن قبل عهده بقليل جرت حادثة هامة يحسن أن نسردها أولاً تمهيداً لذكر بطليموس . ذلك أن تاجراً وفلاحاً يونانياً اسمه ديوجين سافر في تجارة له إلى شرق أفريقيا ونزل بساحلها الشرقى عند بلدة كان اسمها في ذلك الزمن رابتم Raptum وموقعها عند مصب نهر بانجاني غير بعيد من الساحل المقابل لجزيرة زنجبار . وقد زعم هذا التاجر أنه سافر من الساحل متوغلاً في أواسط أفريقيا مدة خمسة وعشرين يوماً حتى صار على مقربة من البحيرات الكبرى والجبال الشاهقة المسكوسة بالجليد

التي يستمد منها النيل ماءه بينبوعين عظيمين . وقد قيل له إن هذين ينبوعين يتحدان فيكونان نهراً واحداً يجري شمالاً حتى يتصل بنهر الحبشة
وسواء توغل هذا اليونانى بنفسه فى أواسط أفريقية أو لم يتوغل فإنه من غير شك قد حصل على معلومات جديدة موثوق بها عن منابع النيل . ويظن الكثيرون أنه استمد هذه المعلومات من التجار العرب الذين كانت لهم علاقات اقتصادية قديمة بالساحل الشرقى لأفريقية والذين كانت لهم رحلات كثيرة إلى داخل تلك القارة .

وقد نقل ديوجين أن فى أواسط أفريقية عدة بحيرات وأن النيل إنما ينبع من اثنتين منها وأن فى جنوب البحيرات جبلاً عالية مغطاة بالجليد تدعى جبال القمر لما لقممها من اللون الأبيض الناصع .

ولم يكتب ديوجين كتاباً عن رحلاته لكنه قصها على رجل جغرافى من بلدة صور اسمه ماريانوس ، ولسوء الحظ ضاعت مؤلفات ماريانوس وكادت تذهب كلها لولا أن الجزء الخاص منها بنهر النيل قد نقله إلينا كلاودوس بطليموس .
وبطليموس هذا رجل مصرى يونانى ولد بقرية فى شمال الدلتا وسكن الإسكندرية حيث دون أكثر مؤلفاته فى أواسط القرن الثانى بعد الميلاد . وهو من غير شك أعظم الجغرافيين القدماء . وقد تناولت أبحاثه الجغرافية جميع أقطار العالم ، ورسم خرائط عديدة للعالم ولنهر النيل . وبقيت كتبه وخرائطه هى المرجع الأكبر لدراسة الجغرافيا عامة ونهر النيل خاصة إلى أواسط القرن السادس عشر .
أى إلى عهد النهضة الحديثة .


وصف بطليموس مجرى النيل وصفاً دقيقاً حتى مدينة مروى Merœ وهى مدينة باقية آثارها إلى اليوم بين الدامر وشندى . (وليست مروى الحديثة الواقعة جنوب الشلال الرابع) . على الضفة اليمنى للنيل على بعد نحو خمسين ميلاً جنوب نقطة اتصال العظيرة بالنيل ، بالقرب من بلدة كبوشية .

وقد جعل بطليموس نقطة اتصال النيل الأبيض والأزرق في خط عرض ١٢ بدلا من ١٠ و ١٥° وهذه غلطة ربما كانت يسيرة لكتاب في ذلك العصر لكن كان من نتائجها أنه جعل منابع النيل في الجنوب أبعد بكثير مما هي .

وصف بطليموس نهر العظيرة والنيلين الأزرق والأبيض لكن معلوماته عن الجهات الواقعة شمال الخرطوم كانت بالطبع أكثر مما علمه عن المنطقة التي في جنوبها . وأما عن منابع النيل فقد ذكر أن هنالك بحيرتين عظيمتين يخرج من كل منهما نهر ويتحد النهران عند خط عرض ٢° شمالا — وهذا منه غاية في الخلق لأن مخرج النيل من بحيرة البرت واقع على خط ١٥° ٢° . ولكنه بالغ في بعد البحيرتين جنوبا فجعلهما تمتدان إلى خط عرض ٧° جنوبا بدلا من ٣٠° ٣° . وقد بين بطليموس بجلاء الفرق بين البحيرات الاستوائية التي ينبع منها النيل الأبيض وبحيرة طانا التي سماها كلوي Colæ وقال إن منها ينبع النيل الأزرق وكان يسميه استاباس Astapus . كما كان يسمى العظيرة استابوراس Astaboras والنيل الأبيض والسوبات Astasobas وهذه الأسماء باقية إلى اليوم محرفة قليلا^(١) ويظهر أن لفظ استا Asta معناه نهر أو بحر في لغة سكان هذه الأقاليم في ذلك الزمن . وهي لغة لا بد قد انقرضت .

وأشار بطليموس بالطبع إلى أن هنالك جبلا شامخة في جنوب منابع النيل تغطيها الثلوج اسمها جبال القمر . وقد جرى خلاف بين بعض المستكشفين والجغرافيين الحديثين عن حقيقة جبال القمر وأي جبال عنها الكتاب القدماء . فحاول بعضهم أن يبرهن أن القدماء إنما قصدوا جبال مغمبيرو Mfumbiro وهي الواقعة جنوب بحيرة أدورد ، ورأى جونستون أنها لا بد أن تكون جبال رونزوري الواقعة شرق نهر السمليكي . ولكن أكثر الكتاب يرون أن القدماء إنما أرادوا

(١) التحريف ربما بدا لنا أنه أكثر في تسمية النيل الأزرق . ولكن الأحباش يدعونه إلى يومنا هذا بنهر آباي .



خط الإقليم
حسب تقديرات بطليموس

خريطة فخر النيل

كما كان في زمان بطليموس

الموقع هو مصر القديمة
سورة يونس

جبال القمر

بجبال القمر تلك الجبال البركانية الشاهقة أمثال كينيا وكليا نجارو والغون الواقعة جنوب وشرق بحيرة فكتوريا . . ولعل هذا الرأي أرجح لأن القدماء استمدوا علمهم بمقابع النيل مما سمعوه من الأخبار في شرق أفريقيا . والمسافر من شرق أفريقيا إلى البحيرات يصادف هذه الجبال قبل أن يصادف سواها . وربما لم يكن من محض الصدفة أن البلاد الواقعة جنوب بحيرة فكتوريا اليوم اسمها بلاد أنياموزي "Unyamwezi" ومعنى هذا الاسم بلاد القمر^(١) .

لم يكن بطليموس أول من أشار إلى البحيرات الاستوائية أو إلى جبال القمر ولكنه أول من جمع المعلومات التي اهتدى إليها سائر المكتشفين والتجار والسائحين ونظمها ورتبها وجعل منها صورة جغرافية منسقة مهيبة . حتى أصبح كتابه المرجع الأكبر إن لم يكن الوحيد للجغرافيين من القرن الثاني إلى القرن السادس عشر . وقد نقل العرب كتابه إلى لغتهم وكان مرجعهم الأكبر في كتاباتهم الجغرافية . وقد زاد كتاب العرب الشيء الكثير على ما ذكره بطليموس . ولكن هذه الزيادة فيما يختص بأعلى النيل كانت قليلة .

على أن بعض الزيادات التي أضافوها إلى ما ذكره بطليموس عن النيل لم تكن صواباً . فمن ذلك ذكرهم أن هناك بحيرة كبرى عند خط الاستواء يخرج منها نيل مصر متجهاً إلى الشمال ونيل مقدشو (؟) مشرقاً ونيل غانة (أو نهر السودان) مغرباً . . واسم هذه البحيرة الكبرى كما ذكره ابن سعيد بحيرة (كوري) . ولا نعلم تماماً أى الأنهار عني بنيل مقدشو ولعل المقصود نهر جوبا ومصبه في ساحل أفريقيا الشرق عند خط الاستواء وعليه تقع بلدة مقدشو ، أو نهر طانة

(١) راجع كتاب جوستون المتقدم ذكره ص ١٣٨ . ويرى بعض جغرافي العرب أن اسم هذه الجبال : جبال القمر ؟ (بضم القاف) وأصل هذا الخطأ طبعة الكتابة العربية . وقد جعل القدماء موقعها على خط عرض عشرة جنوب خط الاستواء ، كما جعلوا عرض البحيرات درجة سبعة . راجع أبو الفدا طبع باريس ص ٦٤ .

ومصبه أبعد إلى الجنوب من نهر جوبا . أو ربما قصدوا به نهر الزميرى . لأن
الأنهار الأخرى أقل من أن تقارن بالنيل .

وَأما نيل السودان أو نيل غانة فيقصد به نهر النيجر ، وكان أكثر جغرافي
العرب يظنون أن منابع النيجر هي نفس تلك البحيرة التي ينبع منها النيل والتي
ليس لها أدنى صلة ، ومن الغريب أن فكرة وجود بحيرة كبرى في أواسط
أفريقية توزع الماء بالعدل بين أنهار عديدة بقيت إلى القرن الماضي ، مع أن بطليموس
نفسه نفى مثل هذه الفكرة وقال إن البحيرات لا يخرج منها غير نيل مصر وإن
لنيل غانة مخرجا آخر ^(١) .

إذن فليس هناك داع لذكر كتاب القرون الوسطى لأن ما نقلوه لنا عن
نهر النيل لم يزد كثيراً عما تركه لنا القدماء .

ولنتقل بعد هذا إلى العصر الحديث ولنكتف هنا بذكر أشهر المستكشفين .
ونظراً لصعوبة الوصول إلى أواسط أفريقيا حيث توجد منابع النيل الاستوائية
بقيت هذه إلى القرن التاسع عشر دون أن يعنى بها المستكشفون في وقت كثير
فيه الاستكشاف .

وأول من عنى بأمر النيل واستكشاف منابعه في العصر الحديث جيمس
بروس وقد نزل الاسكندرية في أواخر القرن الثامن عشر ثم سافر منها إلى القاهرة
فأسوان ومن هناك اخترق الصحراء الشرقية إلى البحر الأحمر وركب زورقاً أقله
إلى جدة ثم غادر جدة إلى مصوع ومنها سافر إلى غندار عاصمة الحبشة في ذلك
الوقت وساح في أرجاء الحبشة حتى بلغ مخرج النيل الأزرق من بحيرة طانا واقتفى
أثره من بلاد الحبشة إلى ملتقى النيلين ثم سار شمالاً إلى بلاد النوبة فصر . ومنها
عاد إلى بلاده . وقد نشر رحلاته في سبع مجلدات واصفاً فيها جميع البلاد التي

(١) راجع في هذا كله كتاب تقويم البلدان لأبي الفدا (باريس) ص ٣٧ ، ٤٣ ، ٦٤
ومقدمة ابن خلدون (مصر) ص ٦٠ وكتاب جونسون في البحث عن النيل ص ١٦٧ .

ساح فيها . ومبيناً بخرائطه مجرى النيل الأزرق بشيء كثير من الوضوح
والجلاء . . . وبرغم أنه قد سبقه بعض القسس اليسوعيين إلى استكشاف بحيرة
طانا وأعلى النيل الأزرق فإن وصف بروس كان أدق وأكثر تفصيلاً .
وكان بروس يعتقد أن النيل الأزرق هو أهم منابع النيل ، ولم يكن رأيهِ هذا
عن علم وثيق بمقدار ما يأتي به كل من النيلين من الماء . وإنما تلك كانت عادة
كل مستكشف أن يرى المنابع التي استكشفها أهم وأكبر من سواها .

ننتقل بعد هذا إلى عهد محمد على فقد كان لهذا الرجل العظيم في استكشاف
أعلى النيل يد كبرى . وكان عهده من غير شك فاتحة عصر جديد في تاريخ
الاستكشاف الأفريقي عامة والنيل بنوع خاص . ولكن نقدر هذا حق قدره لا بد
لنا أن نذكر أن جميع المحاولات والمخاطر التي أقدم عليها المستكشفون كانت
تنتهي دائماً عند أعلى النيل الأبيض ، لدى منطقة السدود . فكانت جميع
الجهود التي بذلت من أول عهد المصريين إلى العصور الوسطى والحديثة تقف أمام
هذه المستنقعات والسدود التي كان يعتبر اجتيازها ضرباً من المحال . والتي لم يقدم
على التوغل فيها قليلاً سوى رسل الإمبراطور نيرون في القرن الأول بعد الميلاد .
وهؤلاء ما فتئوا أن عادوا أدراجهم دون أن يحققوا من أمنيتهم إلا قليلاً .
فبقي النيل فيما وراء هذه السدود والمستنقعات سرّاً غامضاً قد أغلقت دونه
أبواب ورثج ، حتى نهض في وادي النيل ذلك الرجل القوي ، البعيد الآمال ومد
يده جنوباً فأعاد الصلة بين مصر والسودان إلى ما كانت عليه من قبل ؛ ثم أراد
أن يكشف الحجاب عن ذلك السر الغامض فأرسل بعثة أولى عام ١٨٣٩
فاجتازت منطقة السدود وبلغت إلى خط عرض ٦٣° وما نعرف أن بعثة
اجتازت تلك المستنقعات من قبل . . . ثم أردف هذه ببعثة أخرى عام ١٨٤١
وهذه وصلت إلى بلدة غندكرو . . . وللمرة الأولى اتصلت مصر اتصالاً مستمراً


بأعلى النيل حتى هذه المدينة . . وكلتا البعثتين كانت تستخدم السفن الشراعية ذاهبة وآيبة . ولكن لم يمض زمن طويل حتى استحضرت السفن البخارية فكانت تنقل المسافرين حتى أعلى النيل .

وبالطبع وقف تيار الاستكشاف ملياً لدى بلدة غندكرو لأن جنوب هذه البلدة من الجنادل والشلالات عقبات تحول دون سير السفن أو الزوارق في ذلك الجزء من نهر النيل . ولم تزل هذه العقبات حائلة دون سهولة المواصلات في تلك الجهات إلى يومنا هذا .

على أن محمد على لم تكن له فقط يد كبرى في كشف القناع عن جزء عظيم من أعلى النيل كان العالم يحمله تماماً . بل كان عهده سبباً غير مباشر لكثير من الاستكشافات التي توالى في النصف الثاني من القرن الماضي . فإن اتصال مصر بالسودان سهل على الكثير من الباحثين وسائل السياحة والاستكشاف بدرجة لم يكن للناس بها عهد . وأصبحت مسألة الكشف من أعلى النيل رهينة بمضى الزمن .

إن المطلع على كثير من الخرائط التي كانت ترسم في منتصف القرن الماضي يرى في أواسط القارة الأفريقية فراغاً كثيراً ، دلالة على مبلغ علم الراسم . وظاهر جداً أن الراسم لأمثال هذه الخرائط لم يشأ أن يضع في خريطته إلا ما كان له به علم تام . فلم تكن له جرأة القدماء الذين رسموا في أواسط أفريقيا بحيرات ونهيرات لم يكونوا يعلمون مواقعها بل ولا حقيقة وجودها علم اليقين . ففضل صانع الخريطة الأمين أن يترك في وسط القارة بياضاً وفراغاً .

وقد أثارت هذه الحال في نفوس الكثيرين روح الحمية والرغبة . فكثرت محاولو الاستكشاف في النصف الثاني من القرن الماضي كثرة يقعدر معها أن نذكرهم هنا جميعاً . فلا بد لنا أن نكتفي بذكر المهم منهم .



في عام ١٨٤٥ دخل خدمة الحكومة المصرية رجل من بلاد الغالة اسمه جون بثيريك John Petherick ثم اشتغل فيما بعد بالتجارة في السودان وقصلا لدولة بريطانيا هناك . وفي أثناء إقامته بتلك البلاد قام بعدة رحلات في غربي وادي النيل وارتاد بلاد كردوفان ودارفور . ثم ساح جنوبا وتوغل ببلاد بحر الغزال ولعله أول سائح أوروبي بلغ بلاد نيام نيام . وكتب كتاباً عنوانه مصر والسودان وأواسط إفريقيا . وكانت رحلاته ومؤلفاته هذه وسيلة لإبانة كثير مما كان غامضاً أو مجهولاً من جغرافية تلك الأقطار . وتسنى لرأسي الخرائط أن يسدوا جزءاً من الفراغ الذي كان يبدو في خرائط إفريقيا في ذلك الوقت .

على أنه رغم كل هذه الجهود التي بذلت بقي هنالك أمر واحد غامض الغموض كله ، وهذا هو أمر منابع النيل في الأقطار الاستوائية ، فقد ظل العالم المتمدن جاهلاً حقائق تلك المنابع غير مسلم بالأخبار المنقولة عن القدماء أو عن الجهلة من التجار ، متعطشاً إلى أنباء صحيحة دقيقة عن النهر يدلى بها أفراد مسئولون ، قد شاهدوا منابع النيل رأى العين .

إذن لقد كانت المسائل التي تشغل أفكار الكثيرين من المفكرين في أواسط القرن الماضي هي أولاً : ما هي منابع النيل الاستوائية ؟ وإذا كانت تلك المنابع بحيرات ، فأين موقعها وما عددها وطولها وعرضها وعلاقتها بعضها ببعض ؟ هذه الأسئلة وأضرابها هي التي كان العلم والعالم يريدان لها جواباً ، والتي اشترك في الإجابة عنها عدد كبير من المستكشفين والعلماء أمثال برتون وسبيك وغرانت وستانلي وبيكر وأمين باشا وشونيفرت وجيسي ومارنو حيث كانت إمالة اللثام عن هذا السر الكبير عملاً لا يكفي له مجهود فرد واحد ، أو جيل واحد .

(٥) كان برتون ضابطاً في الجيش الإنكليزي وعالماً مستشرقاً أتقن العربية وساح في الشرق طويلاً حتى لقد حجع مع الحجاج إلى مكة . وفي عام ١٨٥٤ ألحق بالحامية البريطانية المرابطة في عدن . ومن هنالك قام ببعض رحلات في شرق

إفريقية عن طريق بلاد السومال والجللا . وكان يريد أن يصل إلى منابع النيل من هذه الجهة فلم يصادف نجاحاً . وفي نهاية عام ١٨٥٦ سافر إلى ساحل إفريقية الشرق ومعه سبيك وشرعا في رحلتها إلى داخل القارة مبتدئين من بلدة باجامويو لمواجهة لجزيرة زنجبار . وسارا نحو الغرب منحدرين قليلا إلى الشمال وبغيتهم الوصول إلى البحيرة الكبرى المزعومة التي ينبع منها النيل وأنهار أخرى . وفي أثناء سيرهما قابلا كثيرا من التجار العرب الذين أوقفوهم على كثير من الحالة الجغرافية للبلاد وأفهموهم أن البحيرة المذكورة لا وجود لها . بل إن هنالك ثلاث بحيرات على الأقل وهي التي ندعوها الآن : نياسا وتنجنيقا وفكتوريا . وهنا لا بد لنا أن نلفت نظر القارئ إلى أن استكشاف البحيرات أو الأنهار الاستوائية ، إنما كان يعد « استكشافا » بالنسبة للأوربيين ولمن اتصل بهم . وللجغرافيين بنوع خاص الذين كانت مهمتهم تدوين المعلومات الجغرافية الصحيحة . أما مجرد العلم بالمناطق الاستوائية وأنهارها وبحيراتها ، فقد ألم بذلك التجار العرب وعلى الأخص عرب اليمن وحضرموت منذ زمن بعيد . واتصلهم بشرق وأواسط إفريقية يرجع إلى العصور التاريخية المتقدمة . بيد أن معرفتهم بتلك البلاد وترددهم عليها وتوغلهم فيها لم تعد على العلم بفائدة كبرى لقلّة من غنى بتدوين تلك المعلومات ونقلها إلى العالم في صورة علمية مقبولة .

سار برتون وسبيك مغربين حتى وصلا إلى بلدة أوجيجا (Ujija) الواقعة على بحيرة تنجنيقا فكانا أول الأوربيين وصولا إلى هذه البحيرة العظيمة . . وأهم ما علمه هنالك أن البحيرة لا صلة لها بالنيل وأن نهر روسيزي (Rusizi) الذي في شمالها إنما ينصب فيها ولا يخرج منها .

وفي أثناء عودتهما إلى ساحل زنجبار مرض برتون ؛ فتركه أسبيك وسار في بعثة صغيرة متجهين نحو الشمال ، وبعد مسيرة أيام وصل إلى الساحل الجنوبي للبحيرة الكبرى التي يعرفها العالم اليوم باسم فكتوريا نيانزا وكان أسبيك أول من دعاها

بهذا الاسم . وكان وصوله إليها في يوليو سنة ١٨٥٨ . وقد رأى من اتساع البحيرة
الذى لا يدرك الطرف مداه أنها لا بد أن تكون هي البحيرة الكبرى التى تحدث
بذكرها الجغرافيون قديماً والتى منها ينبع النيل الأبيض . .

ورجع اسپيك أدراجه فأبلغ كشفه الكبير إلى برتون ثم أسرع العودة
إلى إنكلترة حيث أثارت رحلته هذه كثيراً من الحماس والإعجاب . . . وتطوعت
الجمعية الجغرافية البريطانية بجمع الأموال اللازمة لرحلة أخرى يرأسها اسپيك لإتمام
كشفه فى أواسط أفريقيا . ومما يدل على عظم اهتمام الناس فى ذلك الوقت بمنابع
النيل دون غيرها أن استكشاف بحيرة تنجنيقا لم يثر شيئاً من الاهتمام بل لقد تنوسى
وأهمل بجانب اكتشاف سبيك بحيرة فكتوريا .

وفى خريف عام ١٨٦٠ عاد اسبيك عن طريق الرأس إلى ساحل زنجبار
يصاحبه فى هذه المرة زميله غرانت . وكانت بغيتهما أن يتحققا من أن النيل
يخرج حقيقة من تلك البحيرة الكبرى . فبدأ رحلتها من ساحل زنجبار فى شهر
أكتوبر عام ١٨٦٠ وسارا نحو الشمال الغربى حتى بلغا البحيرة ثم سارا بإزاء
ساحلها الغربى مخترقين بلاد كارا جوى حيث أقاما مدة ثم بلاد أوغنده حيث
مكثا مدة أطول . ومن بعدها طافا حول ساحل البحيرة الشمالى حتى بلغا مخرج
نهر النيل فى الجهة الشمالية حيث الشلالات التى سماها سبيك بشلالات
ريبون^(١) وكان ذلك فى الثامن والعشرين من شهر يوليو سنة ١٨٦٢ .

وانحدر اسپيك بعد ذلك إلى الشمال ثم إلى الشمال الغربى — مبتعداً عن
بحيرة كيوجا التى لم يكن يعلم بوجودها — وأقام ببلاد أنيورو مدة طويلة بالرغم منه
ثم غادرها متجهاً نحو الشمال فبلغ نهر النيل حيث يتصل بنهر كافو وركب هو ومن
معه زوارق سارت بهم فى النهر إلى قرب جنادل كروما . من بعدها أخذوا

(١) كان الايرل ريبون رئيس الجمعية الجغرافية البريطانية فى ذلك الوقت .

سمتهم إلى الشمال مخترقين بلاد أتشولى ولانجو . حتى بلغوا أعلى بحر الجبل ووصلوا إلى غندكرو في أواخر فبراير سنة ١٨٦٣ . بعد أن استغرقت رحلتهم نحو عامين ونصف عام .

وقد سمع أسبيك ، أثناء رحلته ، بالبحيرة الغربية الكبرى التي كانت تدعى لوتا نزيجه (Luta Nzige) . والتي اسمها الآن بحيرة ألبرت . ولكنه لم يتمكن من الوصول إليها ورؤيتها . ومع ذلك استطاع أن يرسم خريطة لأواسط أفريقية بين فيها موقع بحيرة فيكتوريا وألبرت بشيء كثير من الدقة ، مستعيناً على هذا بما وصل إلى سمعه من وصف البحيرة الأخيرة . . وعند وصوله إلى غندكرو قابله صمويل بيكر فأوصاه أسبيك بأن يبدل جهده في استكشاف بحيرة ألبرت وتعيين موقعها وحدودها . أما أسبيك وغرانت فعادا إلى إنكلترة بطريق السودان ومصر والإسكندرية .

كان صمويل بيكر من الأغنياء وكان مولعاً بالترحل والتجوال وقادته أسفاره إلى الشرق الأدنى ثم إلى مصر حيث خطر له أن يذهب إلى غندكرو ليستقبل أسبيك وغرانت عند عودتهما من أواسط أفريقية . وفي طريقه إلى غندكرو طاف كثيراً في البلاد الواقعة على نهر العظيرة والنيل الأزرق والسوبات ؛ ووصف هذه الفواحي في كتاب أسماه روافد النيل الحبشية The Nile Tributaries of Abyssinia .

وعلى أثر التقائه بأسبيك سافر هو وزوجته إلى الجنوب ثم إلى الغرب فوصلا إلى بحيرة ألبرت في مارس عام ١٨٦٤ . فكانا أول أوربيين شاهدوا هذه البحيرة . ثم ركبا ومن معهما الزوارق وذهبا إلى شمال البحيرة حتى بلغا بلدة ماجنغو (Magungo) حيث يدخل النيل بحيرة ألبرت . ومن هناك تتبعوا النهر مشرقين حتى بلغا شلالات مرتشيزون . وارتادا البلاد التي حول نهر النيل ما بين شلالات مرتشيزون وكروما . . ثم عادا إلى غندكرو فالسودان فإنكلترة . ولقد ضمن بيكر استكشافه في كتاب أسماه بحيرة ألبرت .

وقد التحق بيكر بخدمة إسماعيل باشا في سنة ١٨٦٩ وكان من جملة القواد الذين أرسلهم خديوى مصر الكبير إلى جنوب السودان للقضاء على تجارة الرقيق . وقد كتب فى هذا بيكر مؤلفاً أسمه (الإسماعيلية) .

بعد قيام سبيك وغرانت وبيكر باستكشافاتهم الهامة التى سدوا بها الفراغ الأعظم فى خرائط إفريقيا الوسطى ، لم يبق على المستكشفين الآخرين إلا أن يتموا مابدأه هؤلاء الذين مهدوا لهم السبيل وأفادت تجاربهم كل من أراد التوغل فى أواسط إفريقيا .

وقام بعد ذلك كثيرون برحلات هامة نذكر منهم جورج شونيفرت George Schweinfurth العلامة الألمانى الذى عاش طويلاً فى مصر والذى ساح فى إقليم بحر الغزال من أدناه إلى أفصاه ووصفه وصفاً دقيقاً . وذلك فى عام ١٨٦٩ إلى ١٨٧١ . ثم هنرى استانلى مستكشف نهر الكونغو . وقد ساح حول بحيرة فكتوريا فى زورق حمله أجزاء إلى البحيرة . وطاف به فى جميع نواحيها ، محصياً جميع ما بها من الخلجان والجزر . . وكانت أهمية رحلته هذه أن الشكوك كانت حامت حول استكشافات سبيك وغرانت وما لها من الأهمية . وقد تسنى لاستانلى أن يبدد هذه الشكوك .

أما أمين باشا فكان طبيباً ألمانى النشأة واسمه الأصلى ادورد شنتزر Eduard Schnitzer اعتنق الإسلام ودخل خدمة الحكومة المصرية وما زال برقى حتى عين حاكماً لولاية خط الاستواء فى عهد إسماعيل . وكان مقره بلدة لادو فى أعلى بحر الجبل . ولكنه كان كثير الترحل والتجوال فى الولاية التى كان يعرف نواحيها كلها خير المعرفة والتى وصفها وصفاً دقيقاً لم يزل إلى يومنا هذا من خير ما كتب عن البلاد الواقعة شرقى بحر الجبل وغربيه وهو أول من استكشف نهر السمليكى وأدرك حدود بحيرة ألبرت بالدقة . وبقى فى تلك البلاد برغم ثورة

المهدى ، وانقطاع الصلة المباشرة بمصر ، إلى أن أرسل استانلى سنة ١٨٨٨ «لإنقاذه» .
وقد سافر استانلى إنفاذاً لهذه الرغبة إلى أعلى نهر الكنفو ثم اخترق الحد
الفاصل بين الكنفو والنيل ، وأمكنه أن يستكشف للمرة الأولى جبال رونزورى
وبحيرة أدروود وأن يتمم ارتياد مجرى نهر السمليكى . . وكانت هذه رحلة استانلى
الثانية إلى أعلى النيل . . ويرى السير هارى جونستون أن استانلى واسپيك هما
أعظم المستكشفين لجاهل إفريقيا .

وهكذا تعاقب المستكشفون بعضهم إثر بعض . وعلى أثر المستكشفين جاء
المبشرون والمستعمرون إلى شرق أفريقيا وإلى أعلى النيل . . وهكذا انقشعت
السحب التى كانت تحجب أواسط أفريقيا عن عيون العالم . وأميط ذلك اللثام
الذى كان يحجب وجه النيل فى مجراه الأعلى . ولم تلبث الحضارة بمحاسنها
ومساوئها أن بسطت نفوذها على هذه الأقطار القاصية . وقامت الحكومات المختلفة
بمساحة مجرى النيل ورسم الخرائط الدقيقة له . وتنوسى الزمن الذى كانت ترسم
فيه الخرائط بمحض الحدس والظن أو بالنقل عن رواة غير موثوق برواياتهم .
وأسمى ذلك السر القديم : سر النيل . وقد تسنى للعالم حله بعد لأى وعناء ،
وبعد مضى أجيال وقرون عديدة^(١) .

ولابد أن نؤكد هنا ما أشرنا إليه من قبل ، من أن توحيد مصر والسودان
فى إدارة مشتركة ، وهما يشتملان على الجزء الأعظم من حوض النيل ، وقد تم
ذلك فى عهد محمد على ، كان له الفضل الأكبر فى الكشف عن النيل كله ، إذ
لم يكن الجزء الواقع جنوب السودان سوى شطر صغير من حوض النهر .

(١) يجد القارئ كثيراً من المعلومات عن تاريخ اكتشاف النيل فى كتاب السر هارى
جونستون البحث عن النيل The Nile Quest . وهو كتاب كسائر مؤلفات هذا الرجل يجب
أن يقرأ بشئ من الاحتراس . ويحسن كذلك الاطلاع على بعض كتب المستكشفين أنفسهم
المتقدم ذكرهم . وعلى الأخص أمين باشا وشوينفرت ويكر ، وبروس .

الفصل الثانى

حوض النيل

تمهيد جغرافى عام

وبعد ، فأى نهر هذا الذى تعب فى ارتياده المستكشفون وعنى بوصفه الواصفون ، وشغل المفكرين طول هذه الأجيال ! أهو نهر كسائر الأنهار خاضع لما هى خاضعة له من النظم والقوانين : يسيل كما تسيل ويجرى كما تجرى ؟ هذا أول سؤال سنفنى بالإجابة عليه . ولنهد لهذا بأن نلقى نظرة عامة على نهرنا هذا وعلى الحوض الذى يحتويه .

حوض أى نهر هو مجموع تلك الأقطار التى تغذيه مياهها وأمطارها . والتى تنحدر نحو واديه جبالها وتلالها وتلاعها . . ولو كان بعض تلك الأقطار خاليا من المطر أو العيون فإنها تحسب جزءاً من حوض النهر لأنها لو سقطت فيها أمطار أو تفجرت فيها عيون لانحدرت إلى واديه لا إلى واد غيره .

ولحوض كل نهر حدود عند أطرافه قد تكون بعيدة أو قريبة من مجراه وهى عادة جبال أو تلال مرتفعة تفصل ما بين حوض هذا النهر بروافده وجداوله وبين حوض نهر أو أنهار أخرى .

حوض النيل بهذا الاعتبار عظيم المساحة يبلغ زهاء مليونين وتسعمائة ألف من الكيلومترات المربعة . وإنا لننظر إلى خريطة النصف الشرقى لأفريقية شمال خط الاستواء فنراها تشتمل على حوض النيل . ولا تكاد تحتوى شيئاً سواه . فالنيل فى جميع هذه الأقطار هو الظاهرة الجغرافية الكبرى البارزة التى تتضام بجانبها

كل ظاهرة جغرافية أخرى . وهو الذى يصل ما بين قلب أفريقيا الحار والبحر المتوسط المعتدل ، ما بين أقطار حضارتها أولية وبلاد كانت فى مقدمة العالم حضارة ولعل أول ما يلفت نظرنا هو اتجاه مجرى النيل : ذلك الأمر اليسير الهين الذى نمر به حين نذكره سرا . وهو مع ذلك ذو مغزى جغرافى كبير . يجرى النيل من منابعه الاستوائية فيمتجه نحو الشمال حتى يلقى بمائه فى البحر المتوسط ، ويلتزم فى جريانه هذا الاتجاه الشمالى باستمرار واطراد لا نظير لهما فى أى نهر آخر من أنهار العالم . ولقد ينحنى مجراه تارة إلى الغرب وأخرى إلى الشرق وطوراً إلى الجنوب الغربى أو الشمال الشرقى . لكنه لا يلبث أن يرجع إلى الاتجاه الشمالى ثانية كأنما يسعى إلى القطب .

وحين ينصب فى البحر المتوسط نرى أن مصبه عند دمياط ومخرجه من بحيرة فكتوريا كلاهما واقع أحدهما شمال الآخر لا يفصلهما غير درجة واحدة من درجات الطول . والخلاصة أن مجرى النيل من منابعه إلى مصباته — لو نظرنا إليه نظرة عامة — متجه من الجنوب إلى الشمال بنظام ليس لأى نهر آخر نظيره . وهناك أمر آخر مرتبط بهذه الظاهرة . وهو : أن أقصى منابع النيل واقعة جنوب خط الاستواء بثلاث درجات ونصف تقريباً . ومصباته فى البحر الأبيض واقعة وراء خط عرض ٣١ شمالاً . وبهذا يكون النيل قد اخترق نحو ٣٥ درجة من درجات العرض ووصل ما بين بلاد مقنائية الأطراف جداً .. وبرغم أن النيل ليس أطول نهر فإنه ليس فى العالم نهر يمتد مجراه هذا الامتداد ويخترق هذا العدد الكبير من درجات العرض . ويصل ما بين بلاد متباعد بعضها عن بعض بهذا المقدار . ولهذا كان حوض النيل أطول أحواض الأنهار جميعاً .

ولو فكرنا فى هاتين الخاصتين : اتجاه مجرى النيل من الجنوب إلى الشمال وامتداد هذا المجرى من خط عرض ٣٣° جنوباً إلى ٣١° شمالاً . لرأينا لهما نتائج خاصة : منها أن وادى النيل لهذين السبيين أصبح لا يشتمل على إقليم

واحد أو منطقة واحدة بل عدة أقاليم وعدة مناطق . ولننظر لنهر الأمازون وطوله أربعة آلاف ميل كطول نهر النيل وحوضه أعظم من حوض النيل اتساعاً ، لكنه مع ذلك واقع أكثره في إقليم واحد تقريباً ومنطقة واحدة وهي المنطقة الاستوائية . أما النيل فنطاقه الطبيعية متعددة لأن خطوط العرض التي يخترقها متعددة جداً . فمن الأقاليم الاستوائية إلى الأقاليم المدارية إلى السهوب والأعشاب ، إلى الصحراء المجذبة إلى البحر الأبيض المتوسط . ثم لو أضفنا إلى هذا أقاليم الحبشة الموسمية لكان لدينا ما لا يقل عن ستة أقاليم طبيعية مختلفة يضمها حوض نهر واحد . ثم لنذكر غير هذا أمراً آخر لاحقاً بما أسلفنا ذكره . وهو أن النيل يجري من الجنوب إلى الشمال ، من خط الاستواء إلى ما وراء المدارين : من منطقة ذات مطر غزير إلى منطقة جرداء عديمة المطر شديدة الحرارة . فكما جرى النيل خطوة نحو مصبه أفقده ذلك جزءاً من مائه . فمياهه إذن آخذة — بوجه عام — في التناقص كلما اتجهنا نحو المصب . وليس هذا شأن الأنهار عادة . . . ولو عدنا فبقارنا النيل بالأمازون لرأينا هذا الأخير يجري في المنطقة الاستوائية لا يكاد يخرج عنها ، في منطقة مطرها دائم وغزير . فهو كلما سار نحو مصبه ازداد ما يحمله من الماء — رغم ما يفقد بالتبخر — وهذه عادة أكثر الأنهار أي أن ماءها في حوضها الأدنى أكثر منه في حوضها الأوسط والأعلى .

فظاهر إذن أن النيل لا يجري في إقليم طبيعي واحد بل إنه يجري في عدة أقاليم كثيرة التباين . ولسهولة دراسة هذا النهر لا بد لنا من تقسيم مجراه إلى أقسام نتناولها بالبحث واحداً بعد الآخر . وقد اعتاد الجغرافيون أن يقسموا مجرى كل نهر إلى أقسام ثلاثة ، لكل قسم خواصه ومميزاته ، الحوض الأعلى والأوسط والأدنى . .

فالحوض الأعلى يكون عادة في قطر جبلى مرتفع . ويكون مجرى النهر

وروافده ضيقاً يتدفق منه ماء النهر بسرعة واندفاع . وتسكتنفه الجنادل والمساقط والمدافع^(١) ويقتلع الصخور ويبريها ويبلها وينقلها من مكان إلى أبعاد منه . والنهر في مجراه الأعلى يكون عادة من القوة بحيث يستطيع أن يحمل الأحجار ويلقي بها في مكان بعيد حيث يهدأ تياره . ولقد يسمون النهر في أعاليه بالسيل "Torrent" نظراً لأنه كثيراً ما يكون على شكل السيل الجارف .

أما في حوضه الأوسط فيكون النهر معتدل السرعة متوسط القوة متوسط الاتساع ، ربما ينحوت من مجراه الشيء اليسير ولكنه لا يقوى على اقتلاع الصخور الكبيرة . وقد يلقى على جانبي مجراه وفي وسطه بكثير من الحصى والرمل والطين الذي بات عاجزاً عن حمله .

أما في حوضه الأدنى فإن النهر يكون بطيء السرعة متسع الجرى ، كثير التعرج في مسيله . ينساب وسط سهول فيضية . وهذه السهول قد أنشأها وكونها النهر نفسه بما غمر به الأرض من الطمي والطين والرمل التي كان يحملها ، والنهر في مجراه الأدنى عاجز عن أن ينحوت أو يحفر جوانب الجرى ، وعدا هذا فإنه عاجز أيضاً عن أن يحمل المواد التي أتى بها من حوضه الأعلى فهو يلقى بها جميعاً شيئاً فشيئاً ويحمل أخفها وأدقها حتى المنصب ثم يلقى بها في البحر .

وقد يسمون الحوض الأوسط للنهر بالوادي "Valley" والأدنى بالسهل "plain" .

هذا هو في العادة التقسيم الطبيعي لسكل نهر من الأنهار . . وليس يصعب أن نقنأول — على وجه التمثيل — عدداً من الأنهار فنقسم حوضها إلى الأقسام الثلاثة المذكورة . لولا أن هذا يخرج بنا عن موضوعنا . لكن محاولة تقسيم وادي النيل إلى هذه الأقسام الثلاثة ضرب من العبث .

(١) كانت العرب تسمى المكان الذي يندفع فيه الماء بشدة وسرعة مدفع والجمع مدافع : ولعله خير ترجمة لما يسمى بالإنكليزية Rapids .

لأن للنيل نشأة خاصة وتاريخاً خاصاً يميزانه عن كثير من الأنهار ويخرجانه عن القاعدة المشهورة .

وقد حاول هـ . ج . ليونز في أول كتابه عن جغرافية النيل^(١) أن يقسم نهر النيل إلى أقسامه الطبيعية : فجعل أقسام النيل على الوجه الآتى :

(١) القسم الأعلى : (مجرى السيل) : من منابع النيل إلى غند كرو .

(٢) القسم الأوسط : (الوادى) : من الخرطوم إلى أسوان .

(٣) المجرى الأدنى : (السهل) : من أسوان إلى البحر .

(٤) مجرى سهلى آخر : غند كرو إلى الخرطوم .

هذا التقسيم تبدو لنا غرابته وخروجه عن المألوف لجرد نظرة نلقبها عليه ، إذ ليس من الطبيعى أن يكون نهر من الأنهار أوله سيل ثم سهل رسوبى ثم وادٍ ثم سهل مرة أخرى . أى أربعة أقسام بدلاً من ثلاثة . والسهل الرسوبى فيها يسبق المجرى الأوسط ويليه مرة أخرى . . ثم ليس من المعتاد أن ينقلب النهر فجأة ، كما يفعل النيل عند غند كرو ، من سيل جارف إلى سهل فيضى دون أن يكون هنالك دور انتقال .

وليس هذا كل ما فى ذلك التقسيم من الغرابة . . بل هنالك شىء آخر نشير إليه هنا إشارة وجيزة . وهو أننا لو سلمنا أن الحوض الأعلى لنهر النيل يمتد من منابعه العليا إلى غند كرو لوجدناه لا تنطبق عليه جميع المميزات والخصائص التى يتصف بها عادة المجرى الأعلى . . إذ كيف يتسنى لنا مثلاً أن نسمى النيل ما بين بحيرة ألبرت ودوفلى سيلاً وهو فى هذه المنطقة عبارة عن مجرى متسع قد يبلغ فى بعض الأماكن ثلاث كيلو مترات وهو قليل السرعة جداً ويكاد مجراه يكون عديم الانحدار .

إذن من العبث أن نحاول تقسيم مجرى النيل إلى الأقسام المألوفة لأنه نهر ذو تاريخ معقد ونشأة فذة . وسنفرد لهذا الموضوع فيما بعد بابا خاصا . وإذا نحن هنا تكلمنا عن أعلى النيل فما نريد بذلك إلا مجراه الجنوبي لا نقصد أن له جميع ما للأنهار في أعاليها من الصفات والمميزات .

وإذا أردنا أن نقسم حوض النيل ، تسهيلا للبحث والدرس ، فلنقسمه إلى منطقة البحيرات الاستوائية : ثم حوض بحر الجبل فحوض بحر الغزال فحوض السوبات فالنيل الأبيض فهضبة الحبشة والنيل الأزرق . فالنيل في بلاد النوبة فالحوض الأدنى أو النيل في مصر . وهذه كلها أقسام إقليمية بحته . ولكل منها ميزات خاصة . ولكنها مستقلة تماما عن تقسيم النهر من الوجهة الجغرافية الطبيعية ولنهد لدراسة أجزاء النيل المختلفة بأن نلقى نظرة عامة على حوض النهر من حيث التضاريس والبنية ، وعلاقتها بسائر القارة الأفريقية .

إن القارة الأفريقية تخالف سائر القارات في أنها خالية من السلاسل الجبلية الكبرى التي تخطف القارة من أقصاها إلى أقصاها وتكون لها بمثابة السلسلة الفقرية من الجسم . وإنا لننظر إلى سلسلة جبال الألب والهملايا وهي الممتدة من أقصى غرب أوراسيا إلى أقصى شرقها . ثم إلى سلاسل جبال روكي والأنديز وكيف تمتد من الحد الشمالي للقارة الأمريكية في الاسكا إلى نهاية أمريكا الجنوبية في جزيرة أرض النار . ثم ننظر إلى إفريقية ونحاول عبثا أن نرى لها منطقة جبليّة بارزة منتشرة بين طرفي القارة . ولقد نرى في إفريقية جبلا كثيرة وهضابا عالية يزيد كثير منها على ثلاثة وأربعة آلاف متر . لكن أكثر هذه الجبال « علم فرد » قائم بنفسه حتى سمى الجغرافيون الألمان هذا الطراز من الجبال بالانزبرج (Inselberg) وهي كلمة مركبة من لفظين جزيرة وجبل : فهذه الجبال أمثال الغون وكينيا وكليمانجارو ، هي منفردة وبارزة كالجزيرة المنعزلة وسط بحار من البطاح

المنخفضة عنها . . وأما الهضاب العالية في أفريقية فتتسع المساحة ، مستوية السطح إلى درجة بعيدة ، ولا تشبه سلاسل الجبال في شيء .

هذا وقد قسم الجغرافي الألماني باسارجه^(١) Passarge قارة إفريقية من حيث التضاريس إلى أقسام ثلاثة : أفريقية العليا والسفلى والصغرى . . ويقصد بأفريقية الصغرى بلاد المغرب تشبها لها بآسيا الصغرى ، نظراً لاقترابها من أوروبا وانفصالها التام من حيث التضاريس عن القارة الأفريقية . . وهى من حيث البناء والجيولوجيا جزء من جنوب أوروبا أكثر مما هى جزء من إفريقية . أما أفريقية العليا فهى الجزء الجنوبي والشرقى للقارة . ويفصل بينها وبين إفريقية السفلى خط يمتد من بلدة لواندا الواقعة على المحيط الأطلسى على عرض ٨° تقريباً ثم يمتد شرقاً إلى أعلى نهر لوالابا ولوابولا ، فإلى غرب بحيرتى بانجويو ومويروفحاذيا لغرب بحيرة تنجنيقا وكيفو وادورد وألبرت . ويخترق بحر الجبل عند غندكرو ويسير فى اتجاه شمالى شرقى إلى غرب هضبة الحبشة فكسلا ثم يتجه إلى الشمال فى طريق وسط بين النيل والبحر الأحمر وكلما اتجه شمالاً ازداد اقتراباً من البحر الأحمر . حتى إذا جاوز خليج السويس انحدر إلى جهة الشمال الشرقى حتى يصل إلى مرتفعات سيناء . وجميع الأقطار الواقعة جنوب وشرق هذا الخط لاحق بأفريقية العليا . وكل ما هو غربيه وشماليه لاحق بأفريقية السفلى . فأعلى النيل إذن سواء فى المنطقة الاستوائية أو فى بلاد الحبشة واقعة فى أفريقية العليا . وكذلك المرتفعات الواقعة غربى البحر الأحمر ومرتفعات جزيرة سيناء . وأفريقية العليا يزيد ارتفاعها على الألف متر ، بينما السفلى تنقص عن هذا فى المتوسط .

ويجب ألا نفترض أن جميع ما هو واقع فى أفريقية العليا — بهذا التحديد —

(١) فى مقاله المنشور بمجلة Pet. Mitt. فى سنة ١٩٠٨ ص ١٤٧ .

مرتفع وكل مافى أفريقية السفلى منخفض وإنما هذا تمييز نسبي . ففي أفريقية العليا منخفضات وعلى الأخص السهول الساحلية لشرق أفريقية كما أن فى أفريقية السفلى مرتفعات قائمة فى وسطها كجبال النوبا ودارفور وجبال تبستى وغيرها .

ويفصل حوض نهر النيل عن حوض الكنفو أولاً جبال مغمبير وحيث تقع أكثر منابع نهر كاجيرا . وهى التى تفصل حوض بحيرة كيفو عن بحيرة أدورد ، ثم يمر الفاصل المائى غرب بحيرة أدورد ونهر السمليكى وألبرت دون أن يبعد عنها كثيراً ، بل هو ملاصق جداً لبحيرة ألبرت ؛ ثم عند شمالها يتبعد الفاصل المائى ويسير فى اتجاه شمالى غربى إلى المرتفعات التى تصل بين بحر الغزال وجداوله وبين نهر أوبانجى وروافده .

وهذه المرتفعات هى بوجه التقريب الحد الفاصل بين بلاد الكونفو البلجيكية والسودان . فالحدود الطبيعية والسياسية متفقة : اللهم إلا فى منطقة نهر السمليكى . فإن الفاصل المائى بين النيل والكونفو ليس هو الحد السياسى بين أوغنده وبلاد الكنفو ، وإنما الحد السياسى هو قمم جبال رونزورى . ولهذا كان قسم عظيم من مجرى نهر السمليكى واقعاً فى حيز المستعمرة البلجيكية . كما أن الحدود السياسية تقطع بمجرتى أدورد وألبرت تاركة شطراً كبيراً من هاتين البحيرتين فى داخل مستعمرة الكنفو .

ويفصل بحر الغزال وروافده عن حوض بحيرة تشاد ونهر شارى وروافده تلال فريت ثم مرتفعات دارفور . وهذه كلها امتداد للتلال القليلة الارتفاع التى تفصل ما بين النيل والكونفو .

أما فيما وراء دارفور من جهة الشمال إلى البحر الأبيض المتوسط ، فالفاصل المائى غير معين بالدقة ، ومع ذلك قد استكشفت جبال ومرتفعات فى صحراء ليبيا : مثل جبل عوينات (١٨٠٠ متر) وقد يكون من الممكن أن يجعل الحد الغربى لحوض النيل ماراً بهذه الجبال سائراً إلى غرب الواحات الداخلة والفرافرة وسيوه .

وإن يكن هناك جغرافيون يجعلون الحد الغربى لحوض النيل فى مصر ملاصقاً جداً لوادى النيل وسائراً إلى غرب الفيوم وإلى غرب الإسكندرية وهذه المنطقة نظراً لقلة أمطارها ولأنها لا تغذى نهر النيل بشئ من الماء ، يصعب تحديد ما يدخل منها فى حيز حوض النيل .

وفى أقصى الجنوب يحد حوض النيل بتلال بلاد أنيا موزى (بلاد القمر) ولا يجرى من هذه التلال إلى بحيرة فكتوريا سوى جداول قصيرة . . وفى شرق بحيرة فكتوريا مرتفعات هى الحافة الغربية للأخدود الأفريقى الكبير وهذه المرتفعات هى التى تفصل مياه فكتوريا وروافدها عن مياه المنخفض الممثلة فى بعض البحيرات مثل نظرون ونيفاشة وغيرها . ثم تمتد حدود حوض النيل الشرقية إلى جبال شرانغانى وإلغون ثم إلى غربى بحيرة رودلف (أو باسوناروك) . ويفصل نهر أومى وهو أكبر أنهار رودلف عن أعلى نهر السوبات تلال قليلة الارتفاع . ومن بعدها يصبح الحد الشرقى لحوض نهر النيل هو الحد الشرقى لهضبة الحبشة ، وهو فى الوقت نفسه الحد الغربى للأخدود الأفريقى الكبير . ومرتفعات غرب البحر الأحمر يمكن أن تعتبر بمثابة الامتداد الشمالى لحافة هذا الأخدود .

فالحد الشرقى لحوض نهر النيل فى بلاد السودان والنوبة ومصر هو مرتفعات البحر الأحمر ، حتى إذا جاوزنا خليج السويس وانتهت تلك المرتفعات كان الحد الشرقى لحوض النيل هو مرتفعات شبه جزيرة سيناء . . وليس الفاصل بين أنهار فلسطين ومصر كبيراً بل إن الحد الشرقى لحوض النيل واقع غير بعيد من فلسطين^(١) . ولا يمنع من هذا وجود قناة السويس . فإن طبيعة انحدار الأرض وتضاريسها تجعل الحد الشرقى لحوض النيل واقعاً شرق القناة بمسافة كبيرة^(٢) .

(١) ما بين حوض النيل وفلسطين أودية تنحدر نحو البحر المتوسط أشهرها وادى العريش ، لها مجراها الخاص وأحواضها المستقلة ، وإن كان وجودها اليوم لا ينفى اتساع حوض النيل نحو الشرق فى زمن متقدم .

(٢) من الخطأ الحسم ما يقع فيه بعض الكتاب إذ يعدون القناة الصناعية حداً للدلتا أو لشبه جزيرة سيناء ، أو لأية ظاهرة جغرافية طبيعية .

هذه هي حدود حوض النيل على وجه الاختصار ، ويرى القارىء أن الفاصل المائى فى كثير من المواضع قليل الارتفاع جداً حتى فى أعلى النيل وعند منابعه . وكثيراً ما تكون المسافة التى تفصل ما بين منابع بحر الفزال وروافده من جهة و منابع نهر أوبانجى وروافده من جهة أخرى صغيرة جداً لا تتجاوز بضعة الأمتار . وكذلك الحال فيما بين منابع نهر أومى والسوبات و بين بحر العرب ونهر شارى .

بقى أن نختتم هذا التمهيد بذكر شيء عن بنية أفريقية عامة وحوض النيل بوجه خاص : فإن فى هذا وحده تفسير ما قد يبدو غريباً فى تضاريس القارة . يتكون أكثر القارة الأفريقية — وعلى الأخص وسطها وشرقها وجنوبها — من صخور أركية قد حوّلها تقادم العهد . وتتركب من النايىس وصخور متحولة أخرى . ولقد توجد وسط هذه الطبقات مقذوفات من الصخور النارية القديمة بمقادير هائلة جداً بحيث تكون فى بعض المواضع هى أهم ما تتركب منه القشرة الأرضية . وتعد تلك الصخور جميعاً من أقدم التكوينات ، وهى عظيمة السمك جداً وترجع فى الأرجح إلى ما قبل العصر السكامبرى . ويرى كثير من الجيولوجيين أنها لم تعمرها مياه البحر بل بقيت جزءاً من اليابس طوال الأعصر الجيولوجية . اللهم إلا أطرافها التى ربما طغى عليها المحيط من زمن إلى زمن .

وهذه الطبقات الأركية القديمة شديدة الصلابة واسعة الانتشار . وهى التى لشدتها وصلابتها تمكنت من مقاومة الحركات الأرضية العنيفة التى كونت جبال الألب والهمالايا والأنديز فى الزمن السكاينوزى . وأما فى إفريقية فلم تكن الصخور الأركية عادة من المرونة بحيث تقبل الالتواء . وكان تأثير الحركات التكتونية أن أحدثت بها انصداعاً هائلاً ممتداً من الشمال إلى الجنوب وهو الذى يتكون منه الأخدود الإفريقى الكبير .

والطبقة الأركية المذكورة منتشرة في كل حوض النيل تقريباً . وإذا لم تكن تغطي سطح الأرض دائماً فهي الأساس الذي بنيت فوقه الطبقات الأخرى . فهي منتشرة في كل أواسط إفريقية وأعلى النيل الأبيض وفي كثير من هضبة الحبشة وجبال البحر الأحمر وسينا . وربما غطتها رواسب نهريّة كما هي الحال في بحر الغزال أو مقذوفات بركانية حديثة كما هي الحال في الحبشة أو طبقات جيولوجية أحدث منها كما هي الحال في شمال السودان وفي مصر . حيث تبدو الصخور الأركية من تحت الخرسان النوبي في كثير من المواضع .

كانت القارة الإفريقية في العصر الأول الجيولوجي تتركب من تلك الصخور وكانت في ذلك الوقت متصلة بجزيرة العرب والهند وأستراليا وأمريكا ، وكانت كل هذه الأقطار الشاسعة تؤلف قارة واحدة سماها سوس (Suess) قارة غندوانا . وهذه القارة الجنوبية العظمى بقيت قائمة طول الزمن الأول وجزءاً من الزمن الثاني . ثم أخذت تنفك فانفصلت إفريقية بالتدريج عن كل من أمريكا وآسيا . ثم تكون المحيط الهندي بالتدريج . وكان يغطي القسم الشمالى من إفريقية بحر عظيم اسمه تيثس Tethys ، وقد أخذ هذا البحر ينحسر ويتراجع إلى الشمال في نهاية الزمن الميزوزوى ثم استقر تراجعته في الزمن الثالث (الكينوزوى) حتى انكمش أو تلاشى ثم ظهر بالتدريج البحر الأبيض المتوسط ، كما نعرفه اليوم .

وقد أخذت القارة الإفريقية في أواخر الزمن الثاني تتأثر بهذه العوامل التكتونية التي بدأ مفعولها يظهر في سائر القارات ؛ وكان من نتيجته في إفريقية تكوين الأخاديد الكبرى كما ذكرنا وانقذاف مقادير هائلة جداً من الحمم والصخور النارية من شقوق الأرض ومن فوهات البراكين . وكثير من هذه الجبال المنفردة ليست سوى براكين خامدة قد نشأت من تراكم تلك المقذوفات . ومن هذا الطراز جبل كليانجارو وكينيا والغون وجبال مغمبيرو .

أما الأخدود الإفريقي الكبير ، وأثره في جغرافية حوض النيل ظاهر ، فمقتداه من الجنوب في ناتال . ومن هنالك يتجه شمالاً نحو بحيرة نياسا . وهذه أول البحيرات الكبرى الواقعة وسط الأخدود . وفي شمالها يتفرع الأخدود إلى فرعين شرق وغربي فيذهب الشرق مخترقاً بلاد تنجنيقا وكينيا إلى بحيرة روداف ، وهي واقعة وسط الأخدود ؛ ثم يتجه نحو الشمال الشرق ماراً وسط بلاد الجلال إلى خليج عدن . وهناك يتغير اتجاه الأخدود مرة واحدة فيصبح نحو الشمال الغربي . وهذا هو أخدود البحر الأحمر الذي ينتهي إلى خليج العقبة وإلى أخدود البحر الميت ونهر الأردن في فلسطين وسورية .

والفرع الغربي لهذا الأخدود الكبير يتجه من شمال بحيرة نياسا إلى بحيرة تنجنيقا وهي واقعة في وسطه وكذلك يضم الأخدود بحيرات كيفو وإدورد والبرت ونهر السمليكي وبحر الجبل إلى ما بعد غندكرو . وليس في العالم كله نظير لهذا الأخدود الهائل الذي أثر في بنية الكرة الأرضية في مساحة تبلغ خمس محيطها . والأخدود مزدوج التركيب أي أنه نشأ عن انكسارين في القشرة متوازيين تقريباً . ثم هبطت القشرة الأرضية فيما بينهما فبقيت حافتا الأخدود مرتفعتين وبينهما سلسلة أودية عميقة ، وإن تكن تختلف في العمق من مكان إلى آخر . وفي بعض الأقطار ربما يكون الأخدود غير ظاهر الأثر في تضاريس البلاد . ولكن لا تلبث آثاره أن تعود إلى الظهور بشكل واضح جداً .

وأكثر تكون هذا الأخدود العظيم كان في طول العصر الكينوزوي من أوله إلى آخره . وبعض الجيولوجيين يرى أن هذا التكوين لا يزال مستمراً في بعض أقسام الأخدود^(١) . وقد كان تكون هذا الأخدود الهائل مصحوباً بأحوال زلزالية وبركانية . ومقدوفات من الصخور النارية المنتشرة حوله وفي وسطه

(١) راجع كرنكل : E. Krenkel : Geologie Afrikas ص ٢٣٠ .

الفصل الثالث

مصادر النيل الاستوائية

تقع منابع النيل الاستوائية في هضبة أطلقوا عليها اسم هضبة البحيرات ، لأن فيها خمس بحيرات كبيرة كلها متصل بالنيل . ويزيد ارتفاع هذه الهضبة على ألف ومائتي متر في المتوسط وإن يكن فيها تلال وجبال وبراكين خامدة ونصف خامدة ومناطق جبلية أخرى يزيد ارتفاعها على الهضبة كثيراً . والبحيرات التي بها على نوعين : بحيرات أخدودية وهي الواقعة وسط الأخدود الغربي ، وهذه هي بحيرات إدورد وجورج والبرت ؛ وبحيرات انخفضت واقعة في منخفضات من الأرض تجمت فيها المياه . ومن هذا النوع بحيرة فكتوريا وكيوجا . وفي الهضبة عدا هذه البحيرات مستنقعات وبطائح منتشرة على الأخص فيما بين فكتوريا والأخدود الغربي وفي وادي نهر كاجيرا ؛ لكن البحيرات الخمس المذكورة هي أهمها . وبعضها من أهم بحيرات العالم .

بحيرة فكتوريا :

وبحيرة فكتوريا — أكبر بحيرات الدنيا القديمة — واقعة في منطقة منخفضة في وسط الهضبة الاستوائية . وإليها تنحدر أكثر مياه هذه الهضبة وهي تمتد من شمالى خط استواء بنصف درجة تقريباً إلى العرض الثالث جنوباً . وتبلغ مساحتها نحو ٦٩٠٠٠ من الكيلومترات المربعة (٢٦٨٢٨ ميلاً مربعاً) وأكبر طول لها من الشمال إلى الجنوب نحو ٣٢٠ كيلومتراً وأكبر عرض لها ٢٧٥ كيلومتراً .

وساحلها الغربي مستقيم تقريباً بينما بقية سواحلها كثيرة التعاريج والخلجان ففي

شمالها خليج نابليون^(١) ، بالقرب من مخرج النيل من البحيرة : وفي الشمال الشرقى خليج كافرندو وهو طويل ضيق المدخل قليل العمق : وفي الجنوب الشرقى خليج اسبيك وفي الجنوب خليج ضيق صغير اسمه سمث سوند وهو أول نقطة استكشفها اسبيك ، وفي الجنوب الغربى خليج أمين باشا .

ومقوسط عمق البحيرة يبلغ الأربعين متراً وأبعد غورها يبلغ زهاء الثمانين متراً . فهي إذن ليست بالكثيرة العمق إذا قيست إلى بعض البحيرات الأخدودية العظمى كتجنجنيقا التي عمقها أكثر من ١٤٣٠ متراً

وسطح بحيرة فكتوريا يعلو بنحو ١١٣٥ متراً على سطح البحر . هذه حقيقة هامة جداً في جغرافية نهر النيل ، لأن بحيرة فكتوريا هي الخزان الأكبر لمياه المنابع الاستوائية : وهي التي تمد النهر في مجراه الأعلى ، ولو ذكرنا أن طول النيل يزيد على ٦٠٠٠ كيلومتر . فليس بمساعد للنهر على سرعة الجريان ألا يكون ارتفاع مياهه العليا أكثر من ذلك القدر . . . ولكي ندرك هذه النقطة لنذكر أن نهراً كالرون تتجمع مياهه في بحيرة جنيفا وارتفاعها عن سطح البحر ٣٧٥ متراً ثم يجرى إلى البحر الأبيض المتوسط ، وبين تلك البحيرة والبحر نحو ٦٠٠ كيلومتر فبالنسبة إلى طول النيل كانت بحيرة فكتوريا على هذا القياس يجب أن يكون ارتفاعها نحو ٣٧٥٠ متراً فوق سطح البحر . . . فالنيل الأبيض بالنسبة للرون إذن نهر ضعيف الانحدار :

وبحيرة فكتوريا كثيرة الجزر التي تحف بسواحلها في جميع الجهات : وهي تحتل ما يقرب من ٣٧ في المائة من مساحة البحيرة . وهي تختلف في الحجم فمنها ما هو عبارة عن صخرة ناتئة من فوق الماء ؛ ومنها ما هو ذو مساحة عظيمة بحيث يكون إقليماً صغيراً داخل البحيرة ، ذا تربة خصبة ومروج معشية . . . وأكبر هذه الجزر جزيرة أوكروى Ukerewe . الواقعة في الجنوب والتابعة لبلاد تانجانيقا .

(١) سمي باسم نابليون الثالث إمبراطور فرنسا مجاملة من المكتشف .

ولقد كانت هذه الجزيرة ذات شهرة كبرى في وقت الاستكشافات حتى إن بحيرة فكتوريا كانت تسمى باسمها . . والساحل الشمالى للبحيرة تكتنفه الجزر من أوله إلى آخره تقريباً بحيث تكون أمامه بمثابة وقاية من الأمواج الشديدة . والملاحه



(شكل ٢)

الساحلية في الشمال سهلة جداً لهذا السبب حتى للزوارق الصغيرة . ومن أهمها جزر بوفوما Buvuma المقابلة لمخرج النيل .

وفي مقابل الساحل الشمالى الغربى جزر عديدة متجمعة تدعى جزر سيزى Sese وعددها نيف وستون تسمى أكبرها جزيرة بوجالا Bugala — وهى تبعد عن الساحل بنحو ثلاثة أميال — ولقد كانت هذه الجزر وغيرها عامرة بالسكان لولا أن فتك مرض النوم بهم اضطر الحكومة لاتخاذ التدابير لمهاجرة سكانها إلى

البلاد الخالية من هذا المرض . ومع هذا فقد أخذ السكان الآن يعودون بعد أن خفت وطأة المرض نوعاً ما .

والأنهار التي تغذى هذه البحيرة كثيرة جداً وتختلف في الحجم وفيما تحمله من الماء . فمن مسيلات قصيرة تجري بالماء عقب سقوط الأمطار ثم تجف عند امتئاعها . إلى أنهار طويلة لا يكاد يخلو منها الماء في أى وقت من أوقات السنة . والساحل الشمالى للبحيرة لا يدخله نهر ولا جدول ، لأنه يتألف من تلال ومرتفعات أعلى من مستوى البحيرة بنحو ١٢٠ إلى ١٥٠ متراً : ومن ورائها أرض سهلة منحدرة إلى الشمال . فالأنهار والجدول التي تتألف من أمطار هذه الجهة تسيل كلها تقريباً إلى الشمال وتصب إما في نهر كافوا أو في بحيرة كيوجا مباشرة . وفي الشمال الشرقى تنحدر إلى البحيرة عدة جداول حاملة بعض ما يتساقط من الأمطار على جنوب جبل الغون والمرتفعات المجاورة له : وأهم هذه نهر انزويا Nzoya : على أن كثيراً من نهيرات جبل الغون تنصرف إلى بحيرة كيوجا .

وخليج كافرنندو نفسه لا تدخله إلا نهيرات قلائل قصيرة ، ويرى بعض الباحثين أن هذا الخليج هو نفسه حوض نهر صغير من نهيرات فكتوريا قد انخفض حتى غمرته مياه البحيرة . وإلى جنوب هذا الخليج تنصب عدة أنهار في الجانب الشرقى للبحيرة وهي تنحدر من الحافة الغربية للأخدود الأعظم ومن هذه الأنهار نهر كوجا Kuja ونهر مارا Mara ونهر روانا Ruwana وأما الأنهار التي تسيل إلى البحيرة من الجنوب فأقصر جداً وأقل أهمية من أنهارها الشرقية ، ما عدا نهر سيميو Simiyu الذي يسيل إلى خليج امبيك فإنه نهر دائم يجري فيه الماء طول السنة وكثير من النهيرات التي تغذى بحيرة فكتوريا تكتنفها المستنقعات خصوصاً في مجراها الأدنى وينبت في جوانبها وقاعها كثير من الحشائش المائية والبردى .

والأنهار التي تصب في البحيرة من الجهة الغربية قليلة الأهمية اللهم إلا نهراً واحداً ذا أهمية كبرى وهو نهر الكاجيرا .

هذا النهر البالغ طوله نحو ٦٧٠ كيلومتراً ينبع من منطقتين الأولى قريبة من شرق بحيرة تانجانيقا على خط عرض ٤° جنوباً وهذه هي أبعد نقطة جنوبية يستمد منها النيل ماءه . واسم النهر هنا نهر روفوفو Ruvuvu ومجره من الجنوب إلى الشمال . والرافد الآخر هو نهر نيافارونجو : وينبع بالقرب من بحيرة كيفو ومن جبال مفييرو ، ثم يجري أولاً إلى الشمال ثم إلى الجنوب الشرق ويسيل وسط سلسلة من البحيرات والمستنقعات الصغيرة ثم يلتقي بنهر روفوفو ويجري إلى الشمال حتى خط عرض ١° جنوب خط الاستواء وهناك ينحني النهر إلى الشرق وينصرف إلى بحيرة فكتوريا ويقال عن نهر الكاجيرا إنه يحاكي نهر النيل بأن مجراه الأعلى جبلي ثم مجراه الأوسط ملائ بالمتنقعات والبطائح ومجره الأدنى أسرع جرياناً من مجراه الأوسط ثم ينصب بدلاً مصفرة في بحيرة فكتوريا ويكون مجراه هنا قليل العمق مملوءاً بالرواسب .

وظاهر من هذا الوصف ومن شكل النهر والزوايا الكثيرة في مجراه أنه كانت له تطورات كثيرة قبل أن يتخذ شكله الحالي . ويرى فورتو^(١) أن هذا النهر قد اتحد مجراه الأعلى والأدنى حديثاً . ومن قبل هذا كان الجرى الأعلى مستقلاً وينصب في تلك البحيرات الصغيرة التي أهمها بحيرة إهيا . فلما كان الانخفاض الموجودة فيه اليوم بحيرة فكتوريا كان هذا باعثاً لتجديد قوة أنهار كثيرة ومنها نهر كاجيرا الأسفل الذي تسنى له أن يأسر النهر الأعلى . وهذا التعليل من غير شك يفسر كثيراً من ظاهرات مجرى نهر كاجيرا وخصائصه . ونهر كاجيرا هو أطول روافد بحيرة فكتوريا . ويقال مبالغة في أهميته إن هنالك تياراً محسوساً من مصبه في البحيرة إلى مخرج نهر النيل منها . ولكن هذا

بعيد التصور لأن ما يحمله نهر كاجيرا إليها ليس إلا جزءاً يسيراً جداً مما يصل إلى البحيرة من السيول والجداول الأخرى .

ربما كان هنالك تيار محسوس عند مصب كاجيرا نتيجة انصباب مائه في البحيرة .. وربما كان هنالك تيار آخر عند مخرج النيل من خليج نابليون ، بسبب انحدار الماء بسرعة عند شلالات رييون . أما أن هذين التيارين متصلان فأمر متعذر تصوره إن لم يكن مستحيلاً بقاءا لقلة ما يأتي به نهر كاجيرا بالنسبة لما يخرج من البحيرة .

وما سوى نهر كاجيرا من الأنهار التي تصب في بحيرة فكتوريا من الجهة الغربية ليس بذى شأن كبير .

ومياه بحيرة فكتوريا عذبة . ويبدو لونها أزرق اللهم إلا في خليج ضيق كخليج كافرنندو فيكون لونها أكدر . وفي بعض أرجاء البحيرة نافورات يرتفع منها الماء فوق سطحها : والبحيرة كذلك عرضة لأن تهب عليها العواصف فجأة فتتحرك مياهها وتثير فيها أمواجا عالية .

ذكرنا من قبل أن مستوى بحيرة فكتوريا هو ١١٣٥ مترا فوق سطح البحر . وهذا بالطبع هو متوسط مستواها . وهو ليس على حالة واحدة . ويختلف سطح البحيرة من حيث الارتفاع والهبوط من آن لآن . وهذا الاختلاف على أربعة أنواع :

أولها يومي ، والثاني موسمي ، والثالث ما بين فترات تعد بالسنين ، والرابع جيولوجي . فأما الأول فربما كان سببه الأهم هو هبوب الرياح . فإن بحيرة فكتوريا نظراً لعظم اتساعها تحدث تيارات بحرية وبرية كنسيم البحر والبر المعروفين والأولى تدفع الماء فيتزايد في السواحل التي تهب عليها الرياح ، وإذا كان هنالك رياح أخرى من غير هذا النوع تهب ساعات متوالية في اتجاه خاص فلا بد لها أن تؤثر

تأثيراً محسوساً في مستوى البحيرة عند الساحل المعرض لهبوب هذه الرياح . ويرى المستر همرست أن الرياح ليست هي السبب الوحيد بل إن تغير الضغط الجوي فجأة وتأثير الجاذبية ونوعاً من المدّ والجزر كل هذا قد يسبب ارتفاعاً وهبوطاً في سطح البحيرة . على أنه لا يعلم أهمية هذه العوامل كلها في حالة بحيرة فكتوريا . وهذا الاختلاف اليومي في مستوى البحيرة ليس بمطرد الحدوث ولا مقيّد بمواعيد وأوقات خاصة بل إنه يحدث من يوم إلى يوم أو في اليوم واليلة من غير ما نظام ثابت . وقد يصل هذا الاختلاف إلى ٦٠ سنتيمتراً .

أما الاختلاف الموسمي في مستوى البحيرة فسببه بلا شك مناخى ، وهو أعلى ما يكون في مايو ويونيو وأخفض ما يكون في يناير وفبراير على الأخص ، وكذلك في أكتوبر ونوفمبر . هذا الاختلاف هو في المتوسط نحو ٣٠ وقد يبلغ ٦٠ سنتيمتراً .

وقد يزيد مستوى البحيرة سنة من السنين أو عدة سنين متتالية عنه في سنة أو سنين أخرى . وليس لدينا من الاحصائيات التي جمعت في سنين عديدة ما يكفي لأن نحكم بزمنية هذه الظاهرة : وهل تحدث كل عشر سنين أو أكثر أو أقل . ففي سنتي ١٨٩٦ و ٩٧ وفي سنتي ١٩٠٠ و ١٩٠١ ثم في سنتي ١٩٢٢ و ٢٣ كان مستوى البحيرة أقل من المتوسط ، ولكن لا بد من تكرار هذه الظاهرة مراراً عديدة مع دقة القياس والملاحظة قبل أن نبت في أمرها . وقد رأى الأستاذ بروكس Brooks أن هناك ارتباطاً ما بين ظهور الكلف على وجه الشمس وكثرتها وبين ارتفاع مستوى البحيرة . فكلما زاد ذلك الكلف في سنة من السنين ازداد مستوى البحيرة زيادة مماثلة . وهو يرى أن علة هذه العلاقة هو أن التبخر يقل بتأثير هذا الكلف : إذ هناك ما يبعث على الظن بأن كثرتها تكون مصحوبة في الأقطار الاستوائية بانخفاض يسير في درجة الحرارة . فيقل التبخر بسبب هذا ويعلو مستوى البحيرة .

بقيت مسألة تغير مستوى البحيرة في أزمنة جيولوجية مختلفة وهذا ثابت لا يكاد يحتمل الشك . . وقد بحث هذا الموضوع كثير من الجيولوجيين منهم فليكس ازوالد^(١) Felix Oswald وقد أجرى مباحثه في ساحل البحيرة الشرق قرب نهر كوجا فرأى أن هنالك رواسب ساحلية مكونة من حصي مستدير من أحجار الكوارتزيت والنايس . وهذه الرواسب على ارتفاع نحو ١٠٠ قدم فوق سطح البحيرة الحالي . وهي تدل على أن ساحل البحيرة كان أعلى مما هو اليوم بذلك المقدار . . وليس ازوالد بالباحث الوحيد الذي لاحظ مثل هذه الملاحظة بل قد شاهد السر وليم غارستن مثل ذلك تماماً على الساحل الغربي للبحيرة^(٢) . وكذلك لاحظ اسكوت اليوت الظاهرة نفسها^(٣) ، وغلا بعض الكتّاب « هو بلي » فزعم أن بحيرة فكتوريا كانت ممتدة حتى سفح جبل الغون لأنه شاهد كهوفاً وغيراناً في جوانب هذه الجبال تشير إلى فعل المياه . لكن هذا بعيد الحدوث . ومثل هذه الكهوف لا بد قد تكونت بسبب المطر أو الجليد وتأثيرها في إذابة الصخور وتجويفها .

ومع أنه من المرجح جداً أن مستوى البحيرة كان أعلى مما هو اليوم فكذلك من الممكن أن مستواها كان يوماً ما أقل ارتفاعاً مما هو اليوم . والدليل على هذا هو حالة السواحل ، فهي كثيرة التعاريج جداً ؛ وبعض الخلجان ذو شكل وتعاريج تدل على أنه كان حوضاً لنهر ثم غمرته مياه البحيرة^(٤) . ونحن نعلم من دراسة السواحل عامة أنه حيث توجد التعاريج والخلجان الكثيرة فيرجح جداً أن السواحل من النوع المغمور Submerged إذ أننا لا نعلم قوة أخرى سوى قوة التمرية النهرية أو الجليدية يمكن لها أن تكون هذه الخلجان العميقة الكثيرة

(١) نشرت مقالته في جمعية التاريخ الطبيعي لشرق إفريقيا (نايروبي ١٩١٨) .

(٢) راجع تقريره (١٩٠٤) ص ٣٢ و ٣٩ .

(٣) في كتاب Naturalist in Mid-Africa ص ٣٩ .

(٤) راجع جريجوري J. W. Gregory, Rift Valleys, 1920 p. 262 .

التي تنتهى إليها الأنهار ، والاحتمال الوحيد الآخر هو أن تكون هذه السواحل نتيجة انكسارات كما يرى بعض الجيولوجيين أن فيوردات النروج هي إلى حد كبير نتيجة عيوب . وهذا إن صحح في الفيوردات غير مرجح فيما يخص بحيرة فكتوريا التي نرى ظلالها اتجاهات متعددة ومختلفة مع أنها عرضة لعوامل تكتونية واحدة .

إذن فمن المرجح جداً أن البحيرة كانت يوماً أقل في الحجم أو أن مستواها كان أكثر انخفاضاً مما هي عليه اليوم . وثابت كذلك من جهة أخرى ، كما أسلفنا ، أنها كانت ذات مستوى أعلى . فلا مفر لنا والحالة هذه من أن نستنتج أن مستوى البحيرة كان عرضة لتأثرات مختلفة ومتباينة منذ تكوينها ، وأن وجود نافورات في وسطها أحياناً مما يبعث على الظن أنها ، كالمناطق التي هي فيها ، لم تصل بعد إلى حالة التوازن التام والاستقرار .

هذا ولقد كانت بحيرة فكتوريا في عصر الميوسين محتلة نفس المنخفض الذي هي فيه اليوم ولأن مساحتها في ذلك العصر كانت أكبر كما أثبت هذا أزوالد بشكل لا يقبل النقص . وساحل البحيرة الغربي القديم التعاريج هو نتيجة انكسار ممتد من الشمال إلى الجنوب وعلى الأخص جنوب مصب كاجيرا .

نيل فكتوريا وبحيرة كيبوجا :

النيل كسائر الأنهار التي تخرج من بحيرات . له من فكتوريا نيازاً مخرج واحد رغم ما توهمه القدماء والمحدثون . وهذا المخرج في شمال غرب خليج نابليون فوق حاجز من الديوريت فيه انكسار أمكن بواسطته أن تجد مياه البحيرة مخرجاً إلى الشمال . وربما ساعدت التعرية الخلفية لنهر فكتوريا في تكوين وتمهيد هذا المخرج .

الحاجز الديوريتي المذكور يعترض سير النهر على بُعد كيلومتر ونصف من

شمالى بلدة جنجا : فيه ثلاث فتحات يخرج من بينها النيل منحدرًا فوق شلالات

رييون . وهى ليست بذات ارتفاع كبير
إذ لا يزيد ارتفاعها على خمسة أمتار . وبعد هذه
الشلالات يجرى النهر بسرعة ما بين عدد عظيم
من الجزر الصغيرة والصخور ويكتنف مجراه
كثير من الجنادل والمنحدرات . وهو كثير
العمق مرتفع الجانبين سريع الجريان غير صالح
للملاحة إلى مسافة ٦٠ كيلو مترا وعن يمينه
بلاد بوسوغا (Busoga) وعن يساره بلاد
بوغنده Buganda وتحف بكلا جانبيه
الغابات الكثيفة .

(١) شلالات رييون
(٢) بحيرة كيوجا



وعلى بعد خمسة وسبعين كيلو مترا من
شلالات رييون يصل النيل إلى بلدة نماسغالى
Namasagali ويقرب من بحيرة كيوجا .
وهنا يتغير النيل فجأة . فمن نهر سريع جياش
محدد ضيق المجرى بعيد الغور ، إلى نهر بطيء
الجريان ، يبلغ اتساعه نحو ٦٠٠ متر .
ومتوسط عمقه متران أو ثلاثة^(١) . وكأن

النيل هنا وقد فاجأته الشيوخوخة وهو لم يزل بعد فى أول عنفوانه . أو كأن نيل
فكتورييا باقترابه من بحيرة كيوجا قد اقترب من مصبه الأخير ونهاية جريانه . .
هذه الظاهرة التى تتكرر عدة مرار فى مجرى النيل يجب التنبه لها ، لأنها ذات
أهمية فى تقرير نشأة وتطور النهر .


(١) تقرير المستر هرمت من ٢٣ (١٩٢٥) .

بعد نماسغالى يسير النيل فى مجرى مخفوف بالمستنقعات وبالنبات المائية و بعد نحو خمسين كيلومترا يصل إلى بحيرة كيوجا . فتزداد المستنقعات ويصبح من المتعذر بل من المستحيل الوصول إلى النهر من الشاطئ^(١) . وسنعود إلى وصف هذه البحيرة . أما نهر النيل نفسه فيدخلها فى نهايتها الغربية . ومجرأ هنا بطيء جدا ولكن من الواضح أنه مجرى مستقل برغم وجوده على حافة البحيرة . والمسافة ما بين مدخل النيل فى بحيرة كيوجا ومخرجه منها نحو ٧٥ كيلومترا (٤٢ ميلا) . وربما تكونت فى مجرى النيل فى هذه المنطقة سدود كما يحدث فى نهاية بحر الجبل . وفى أواخر سنة ١٩١٧ تكونت كتلة من السدود طولها نحوها ١٧٢ كيلومترا . وقد تعطلت الملاحة بسببها فترة من الزمن .

وبعد أن يدخل النيل بحيرة كيوجا بنحو عشرة أميال يلتقى عن يساره بنهر سزيبوا Sezibwa وهو رافد صغير ينبع من المرتفعات الواقعة شمال بحيرة فكتوريا ثم ينحدر شمالا إلى بحيرة كيوجا ومجرأ كثير المستنقعات .

وتتصل كيوجا من جهة الشمال ببحيرة كوانيا Kwania . وهذه يخترقها النيل أيضاً عند حافتها الغربية ، مائلا إلى جهة الشمال الغربى . والمسافة ما بين شلالات رييون ومخرج النيل من بحيرة كوانيا نحو ٢٣٤ كيلومترا . ويجرى النيل بعدها إلى جهة الغرب إلى مسافة ١٧ كيلومترا وهو فى هذه المنطقة الحد الشمالى لبلاد بوغنده . ثم يغير اتجاهه فجأة إلى جهة الشمال فى شكل زاوية حادة عند نقطة اتصاله بنهر كافو ، وهو رافد للنيل ينبع عند الحافة الشرقية لبحيرة ألبرت ثم يتصل بالنيل فى جنوب ميناء ماسندى Masindi Port ومن هذه الميناء طريق يمتد غربا إلى ماسندى وإلى بوتيا با على بحيرة ألبرت . والمسافرون يستخدمون هذا الطريق إلى بحيرة ألبرت حيث تقلهم السفن إلى نغولى . . وهم يفعلون هذا تجنباً لشلالات مرتشيزون التى تجعل الوصول إلى بحيرة ألبرت بواسطة النيل مستحيلا .

واتجاه نهر النيل عند مينا مسندى وما بعدها مباشرة هو اتجاه نهر كافو . واتساع هذا الرافد عند التقائه بالنيل نحو ٣٥٠ مترا . فهو يعادل النهر الأصلي اتساعا . واتجاه الجرى بعد مينا مسندى هو إلى الشمال الشرق إلى نحو عشرين كيلو مترا ثم إلى الشمال حتى يصل إلى بلدة فويرا على الجانب الأيسر ومينا أتورا على الجانب الأيمن وهنا يتصل بنهر توشى الذى يجرى من الشمال . ومن هنا يتغير مجرى النهر فيصبح من الشرق إلى الغرب . ويصبح غير صالح للملاحة إذ يدخل تحت نفوذ منطقة شلالات مرتشيزون .



(شكل ٤) الطرف الشمالى لهضبة البحيرات

بعد فويرا بنحو عشرة كيلو مترات يصل النهر إلى أول منطقة الشلالات وهى جنادل كروما (Karuma) حيث يعترض مجرى النهر حاجز صخرى ارتفاعه نحو مترين ويعقبها عدة جنادل تشابهها حتى يصل النهر إلى مساقط مرتشيزون حيث ينقض النيل انقضاضا فى مرات متعاقبة . وهذه المساقط واقعة على الحافة

الشرقية لأخدود ألبرت . وعند اقتراب النيل منها يضيق مجراه إلى ١٥٠ مترًا حتى إذا بلغ المساقط نفسها لم يعد اتساعه أكثر من ثمانية أمتار ، وهنا يجيش جأشه ويهوى بسرعة هائلة ويسقط من ارتفاع شاهق قدره نحو الأربعين مترًا . ولقوة السقوط يتصاعد الرذاذ في الهواء إلى مئات الأمتار فيحلل الضوء كأنه قوس قزح . ويتساقط كالطر على الصخور المجاورة للنهر . وعند سقوط المياه فوق الجنادل تقتل آلاف الأسماك . وفي سفح المساقط ما لا يحصى عديدته من التماسيح ^(١) .

وتبعد مساقط مرتشيزون بنحو ٢٥ كيلو مترًا عن بحيرة ألبرت . ومن بعدها يتسع مجرى النيل إلى ١٠٠ متر ثم إلى ٥٠٠ متر . وغير بعيد من المساقط بلدة فاجاو (Fajao) على الضفة اليسرى للنهر . وهنا كانت تعبر القوافل الذهبية ما بين السودان وأوغنده في الزمن الأول . ومن بعد فجاو بقليل يأخذ مجرى النهر في الاتساع وتمود المستنقعات إلى الظهور عن جانبيه . إذ يقترب النهر من بحيرة ألبرت تظهر في مجراه كتل السدود ويصير مجراه بطيئًا . وعند المصب بالقرب من موقع بلدة مجنغو Magungo يكون النهر دالًا يجري منها ماؤه إلى بحيرة ألبرت في نهايتها الشمالية الشرقية . والمسافة بين شلالات رييون وبحيرة ألبرت نحو ٤٤٠ كيلو مترًا (٢٥٠ ميلًا) وما بين فويرا إلى ما بعد الشلالات ينخفض مستوى النهر بنحو ٤٠٠ متر في ٨٠ كيلو مترًا أي بنسبة ١ : ٢٠٠ .

كبرها :

أما بحيرة كيوجا — التي لم يتم وصفها بعد — فهي في الحقيقة عبارة عن الشطر الغربي لسلسلة من البحيرات والمستنقعات الواقعة في منخفض من الأرض فيما بين خطي عرض ٢١ شمالًا . وبينها وبين فكتورييا أراض وتلال مرتفعة . وفي شرقها عدة جبال بركانية كجبل الفون وديبازين Debasion وكيزيما . وهي

(١) راجع كتاب أوغنده (ص ٢٣) .

تفصل مياه كيوجا في هذه الجهة عن مياه بحيرة رودلف . وفي غرب بحيرة كيوجا هضاب بوغنده و بونيورو وفي شمالها أرض قليلة الارتفاع تفصل حوضها عن حوض نهر أسوا . . والبحيرة كما قدمنا هي جزء من سلسلة بحيرات . في شمالها منطقة لانجو وشرقها بلاد تيزو المشهورة بزراعة القطن . وفي جنوبها بلاد بوسوغا . . وهذه المنطقة ، ابتداء من بلدة مروي المهجورة ، كانت هي الحد الجنوبي لدولة مصر والسودان في أيام اسماعيل .

وهذه البحيرات كلها أشبه بمستنقعات عظيمة . وهي قليلة العمق (نحو ٤ أو ٦ أمتار) ومستواها منخفض عن مستوى بحيرة فكتوريا بمقدار ٦٠ متراً ومساحتها نحو ٧٥٠٠ كيلو متر مربع . ونظراً لأن البلاد المحيطة بها ذات تربة خصبة وصالحة لكثير من المزروعات قامت حكومة أوغنده بحرف بعض الجارى لتسهيل الملاحة ما بين أطراف البحيرة : وأهم الموانئ عدا ما ذكرنا من قبل بولولو (Bululo) في لانجو في الشمال وآغو (Agu) في الشرق ببلاد تيزو وينجو (Yingo) في الجنوب ببلاد بوسوغا . وهكذا اتصلت أطراف البحيرة بعضها ببعض .

البحيرات الرومندية :

يسمى أحياناً الشطر الغربي لأخدود أفريقية الكبير بأخدود البرت لوقوع بحيرة البرت فيه . وهو يمتاز عن الأخدود الشرقى بأنه أكثر وضوحاً وظهوراً . وواديه المنخفض وجدراناه المرتفعة مستمرة من أوله في جنوب بحيرة تنجانيقا إلى آخره في أدنى بحر الجبل . من غير انقطاع اللهم إلا في شمال بحيرة كيغو حيث يعترض الوادى تلك المجموعة الكبرى من براكين فيرونجا Vironga أو مغمبيرو الحديثة التكوين وهي التي فصلت ما بين بحيرتي كيغو وإدورد وحولت مياه الأولى إلى تنجانيقا بعد أن كانت تنصرف إلى بحيرة إدورد . وفي شمال هذه البراكين يصبح الأخدود الالبرتي جزءاً من حوض النيل ، واقعة فيه بحيرتا إدورد وجورج ونهر السمليكي ورويفداته وبحيرة البرت .

وبحيرة إدورد واقعة جنوب خط الاستواء مباشرة وارتفاعها عن سطح البحر نحو ٩٢٦ مترافى إذن أقل ارتفاعاً من فكتوريا بنحو ٢٢٠ متراً ومساحة سطحها تبلغ ٢٢٠٠ كيلومتر مربع ، وثلاثة أرباع البحيرة واقعة فى حيز بلاد الكنفو البلجيكية . وهى بوضاوية الشكل تقريباً واتجاهها من الجنوب الغربى إلى الشمال الشرقى وسواحلها قليلة التعاريج . وماؤها فيه شىء من الملوحة . وسواحلها الغربية سفوح لمرتفعات وجبال عالية تكون الحافة الغربية للأخدود . ولهذا كانت خالية من المستنقعات ومن السهول الساحلية . أما إلى الجنوب فإن السواحل سهلة منخفضة . ويجرى إلى البحيرة من الجنوب نهر روشورو (Ruchuru) ومدخله فى البحيرة محفوف بالمستنقعات . والساحل الشرقى للبحيرة منخفض أيضاً ومن ورائه على بعد مرتفعات الحد الشرقى للأخدود ، التى يفصلها عن البحيرة سهل ممتد تكسوه الغابات الكثيفة المحيطة بمجارى الجداول والأنهار .

وتصب فى البحيرة أنهار كثيرة غالبها ينبع فى جبال مضمبيرو . وأشهرها روشورو السالف الذكر . وإيشاشا Ishaha وبيرارا Berara وهذه تصب فى الجانب الشرقى فى وسط أعشاب مائية ومستنقعات تجعل الوصول إلى البحيرة من هذه الجهة متعذراً بل مستحيلاً . والقطر المتاخم للبحيرة فى هذه الناحية الجنوبية الشرقية هو قطر كيجيزى Kigesى وهو النهاية الجنوبية الغربية لحماية أوغنده . وفى شماله إقليم انكولى Ankoli وهو أيضاً ملاس لسواحل بحيرة إدورد . ولكنه يختلف عن ساحل كيجيزى بأنه أكثر ارتفاعاً عن سطح البحيرة ، ويبلغ ارتفاع الساحل هنا ١٠٠ أو ١٢٠ متراً .

وإلى جنوب خط الاستواء بنحو اثنتى عشرة دقيقة يدخل بحيرة إدورد بوزاز طويل يدعى بوزاز كازنجا (Kazinga) ويصل ما بينها وبين بحيرة جورج ويفصل ما بين إقليم انكولى جنوباً وطورو (Toro) شمالاً . وساحل بحيرة إدورد ، غربى بوزاز كازنجا ، يتكون من سهول رسوبية عالية يحدها من جهة الشمال

جبال رونزورى التى منها تسيل الجداول والأنهار إلى بحيرة إدورد وجورج .
وأطول هذه الأنهار هو نيامغزاني Nyamgazani الذى يجرى من جنوب تلك
الجبال فى مجرى ضيق عميق فينصب فى شمال بحيرة إدورد .
وفى شمال بحيرة إدورد وعن جانبي بوغاز كازنجا كثير من البحيرات المستديرة
الشكل التى تملأ فوهات براكين خامدة . ولبعض هذه البحيرات أهمية اقتصادية
حيث يستخرج منها ملح الطعام . ومن أشهر هذه البحيرات بحيرة كاتوي
(Katwe) الواقعة شمال بحيرة إدورد مباشرة وقطرها نحو كيلو مترين ، وهى مركز
هام لتجارة الملح .

يلاحظ أن للأخدود اللبترى فرعا صغيراً مبدؤه فى جنوب بحيرة إدورد
واتجاهه إلى الشمال الشرقى وهو يحيط ببخيرة إدورد وبوغاز كازنجا وبحيرة جورج .
والحد الشمالى لهذا الأخدود هو جبال رونزورى نفسها التى تفصل ما بين هذا
الأخدود الفرعى والأخدود الأسمى .
ولهذا كان اتجاه بحيرة إدورد وبوغاز كازنجا وبحيرة جورج كلها مجمعة
يختلف عن الاتجاه الأسمى للأخدود . إذ أنه أكثر ميلا إلى الشمال الشرقى .
وبوغاز كازنجا قناة طبيعية طولها نحو ٤٤ كيلو مترا (٢٥ ميلا) وعرضها
يتراوح ما بين الأربعمائة متر وألف وخمسمائة . ومتوسط عمقها نحو خمسة أمتار .
وجدرانها مرتفعة . ومجرها مستقيم تقريبا فى اتجاه الساحل الجنوبى الشرقى لبحيرة
إدورد . وفى أيام المطر يكون للقناة تيار محسوس يجرى إلى بحيرة إدورد ، وأما فى
زمن الجفاف فالتيار ضعيف جداً . وماؤها يشبه ماء بحيرتى إدورد وجورج بأنه مالح
قليلا ، وعلاوة على ذلك فهو أخضر اللون قليلا . ولعل هذا بتأثير بحيرة جورج .
وبحيرة جورج واقعة فى الطرف الأعلى لبوغاز كازنجا : ولها اسم آخر تعرف
به بين الأهالى وهو دويرو Dueru ، ومساحة سطحها تبلغ نحو ٣٠٠ كيلو متر

مرجع يضاف إليها منطقة مستنقعات تمتد إلى الشمال . وهي قابلة للزيادة والنقصان تبعاً لكثرة سقوط الأمطار أو قلتها . والساحل الغربي فيما يلي مخرج بوزاز كازنجا كثير المستنقعات أيضاً وأما الساحل الشرقى فمرتفع الجوانب جبلى لأنه متاخم للحافة الشرقية للأخدود . وكذلك الساحل الجنوبي الذى تحف به خلجان صغيرة عديدة هى بقايا فوهات بركانية . ومنظر هذه الخلجان جميل جداً . والبحيرة مستديرة الشكل تقريباً اللهم إلا فى الطرف الغربى فإن لها خليجاً طويلاً يمتد إلى الغرب حتى يقترب من سفوح جبال روزورى .

ومستوى سطح البحيرة لا يزيد كثيراً عن مستوى بحيرة إدورد اللهم إلا فى زمن تساقط الأمطار الغزيرة فإن مستوى بحيرة جورج يزيد قليلاً . وتقدر هذه الزيادة بنحو ٤ أمتار وبهذا يتسنى للماء أن ينصرف منها إلى بحيرة إدورد .

نهر السمليكى :

تعتبر بحيرة جورج وبوزاز كازنجا أهم روافد بحيرة إدورد . والنهر الوحيد الذى يخرج من بحيرة إدورد والذى يحمل مياهها إلى نهر النيل هو نهر السمليكى الذى يصل ما بينها وبين بحيرة البرت . وطوله نحو ٢٥٠ كيلو متراً : واقع أكثره فى بلاد الكونغو اللهم إلا الجزء الشمالى منه فإنه يكون الحد ما بين أوغنده والكونغو البلجيكية إلى مسافة طولها نحو ٨٠ كيلو متراً . واتجاه النهر بعد خروجه من بحيرة إدورد مباشرة إلى جهة الشمال لمسافة ٣٥ كيلو متراً (٢٠ ميلاً) ثم يتجه إلى الشمال الغربى مسافة ثمانية وعشرين كيلو متراً ومن بعدها يتجه نحو الشمال الشرقى بقية مجراه .

ولست حالة النهر سواء فى سائر مجراه من بحيرة البرت إلى بحيرة إدورد . فعند خروجه من بحيرة إدورد يكون متسع الجرى بطيئاً كأنما هو فى نهايته لا فى بدايته . وتكون هذه حالته إلى مسافة بعيدة حتى إذا اقترب من بلدة بينى Beni

دخل في منطقة جديدة ، فهنا يضيق مجراه ويشهد انحداره وتكثر جنادله . وفي هذه النقطة أيضاً يأخذ النهر يجري وسط غابات كثيفة اسمها غابات ايتوري Eturi وقد يسمى باسمها النهر أحيانا . وهذه الغابات تكثف النهر في مجراه الأوسط وتمتد شرقا إلى منحدرات رونزوري وغربا تتصل بغابات نهر الكنفو ولا يزال النهر جاريا وسط هذه الغابات الكثيفة حتى يصير على بعد ٣٠ أو ٣٥ كيلومترا من بحيرة البرت . وعند نهاية الغابة من جهة الشمال معبر عند نقطة تقاطع النهر بالطريق الموصلة ما بين فورت بورتال Fort Portal وامبوجا Mbuga .

وفي الجزء الشمالي من مجراه يسيل نهر سمليكي وسط سهل منبسط ، وهنا تقل سرعته ويتسع مجراه إلى ١٠٠ إلى ١٥٠ مترا ويصبح كثير الالتواء والانحناء شأن الأنهار في مجراها الأدنى . وعند مدخله في بحيرة ألبرت يتفرع النهر إلى عدة فروع ، أكثرها ممتلئ بالرواسب قليل العمق ؛ ويصعب جدا من بحيرة البرت أن يتبين الإنسان أيها الفرع الأهم للنهر .

ويحمل بنا قبل أن تم كلامنا عن نهر سمليكي أن نذكر أن مصبه في بحيرة البرت منخفض عن منابعه في بحيرة إدورد بمقدار ٣٠٠ متر تقريبا ، وهو انحدار عظيم لنهر كهذا . ولكن يجب أن لا ننسى أن هذا الانحدار ليس في الجزء الأعلى أو الأسفل للنهر بل إن أكثره في منطقة الجنادل والمدافع عند بدء دخول النهر أقليم الغابات .

بحيرة البرت :

تقع بحيرة البرت ما بين درجة ١° و ٢° ٢٠ شمالا . وأكبر طول لها من الشمال الشرقى إلى الجنوب الغربى نحو ١٧٥ كيلومترا وأكبر عرض لها ٤٥ . ومساحتها نحو ٥٣٠٠ كيلومتر مربع ، ومستواها نحو ٦٢٠ مترا فوق سطح البحر ومتوسط عمقها نحو اثني عشر مترا : وهي قليلة العمق في أقصى الجنوب وأقصى الشمال

حيث يدخلها السليمكي من جهة ، ونيل فكتوريا من جهة أخرى ...
وبحيرة ألبرت واقعة وسط الأخدود الغربى . وهذا ظاهر كل الظهور فى اتجاهها واستقامته وعلى الأخص استقامة ساحلها الغربى . وجوانب البحيرة عالية خالية من المستنقعات إلا فى طرفها الشمالى والجنوبى . وهى خالية كذلك من الجزر . والبحيرة تابع نصفها الشرقى ، وهو الأكبر قليلا ، لأوغندا ونصفها الغربى للسلفو البلجيكى ، ويمجرى الحد الفاصل بين البلدين وسط البحيرة من مصب السليمكى إلى مخرج نيل ألبرت .

وللأخدود الواقعة فى وسطه البحيرة مميزات خاصة . وذلك أن حافته الغربية مرتفعة جدا عن حافته الشرقية : وهى تبدأ بعيدة عن البحيرة فى الطرف الجنوبى ، ثم تقترب منها حتى تصبح السواحل الغربية للبحيرة هى سفوح الجبال والمرتفعات التى تتألف منها حافة الأخدود . والانحدار هنا شديد جداً حتى أنه ليعذر أن يسكن السواحل الغربية أحد اللهم إلا فى مواضع محدودة جداً . ولقد ترتفع جدران الأخدود فى الجهة الغربية إلى نحو ٢٠٠٠ متر أو أكثر ثم يقل ارتفاعها بالتدريج نحو الشمال الشرقى وليس للبحيرة من هذه الناحية أنهار طويلة بل جداول تنحدر إليها بسرعة السيل ، وقد حفرت فى تلك التلال أودية ضيقة عميقة تجرى فيها مسرعة إلى البحيرة ويطلق على هذه المرتفعات الغربية لبحيرة ألبرت اسم تلاع ما هاجى . (Mahagi Escarpt.) .

أما الحافة الشرقية لأخدود ألبرت فإنها مرتفعة فى الجنوب فقط ، ثم يقل ارتفاعها وتصبح دون السواحل الغربية ارتفاعا بكثير . بل إنه كثيراً ما يكون بين ساحل البحيرة وبين المرتفعات الشرقية مسافة نحو عشر كيلومترات فتصبح السواحل عبارة عن سهول رسوبية كونتها الجداول العديدة التى تسيل إلى البحيرة والتى تحمل كثيراً من الطمي والأملاح فترسبها على سواحلها .

وبقرب بلدة كبيرو (Kibero) الواقعة على الساحل الشرقى عدة عيون حارة ونافورات طبيعية يتصاعد منها ماء وبخار . ويسمع صوت ذلك من الأماكن القريبة : وهذا ليس سوى بعض الظواهر الكثيرة التى تشير إلى تأثير هذه الأقاليم بالعوامل البركانية .

هذا ويعزى بحيرة ألبرت نهران كبيران هما نيل فكتوريا والسليكى ويخرج منها نهر واحد هو نيل ألبرت أو بحر الجبل . وعدا نيل فكتوريا ونهر السليكى لا نكاد نرى لهذه البحيرة رافداً آخر ذا شأن . بل كل ما ينصرف إليها سواء من الشرق أو الغرب جداول صغيرة قصيرة المدى ... على أن هذه الجداول لكثرة عددها وسرعة انحدارها تحمل إلى البحيرة مقداراً من الماء لا يستهان به .

والبحيرة مأوها عذب فى الوسط ولكن فيه بعض الملوحة بالقرب من السواحل . وعدا ذلك فإنها عرضة لهبوب أشد العواصف وأقساها فجأة من غير أن يكون هنالك أى إنذار سابق . وهى أكثر تعرضاً لهذه الحال من سائر البحيرات الاستوائية الأخرى . ولعل سبب هذا موقعها بين الجبال الشاهقة التى تؤثر فى اتجاه وقوة التيارات الهوائية .

* * *

تضاريس الرضبة الاستوائية :

إن الأنهار العليا التى تمتد النيل يجرى أكثرها فى أقطار مرتفعة قليلا عن سطح البحيرات ، ولكنها على العموم متشابهة الارتفاع ، شأن جميع الهضاب ، والجهات الجبلية محدودة وأهمها منطقة جبال مضمبيرو ، وروزورى وجبل الغون . وقد سبقت الإشارة إليها جميعاً ، ويحسن أن نذكر شيئاً عنها فى ختام وصفنا للهضبة الاستوائية .

مفيميرو:

في شمال بحيرة كيفو مباشرة تبلغ سعة الأخدود الغربي نحو خمسين كيلومتراً وهناك تعترضه من الشرق إلى الغرب سلسلة من الجبال البركانية الشاخبة ترتفع فجأة من وسط قاع الأخدود فقسده وتغير معالمه . وتصبح هي الظاهرة التضاريسية الهامة في هذا الإقليم . هذه الجبال ، التي تسمى أحياناً بجبال مفيميرو وأوڤرونجا *Virunga* — والاسم الثاني معناه جبل بلغة البلاد — هي عبارة عن ثمانية براكين منتشرة من الشرق إلى الغرب . وليس هنالك شك في أنها حديثة التكوين وأنها كانت السبب في فصل مياه كيفو عن مياه بحيرة إدورد وأمسث لهذا السبب هي الحد الفاصل ما بين بحيرات الكونغو جنوباً وبحيرات النيل شمالاً . وتقسم هذه الجبال إلى مجموعات ثلاث شرقية ووسطى وغربية .

فالشرقية منها تتألف من جبل موهاورا *Muhawura* وارتفاعه ٤١٣٠ (ولعل هذا الاسم هو الذي شوّهه سبيك وستانلي وجملاه مفيميرو) . فجبل مجاهنجا *Mgahinga* وارتفاعه ٣٤٧٥ متراً وفي أعلاه فوهة متسعة يبلغ قطرها نحو ٣٠٠ متر وعمقها نحو ١٠٠ متر تجمّع فيها المياه في بحيرة يسيل منها جدول على المنحدرات الجنوبية الغربية لذلك الجبل . وإلى غربه جبل صابنيو *Sabinio* وارتفاعه ٣٧٠٤ متر ويصل ما بينهما بكتف يجعل هذين الجبلين كالتوأمين .

(شكل ٥) منظر عام الجبال مفيميرو نقلا عن صورة فوتوغرافية



والجبال الوسطى منها هي من الشرق إلى الغرب جبل ويسوكي Wisokey (٣٨١٤ متراً) وميكنو Mikenno (٤٣٨٠ متراً) وكاريسيمبي Karissimbi (٤٥٠٠ متراً). وهذا الأخير هو أعلى هذه الجبال كلها وشكاه مخروط جميل متناسق البناء ولشدة ارتفاعه تكسو قمته الثلوج عادة ولكنها تنجذب عنه أحياناً^(١). والجموعة الغربية تتألف من بركانين هما نيرا جنجو Niragongo وارتفاعه ٣٤٧١ متراً ونملاجيرا Namlagira وارتفاعه نحو ٣٠٦٣ متراً. وكلاهما لم يزل بركاناً في حالة نشاط وقد يخرج من فوهتهما الدخان والبخار من حين إلى آخر. ولقد ثار نملاجيرا في سنة ١٩١٢ وخرجت منه حمم ورماد بمقادير هائلة وسالت اللافا من فوهته منحدره إلى الجنوب حتى وصلت إلى بحيرة كيفو فارتفعت حرارة مائها إلى درجة ٦٥° بتأثير هذه المقذوفات^(٢). وليس أدل على حداثة هذه الجبال من هذه الحال. ولم تزل هذه الأقطار في حالة وتطور وتغير. والمياه التي تسيل من منحدرات جبال مغمبيرو ينصرف بعضها شمالاً إلى بحيرة ادورد وبعضها جنوباً إلى بحيرة كيفو وكثير منها ينصرف شرقاً إلى النهرات التي تمتد نهر كاجيرا...

هذا وفي شمال تلك الجبال يعود الأخدود إلى الظهور بشكله المعروف وقاعه المنخفض وجداريه المرتفعين في الشرق والغرب فلا تزال هذه الحالة واضحة إلى ما بعد بحيرة البرت وأعلى بحر الجبل. ويمكننا أن نعتبر جبال مغمبيرو هي الحائل الوحيد الذي يعترض الأخدود الغربي ويقطع خط استمرارة.

روزي : :

إذا كانت جبال مغمبيرو من غير شك بركانية النشأة ومتركة من مقذوفات

(١) قارن كرنسكل ، جيولوجية افريقية Geologie Afrikas ص ٢٦١ و ٢٦٢ وكذلك كتاب أوغنده المطبوع في لندن (١٩١٨) Handbook of Uganda ص ٤٦ بتقرير هرست الجزء الثاني (القاهرة ١٩٢٧) ص ٢٠ .

(٢) كرنسكل نفس الموضوع .

بركانية وكان ارتفاعها الشاهق سببه تراكم تلك المقذوفات. فإن جبال روززورى تختلف عنها وعن كثير من جبال أواسط أفريقية بأنها ليست بركانية النشأة. وإذا كان بها بعض الصخور البركانية فإن أكثر صخورها من نفس صخور الناييس والشست التى يتكون منها أكثر الهضبة الأفريقية، كذلك لا يمكن أن تكون جبال روززورى مجرد حافة للأخدود الغربى. وإذا افترضنا أنها هورست Horst أى أنها بقيت قائمة عالية (ولا ننس أن ارتفاعها أكثر من ٥٠٠٠ متر) لهبوط ما حولها. فلا بد لنا، كما يقول كرنكل، أن نفترض أن جميع القارة الأفريقية قد هبطت من حولها^(١). والأصح أن نعتبرها منطقة جبال التوائية نتيجة ارتفاع فى القشرة الأرضية؛ وإن كان هذا النوع من الجبال نادر الوجود جداً بل غير معروف فى الهضبة الأفريقية؛ وعلى الأخص فى أواسط أفريقية، ولكنه نوع واسع الانتشار فى العالم. وقد يرى بعض الجيولوجيين أن تكوين جبال روززورى ماهو إلا الحلقة الأولى من سلسلة حركات فى القشرة الأرضية تنتهى بتكوين سلاسل جبلية كالآلب فى أواسط أفريقية. وسواء صح هذا رأى أو لم يصح. فإنه ثابت تقريباً أن تكوين جبال روززورى حديث العهد أحدث من تكوين جبال الآلب. وكذلك مما لا مجال للشك فيه أن هذا الإقليم كله فى دور تطور وتغير حتى فى الوقت الحاضر. وجبال روززورى تتجه من الجنوب إلى الشمال بانحراف نحو الشمال الشرقى وطولها نحو ١٠٠ كيلومتر وعرضها قد يصل أحياناً إلى خمسين كيلومتراً لكنه يقل تدريجاً نحو الشمال. ومنحدراتها سهلة فى بعض المواضع، ولكنها وعرة جداً فى كثير منها وعلى الأخص فى الجهة الغربية فإن جوانبها المكسوة بالغابات تنحدر انحداراً هائلاً إلى جهة وادى السمليكى. والمنحدرات الشرقية على العموم أسهل وأقل وعورة من الغربية.

(١) كرنكل ص ٢٦١ "Ware ein Horst zwischen Grabenschollen, so musste ganz Afrika an ihm abgesunken sein".

وليست أعلى قمم روزوى بأعلى قمم فى جبال أفريقية حتى ولا فى أواسط أفريقية ، فإن أعلى قممها جبل مرغريرت وارتفاعه ٥١٢٠ متراً فهو أقل مثلاً من كلنجارو وارتفاعه ٦٠١٠ وكنيا وارتفاعه ٥٦٠٠ متر . ولكن روزورى تمتاز بأنها أعلى كتلة جبلية فى أفريقية ، وليست مجرد جبل منفرد كما هى الحال فى كينيا وكلنجارو .

ولشدة ارتفاعها يكسو الجليد الدائم قسماً عظيماً من رؤوسها تبلغ مساحته نحو ٥٥ ميلاً مربعاً ، وهذه القمم الجليدية مقسمة إلى ستة أقسام تفصلها أجزاء خالية من الجليد ... ونظراً لأن الجبال واقعة ما بين خط الاستواء وخط العرض الأول شماله فإن الأنهار الجليدية ليست عظيمة كأنهار جليد المنطقة الباردة . وخط الثلج الدائم قلما ينخفض عن المواضع التى ارتفاعها ٤٥٠٠ متر . ومع ذلك ربما وجد أحياناً فى أودية ارتفاعها نحو ٤٢٠٠ متر .

ومن جهة أخرى فإن هنالك أدلة لا تجحد على أن الجليد كان فيما مضى أكثر انتشاراً فوق روزورى مما هو اليوم ، أى أنه كان هنالك عصر جليدى كما كان لمنطقة الألب وشمال أوروبا وأمريكا . وقد شوهدت آثار الجليد وركامات فى أماكن لا يزيد ارتفاعها عن ١٥٠٠ متر ، وبعيدة كل البعد عن الحد الأدنى للجليد فى الوقت الحاضر .

وجميع ما يسيل من جوانب روزورى من الجداول ينصرف إما جنوباً إلى بحيرتى إدورد وجورج أو شمالاً إلى البرت أو غرباً إلى السمليكي . فجميع ما يتساقط من الأمطار وما يذوب من الجليد وينحدر عن جوانب هذه الجبال تابع لنهر النيل ، ومع هذا فإن قممها هى الحد السياسى بين أوغنده والكنغو البلجيكية .

الغور :

وعدا مغمبيرو وروزورى فإن الجبل الوحيد البارز فى منطقة منابع النيل هو

الغون وارتفاعه نحو ٤٣١١ متراً ، وهو بركان خامد عظيم المساحة يبلغ قطره زهاء الخمسين كيلومتراً . وفي قته فوهة عظيمة محيطها ١٦ كيلومتراً ، وجدرانها سهلة الانحدار عادة وتسكسوها الغابات . . . وإن تكن في بعض المواضع وعرة شديدة الانحدار . ولأهالي طرق للسير ترتفع إلى أعلى الجبل وتخترق فوهته ثم تنحدر إلى الناحية الأخرى من غير مشقة .

ويتركب هذا الجبل العظيم من صخور نارية طفحية فوق أساس من الناييس والصخور المتحولة الأخرى ، وهو يعد من أحدث براكين أفريقيا لأن فوهته لم تزل حافظة لشكلها ولم تُزل معالمها عوامل التعرية كما فعلت مثلاً بفوهة جبل كينيا . ولهذا فإن جري بحورى يعتبر أن الغون قد تم تكوّنه في أوائل العصر الجيولوجي الرابع (البليستوسين ^(١)) .

وأكثر ما يسيل من الجداول على جبل الغون ينحدر إما إلى فكتوريا أو إلى كيوجا ، أو شرقاً إلى نهر التركول Turkwell وهو نفسه ينبع من قمة الغون وينحدر إلى بحيرة رودلف . وإلى شرق الغون كتلة جبلية تشبه اسمها جبال شيرانغانى Cherangani — وإلى شماله جبل آخر اسمه ديباسين Debasiين وكلا هذين ارتفاعه نحو ٣٠٠٠ متر ويسيل منهما جداول تنصرف إما إلى فكتوريا أو إلى كيوجا أو إلى نهر تركول ، وهى كلها تعتبر من جملة المرتفعات التى تفصل بين مياه نيل فكتوريا وبين مياه بحيرة رودلف .

الفصل الرابع

أعلى النيل

بحر الجبل — بحر الزراف — بحر الغزال

يدخل نيل فكتوريا إلى بحيرة ألبرت في طرفها الشمالى الشرقى على النحو الذى ذكرنا من قبل بالقرب من مجنحو . ولقد كانت مجنحو هذه فيما مضى بلدة ذات شأن وهذه كانت حالها عند فتح المصريين لها فى أيام اسماعيل . ولكنها اليوم قد زالت معالمها ولم يبق منها سوى أكواخ صغيرة على الساحل الأيسر للنيل عند مدخله إلى بحيرة ألبرت . ولا يعلم تماماً سر اضمحلال هذه البلدة ، وقد ذكر السر وليام غارستن فى تقريره عن أعلى النيل أن جريان النهر قد سبب تأكل الموضع الذى فيه تلك البلدة خصوصاً أن هنالك تياراً يجرى إلى الجنوب عندما يدخل النهر إلى البحيرة ، وأن هذا التيار قد جار على تربة تلك البلدة حتى أزالها^(١) . على أن النيل إذا كان أزال جزءاً من الأرض عند مدخله إلى بحيرة ألبرت فإنه من جهة أخرى يأتى إليها بمقادير كبيرة من الرواسب حتى إن الأرجاء الشمالية للبحيرة آخذة فى الامتلاء بالطين وعمقها أخذ فى النقصان .

ومخرج النيل من بحيرة ألبرت قريب جداً من مدخله فيها . ومع ذلك لم يذهب الكتاب إلى أن هنالك تياراً محسوساً يجرى من مصب نيل فكتوريا فى بحيرة ألبرت إلى مخرج نيل ألبرت منها . وهذا أولى أن يحدث هنا ، لقرب المسافة وعظم النهر ، من أن يحدث فى بحيرة فكتوريا بين الكاجيرا والنيل . بل إن ما نعلمه يدل على

(١) لعل من أسباب اضمحلالها أيضاً أن الطريق الذى يخترق نيل فكتوريا قد قل خطره بعد إنشاء الطريق المائى من بوتيا إلى نمولى .

أنه لم يشاهد أى تيار فى تلك الناحية منصرفاً إلى جهة الشمال اللهم إلا فى مبدأ نيل ألبرت أى على بعد نحو ٦ كيلو مترات من مجنحو .

يدخل النيل إلى بحيرة ألبرت آتياً من جهة الشرق ومنصرفاً إلى جهة الغرب . ويخرج منها النيل باسم جديد — وهو بحر الجبل ^(١) — منصرفاً إلى الشمال فالشمال الغربى . ويذكر القارىء أن مستوى سطح بحيرة ألبرت إنما هو ٦٢٠ متراً فوق سطح البحر ، وأن منها يبدأ بحر الجبل ، وما قلناه من قبل فى بحيرة فكتوريا وتأثير مستوى سطحها فى مجرى النيل يقال بشكل أقوى وأشد فى تأثير مستوى بحيرة ألبرت . فإن ارتفاع ٦٢٠ متراً عامل ضعف كبير فى نهر تنحدر مياهه إلى البحر على بعد أكثر من أربعة آلاف كيلو متر .

بحر الجبل :

يطلق اسم بحر الجبل على نهر النيل ما بين مخرجه من بحيرة ألبرت جنوباً واتصاله بنهر السوبات شمالاً وهى مسافة طولها نحو ١٢٨٠ كيلو متراً . وبعض الكتاب يجعل نهاية بحر الجبل بحيرة نو ؛ فيكون طوله فى هذه الحال ١١٥٦ كيلو متراً . ويحسن تقسيم مجرى بحر الجبل إلى ثلاثة أقسام لكل منها ميزات وصفات خاصة : الأول فيما بين ألبرت ونمولى وهذا هو الجزء الذى يطلق عليه أحياناً نيل ألبرت ، والثانى فيما بين نمولى وغندوكرو ، والثالث من غندوكرو إلى بحيرة نو : فأما فيما بين ألبرت ونمولى فإن النهر على العموم بطيء الجريان سهل الانحدار جداً صالح للملاحة . ومع أن طوله فى ذلك الجزء نحو ٢١٦ كيلو متراً فإن مجراه لا ينخفض سوى ٨ — ١٠ أمطار ، فدرجة الانحدار والحالة هذه أقل من

(١) من المناسب أن نسمى النهر من بحيرة ألبرت إلى نمولى باسم خاص . وقد فضل غير واحد من الكتاب تسميته هنا بنيل ألبرت قاصرين اسم بحر الجبل على ذلك الجزء من النهر الممتد من نمولى إلى الشمال . ولكننا مضطرون لأن نتبع الاصطلاح الذى تجرى عليه وزارة الأشغال المصرية فى مطبوعاتها الرسمية . وتبعاً لذلك تكون بداية بحر الجبل عند بحيرة ألبرت مباشرة ونهايته عند بحيرة نو .

٤٠٠. وإن تكن أكثر في بعض المواضع منها في البعض الآخر . وأهم خواص بحر الجبل في هذه المنطقة هو أن مجراه يتسع جداً في عدة أماكن حتى يبلغ بضعة كيلو مترات . ويصبح أقرب إلى أن يكون بحيرة من أن يكون نهراً . ثم فيما بين هذه البحيرات يكون مجرى النهر ضيقاً نوعاً . فكان هذا الجزء من نهر النيل عبارة عن سلسلة بحيرات صغيرة قد انتظمها نهر فجعل منها كلها مجرى واحداً . فعلى بعد ٤٠ كيلو متراً من بحيرة ألبرت يتسع النهر ويصبح عبارة عن بحيرة طولها ١٣ كيلو متراً وعرضها يتراوح ما بين واحد وخمسة كيلو مترات ، وهي تدعى بحيرة روبي Rubi — وإلى شمال هذه البحيرة بقليل أى بالقرب من بلدة وادلاي يضيق مجرى النهر بحيث لا يزيد على ١٤٧ متراً . وهذه أضيق نقطة بين ألبرت ونغولى . ومن بعدها يتسع النهر ثانية . وليست كل البحيرات التى يتكون منها النهر باتساع بحيرة روبي . ولكن هنالك بحيرة أخرى بعد الأولى بنحو ٩٠ كيلو متراً ولا يعرف لها اسم خاص . عندها يتسع مجرى النهر ويتشكل بشكل بركة مستطيلة طولها ١٨ كيلو متراً وعرضها نحو ٦ كيلو مترات ؛ ثم من بعد هذا يضيق مجرى النهر حتى يبلغ ٢٥٠ متراً .

وجوانب النهر فيما بعد بحيرة ألبرت ليست دائماً على حالة واحدة فهى تارة مرتفعة وصخرية وطوراً منخفضة تحف بها المستنقعات . وهذه هى الحال بنوع خاص فى الجزء الأوسط ما بين ألبرت ودوفلى حيث يتسع مجرى النهر جداً على النحو الذى ذكرناه وتمتلى جوانب النهر — بل البحيرة التى يتكون منها النهر هنا — بالنباتات المائية والأعشاب من جميع الجهات . ويصبح مسيل النهر الخالى من هذه العقبات لا يتجاوز المائتى متر .

على أنه فى كثير من المواضع تدنو المرتفعات إلى حافة النهر تقريباً . فإن وادى نيل ألبرت ما هو إلا تنمة لأخدود بحيرة ألبرت . وله نفس الاتجاه . ونفس نظام التضاريس ولكن بدرجة مخففة جداً . فالحافة الشرقية ممتدة بحذاء شلالات

مرتشيزون ولكنها تنحرف كثيراً إلى شرق الشمال الشرق بحيث تتسع المسافة بينها وبين بحر الجبل . واللال الشرقية هنا قليلة الارتفاع ولا تسكاد تعلو على مستوى الهضبة إلا قليلاً . أما في الجهة الغربية فإن حافة الأخدود ظاهرة واضحة ويقرب ارتفاعها من ١٢٠٠ متر . وفيها بين وادلاي ودوفلي تدنو المرتفعات الغربية حتى تكون على مقربة من مجرى النهر . وفي نهايتها جبل أوتسي Otze وهو جبل بركاني منفرد تعلو قمته بنحو ٢٠٠٠ متر عن سطح البحر ونظراً لقلّة ارتفاع الأقطار المجاورة كان هذا الجبل بارزاً وظاهراً جداً في المنطقة التي غرب دوفلي . وعند هذه النقطة يبدأ بحر الجبل قبل أن يصل النهر إلى دوفلي Dufilé ويميل في جريانه إلى الشرق ولا يزال محافظاً على هذا الاتجاه حتى يدنو من بلدة نمولي . وهو هنا نهر سريع الجريان لا يزيد اتساعه على ٢٢٠ متراً : وعند اقترابه من بلدة نمولي يتغير اتجاهه فجأة وينحني نحو الشمال الغربي بزاوية قدرها ٧٥° . وهنا يصبح النهر شيئاً آخر مختلفاً كل الاختلاف عما كان عليه منذ خروجه من بحيرة البرت ، وهنا يدخل في منطقة ذات جنادل ومساقط تدل دلالة واضحة على أن النهر هنا حديث التكوين جداً . وفي هذه المنطقة ما بين نمولي (Nimule) والرجاف يصبح النهر غير صالح للملاحة .

بعد نمولي بقليل يعترض مجرى النهر جزيرة صخرية ينحدر بحر الجبل عن جانبيها ، في مجريين الأيسر منهما عديم الأهمية ، والأيمن هو النهر ذو الشأن . وهو هنا يدخل في منطقة شلالات فولاً التي تعدّ أكبر عقبة يجتازها النهر فيما بين بحيرة البرت والبحر المتوسط . فهنا على بعد ستة أو سبعة كيلومترات من نمولي يضيق مجرى النهر جداً بحيث لا يتجاوز ٦٠ متراً ، وينحدر فوق الصخور والجنادل انحداراً شديداً بسرعة عظيمة تحول النهر إلى رغوة وزبد . ثم يعقب هذا مندفع هائل يهوى فيه النهر هويّاً بين جدران عالية ملساء من الصخر الأصم في مجرى لا يزيد اتساعه على ستة عشر متراً . وليتصور القارئ نهرّاً يسيل في مجرى اتساعه

مئات من الأمطار ثم ينقبض فجأة ويضطر لأن يقذف بمياهه تلك في مجرى عرضه بضعة عشر متراً... فلا بد أن تتضاعف سرعته بنسبة انكماش مجراه ، وخصوصاً إذا ساعد على سرعة الجريان شدة الانحدار .

وجدران النهر هنا قائمة رأسية ، يتراوح ارتفاعها بين ٧ و ١٠ أمتار فوق مستوى النهر . وهى من صخر أسود أملس . فنحن هنا أمام مجرى أخدودى حديث العهد جداً : واتجاهه مستقيم بحيث لا يدع مجالاً للشك فى أنه نتيجة انكسار فى منطقة ممتدة من نمولى إلى ما قبل الرجاف بقليل أى مسافة لا تقل عن ١٥٠ كيلو متراً .

ومن بعد جنادل فولاً يتسع مجرى النهر قليلاً ولكن جدرانها دائماً عالية وقد تصل إلى ارتفاع ٨٠ أو ١٠٠ متر^(١) . ويرى إلى الغرب جبال كوكو الممتدة غرباً إلى أن تصبح جزءاً من الفاصل المائى بين النيل والكنغو . وهى تعلو عن مستوى النيل بنحو ١٠٠٠ متر . وجميع المنطقة الواقعة غربى بحر الجبل بين نمولى ومنجلا عبارة عن هضبة فيها عدد غير قليل من الجبال المنفردة (Inselberge) وجبال كوكو هى القسم الجنوبى منها المتاخم للإقليم الذى تسكنه القبائل المسماة بهذا الاسم .

وأما فى شرقى بحر الجبل فهناك جبال لاتوكا وهى أكثر ارتفاعاً من الجبال الغربية وفيها جبل لانجيا ويقرب ارتفاعه من ٣٠٠٠ متر فوق سطح البحر وتكاد ألا تختلف هذه الجبال فى شكلها العام وفى نشأتها البركانية عن الجبال الغربية . هذا وليست جنادل فولاً سوى الحلقة الأولى لسلسلة الجنادل التى تحتل مجرى النهر من بعد نمولى إلى الرجاف ، وجنادل فولاً أقواها وأشدّها مراساً . وقد رأى السر ويليم غارستن أن يقسم سلسلة الجنادل المذكورة إلى خمس حلقات : الأولى فولاً التى تقدم وصفها ، وتليها متدفعات يربورا (Yerbora) على بعد نحو ٥٠

(١) راجع غارستن (ص ٩٩ من الطبعة الإنكليزية) .

وتعد هذه المنطقة من مجرى نهر النيل حديثة التكوين من الوجهة الجيولوجية كما ذكرنا من قبل والزلازل هنا كثيرة الحدوث . وبلدة الرجاف مركز للزلازل ولا يمر عام دون أن تحدث بها زلزلة محسوسة أو أكثر وفي سنة ١٩١٥ حدثت بها عدة زلازل هدمت كثيراً من المنازل . ويقال إنها إنما سميت الرجاف لكثيرة حدوث الزلازل بها وبجبل الرجاف المجاور لها . على أن هذه الرجفات ليست قاصرة عليها . بل كثيراً ما يحس بها في بلاد لاتوكا شرق بحر الجبل وكذلك في الإقليم الغربي . على أن منبعث أكثر هذه الزلازل لا بد أن يكون هو الانكسار المحاذي لنهر النيل الممتد من دوفلى إلى ما بعد الرجاف وموقع بلدة الرجاف قريب جداً من هذا الانكسار فهي إذن أكثر تعرضاً للزلازل ووقعها . وعدا الزلازل فإن هنالك ينابيع حارة تخرج من باطن الصخر . ويوجد مثل هذا الينبوع في شمال جنادل جوجي : وتقع العيون الحارة على بعد كيلومتر ونصف شرق نهر النيل ويفور منها ماء في درجة قريبة من درجة الغليان ثم ينحدر غرباً ويسيل في نهر النيل . والبارى ، سكان هذا الإقليم ، يسمون هذا المسيل بالخور الحار^(١) فهذه المنطقة — وهي الامتداد الشالى للهضبة الاستوائية — لم تزل بعد عرضة للتأثر بالعوامل التكتونية كما هي الحال في كثير من أقطار تلك الهضبة ولم تصل حالة البلاد بعد إلى شيء يشبه الاستقرار والهدوء .

ومن بعد بلدة الرجاف يتغير بحر الجبل بمثل تغيره الفجائى عند بلدة نمولى . فينقلب من نهر جبلى سريع ، متدفق مندفع ، إلى نهر بطيء واسع منخفض الجوانب . . وفي المنطقة التى بين البرت والرجاف تجرى إلى النيل روافد عديدة من حافى الأخدود ومن المرتفعات الشرقية والغربية . . . وأكثر هذه الروافد جداول صخرية الجرى تمتلئ بالماء عقب الأمطار وتندفع فتلقى بمائها في مجرى بحر الجبل ثم تعود أودية جافة لا ماء فيها .

ففي جنوب وادلاى يجرى إلى نهر النيل من المشرق جداول أهمها نهر أتشوا Achwa وأومى Umi : وكلاهما ينبع من جبال لاموجى Lamogi ولقد تنضب مياههما تماما في أيام الجفاف ثم يمتلئان ويعلو مستواهما بسرعة إبان الأمطار. وكلا هذين النهرين يصب في بحيرة روبي التي سبق ذكرها . فالأتشوا يصب في جنوبها والأومى في شمالها . هذان هما أهم نهرين يصبان في شرق بحر الجبل في المنطقة ما بين ألبرت ودوفلى . وسواهما أنهار أخرى تجرى من الهضاب الشرقية إلى بحر الجبل مثل نهر زوكا Zoka — وقد سماه غارستن جوكا Jokka — ثم نهيرات آرى Ari وأسيا Asiya وكابولو Kabulu .

ومقابل دوفلى يصب في بحر الجبل نهر آخر له بعض الأهمية وهو نهر أيوجى Ayugi وهو ينبع من هضاب فاتيكو في منتصف المسافة بين بحيرة كيوجا جنوبا ونمولى شمالا . ويجرى النهر من الجنوب الشرقى إلى الشمال الغربى ، ويوازيه في جريانه من الجنوب إلى الشمال نهر آخر وهو أنيامى Unyamé يصب في بحر الجبل عند بلدة نمولى : واتجاه هذين الجدولين هو نفس اتجاه نهر النيل فيما بعد نمولى . وأما النهيرات التي تصب في نيل ألبرت من الجهة الغربية فكثيرة جدا نكتفي هنا بذكر أسماء أهمها ، وهى نهر أورأ Ora ذو الروافد الكثيرة يسيل من المرتفعات الغربية ويجرى مشرقا حتى يصب في النيل مقابل وادلاى ، ويشابهه في جريانه بقية الروافد الغربية مثل أنهر آلا Alla وأتشو Atchu وأنو Anau وجميع هذه الأنهار تسيل من المرتفعات التي تكون الحافة الغربية للأخدود الألبرتى ، ومن نفس هذه المرتفعات تسيل أيضاً جداول متجهة نحو الغرب والشمال الغربى لتغذى الروافد العليا لنهر الكنفو . والمسافة التي تفصل ما بين نهيرات النيل والكنفو صغيرة جداً ، قد لا تزيد في بعض المواضع على بضعة الأمتار ، وخط تقسيم المياه قليل الوضوح .

فيما بعد نمولى يدخل بحر الجبل من الجنوب الشرقى ومن الشرق أنهار بعضها

ذو أهمية ونذكر منها بنوغ خاص نهر أصوا Asswa ونهر كيت — وهذا الأخير ينبع من جبال أجورو ويجرى إلى الشمال الغربى فيصب في النيل إلى جنوب الرجاف بقليل . والأصوا هو بلا شك أهم روافد النيل فيما بين بحيرتى البرت ونو . ومجره مائل تماماً فى الاتجاه لجرى بحر الجبل ، حتى لقد يتوهم أن بحر الجبل فيما بعد نمولى ليس إلا تنمة للأصوا . ومياه الأصوا العليا تتجمع فى مستنقع كبير يطلق عليه اسم بحيرة كير كبتريك Kirkpatrick وهذه تبعد عن مصب النهر بنحو ٣٠٠ كيلو متر . فمن هذه البحيرة يخرج نهر أصوا متجها نحو الشمال الغربى ، حتى يتصل بالنيل شمال جنادل فولاً . ويكاد يجرى الأصوا ألا يخلو من الماء طول العام . ولو أنه يكون مفعماً بالماء سريع الجريان وشديد العمق فى أيام فيضانه . وذلك لأن مجراه الصخرى الشديد الانحدار يمتلئ عقب الأمطار بسرعة ويصبح النهر غير صالح للملاحة وقت الفيضان . وفيما عدا هذا فإنه صالح للملاحة إلى مسافة نحو ثلاثين كيلومتراً من مصبه . واتساع مجراه عند التقائه ببحر الجبل يبلغ نحو ١٠٠ متر .

وقبل اتصال الأصوا ببحر الجبل يتحد الأصوا مع نهر آخر اسمه أتاپي Atappi وهذا يجرى من المرتفعات الشرقية . وبعد اتصاله بالأصوا يجرى معاً فى خانق مرتفع الجدران عمقه نحو الخمسين متراً وعرضه زهاء المائة — وتكسو جانبيه الغابات الكثيفة .

هذا وليس بعد الرجاف رافد آخر يصب فى النيل من جهة الشرق إلى أن يلتقى بحر الجبل بالسوبات ، ويلاحظ أن كثيراً من الجداول التى تسمى من المنحدرات الشمالية لجبال لاتوكا وأغورو وديندجا — وهى الجبال الممتدة من النيل شرقاً إلى جهة بحيرة رودلف — تلك الجداول لا يجرى معظمها مغرباً إلى النيل ، بل يجرى شمالاً ليتصل بنهيرات السوبات العليا .

أما الروافد التى تغذى بحر الجبل من الجانب الغربى فكثيرة العدد ولكنها

قصيرة المدى وربما كان أهمها نهر كاپا الواقع على حدود السودان وأوغندا ونهر لورى Luri ويصب في النيل مقابل غندوكرو . ونهر جل أوتابارى (Gell or Tapari) ويصب في بحر الجبل شمال بور ، وكما أن كثيراً من نهيرات الشرقية تسيل إلى السواط كذللك كثير من الجداول التي تنحدر من جبال كوكو الغربية ينحدر شمالاً نحو نهيرات بحر الغزال ، أو قد تنتهي إلى غدير فلا تصل إلى النيل .

* * *

يتحول بحر الجبل عند الرجاف ، كما سبق لنا أن ذكرنا ، من نهر جبلى إلى نهر سهلى . وحالة النهر شمال الرجاف تباين تماماً حاله جنوبها . فبعد أن كان نهراً سريعاً قوى التيار شديد الانحدار يجرى بين ضفتين عاليتين تعترضه الجنادل والخوانق أصبح من بعد الرجاف نهراً بطيئاً يسيل وسط مستنقعات في مجرى متسع منخفض جوانبه ويعترض مجراه كثير من الجزر . . . وهى سرعان ما تظهر في مجارى الأنهار حين يهدأ تيارها ويبطؤ جريانها ؛ فتتراكم الرواسب وتتكون تلك الجزر . . . وبدلاً من الغابات التي كانت تحف بالنهر من قبل أصبحت ضفافه لا يكاد ينمو عليها شيء غير نبات البردى والبوص والعمبج^(١) وأضرابها من نبات المستنقات . وقل أن يوجد جزء من النهر فيما بين الرجاف وبحيرة نو يجرى فيه النهر في مجرى واحد . بل القاعدة في تلك المنطقة أن تكون للنهر مجار عدة ، كثير التغير والتحول ، شأن الأنهار حين تسيل في السهول المنخفضة إذ يكون انحدار مجراها ضعيفاً . فإذا امتلأ النهر فاضت جوانبه وإذا دامت الحال تكون مجرى آخر غير الجرى الأول . حتى ليصعب في بعض الأحيان أن تتبين أيها الجرى الرئيسى .

(١) العمبج (أو الطرور) نبات تنمو سيقانه إلى نحو ثلاثة أمتار وسمكها بضعة سنتيمترات . وعند ما يجفف يصير في خفة الفلين ؛ وبعض القبائل (والشك بوجه خاص) يتخذون منه زوارق وذلك بربطه حزماً . ولا يتسع الزورق لأكثر من شخص واحد .

ولئن كانت هذه حالة النهر بعد الرجاف وغندكرو فإنها تصير مثل هذا أضعافاً مضاعفة كلما اقترب من بحيرة نو. إن درجة انحدار النهر من نمولى إلى غندكرو هي ١ : ١٠٩٢ ، وهي ما بين غندكرو وبلدة بور ١ : ٧٠٠٠ ومن بور إلى كنيسة ١ : ١٤,٠٠٠ ومن كنيسة إلى شامبي ١ : ٢٠,٠٠٠ ومن شامبي إلى أدوك (حلة النوير) ١ : ٢٧,٠٠٠ ومنها إلى بحيرة نو ٣٤,٠٠٠ ؛ أى أن مجرى النهر هنا ينخفض متراً واحداً في ٣٤ كيلومتراً. ومعنى هذا أن النهر بطيء الجريان فإذا كان وقت الفيضان فإن مستوى النهر يرتفع حتى يفيض عن جانبيه لأن تياره أضعف من أن يحمل كل المياه التي تأتي من أعلى النهر وقت الفيضان . فليس بمستغرب والحالة هذه أن تزيد المستنقعات زيادة هائلة كلما اقترب النهر من بحيرة نو.

ومن بعد بلدة بور Bor تظهر خاصة النهر هذه بكل وضوح . فيخرج من بحر الجبل فرع صغير اسمه نهر الآتم Atem ثم يعود فيتصل بالنهر عند غابة شامبي وفي شمال هذه البلدة يخرج من النهر مقدار عظيم من الماء فينتشر في المنطقة الواقعة شمال غابة شامبي والملاصقة لضفة النيل اليمنى : وهذه المستنقعات هي التي تمتد بحر الزراف بمائه ، فهو ينبع وسطها . ولهذا قد يعد فرعاً من فروع بحر الجبل . وقد نعهه رافداً من روافده لأنه يعود فيتصل به قبل ملتقى بحر الجبل بالسوبات كما هو معروف . وبحر الزراف كثيراً ما كان يبدو كأنه النهر الرئيسى وقت امتلاء مجرى بحر الجبل بالسدود .

والإقليم الذى بين مجرى الزراف والجبل ليس كله مستنقعات كما كان يتوهم البعض . بل إن هنالك مساحات من الأرض مرتفعة قليلاً يسكنها بعض قبائل النوير والدنكا .

لا حاجة لإطالة الشرح في وصف مجرى النيل ما بين غندكرو إلى بور فشامبي فحلة النوير فنو : فهو في كل تلك المنطقة متشابه لا تقع العين في جزء منه على



(شكل ٨) بحر الجبل في منطقة المستنقعات


منظر إلا عادت فشاهدت هذا المنظر بعينه بعد بضع خطوات : والنهر بطيء ضحل منخفض الجوانب مخفوف بالمستنقعات . وليس هنالك سوى مواضع قليلة تعلو فيها جوانب النهر وعندها توجد عادة قرية أو بلدة : ثم إذا جاوز النهر منطقة شامي : فإن ما يحف به من المستنقعات تصبح بحيرات صغيرة تزيد أيام الفيضان وتنقص في زمن الجفاف . والنهر فيما بينها كثير الالتواء جداً . فلقد ذكر السروليم غارستن أن المرء ربما رأى شراع سفينة تسبح في النهر على مقربة منه لكنه لكثرة التواءات النهر لا بد له من قطع بضعة كيلومترات قبل الوصول إلى تلك السفينة^(١) وليست تلك الالتواءات ولا البحيرات المحيطة بالنهر بمثابة الشكل بل ربما تغيرت من عام لعام . وكل فيضان جديد ربما أوجد بحيرات في مواضع جديدة غير التي أحدثها الفيضان السابق . وقد تغير مجرى النهر كثيراً على الأخص ما بين غندكرو وبور من ١٨٧٤ إلى سنة ١٩٠٣^(٢) .

وهكذا يسيل النهر في تلك المنطقة التي دعيت بحق منطقة المستنقات والتي سميت كذلك بمنطقة السدود لما يتجمع في مجرى النهر من الكتل النباتية مما ينمو في جوانب النهر أو في المستنقعات التي تحف به . تلك هي المنطقة التي بقيت دهرًا طويلاً عقبة تترد أمامها جهود المستطلعين ، وتخذ من منظرها حماسة المستكشفين . وكأين من سائح أو عالم في القرون الأولى أعجبه منظر النيل في مصر ، وأراد استنباط سره ، ثم تعقبه إلى أعالي السودان ، فأسلمه السير والترحال إلى مطقة السدود ، فلم ير فيها سوى مجرى ضعيف تحف به البرك وتملؤه الأعشاب المتراكمة . تنظر العين ذات اليمين وذات الشمال فلا تقع إلا على مستنقع بعد مستنقع ، من ورائه غدير خلفه غدير ، تطفو فوقها جميعاً نباتات ليست ذات منظر جميل ، ولئن كانت على شيء من حسن المنظر فسرعان ما تسأم العين رؤيتها الميل

(١) تقرير السير ويليام جارستن ص ١١٤ .

(٢) راجع كتاب ليونز H.G. Lyons ص ١٠٥ — ١٠٧ والسبب في كثرة تغيير مجرى النهر هنا هو إلقاء الرواسب عند ما يصل النهر إلى منطقة سهلة مستوية فيبطؤ جريانه ولا يقوى على حمل الرواسب .

بعد الميل والفرسخ إثر الفرسخ ... ثم يحاول ذلك السائح أن يسير بزورقه وسط هذا اللابرنث من الغدران : فيعترضه أضغاث متراكمة من نبات البردى والبوص قد تسد مجرى النهر تماماً . فيعود أدراجه وفي صدره من أعلى النيل حسرة المتطلع الذي خابت مقاصده ... تلك إذن هي المفطقة التي أوصدت أمام المستكشفين طريق النيل حتى فتحها محمد علي .



بعد أن يقطع النيل ١١٦٦ كيلو مترا منذ مغادرته بحيرة ألبرت يصل إلى بحيرة نو أو كما يدعوها أهل البلاد « مقرن البحور »^(١) . وهي عبارة عن صفحة متسعة من الماء ، لاتكاد تختلف في طبيعتها عن تلك الغدران العديدة القليلة العمق ، التي تحف بالمجرى الأسفل لبحر الجبل والغزال ، سوى أن مساحتها أعظم ومستواها فوق سطح البحر يبلغ ٣٨٦ مترا . وبحر الجبل لا يصب في بحيرة

(شكل ٩)

نو كما قد يتوهم الأول وهلة ، بل يحف بطرفها الشرق ، دون أن يفقد كيانه أو يتأثر مجراه . بل يستمر تياره واضحاً محسوساً^(٢) .

(١) يطلق اسم مقرن أيضاً على نقطة التقاء النيل الأبيض والأزرق ؛ وهناك محطة للنقل النهري بقرب الخرطوم يطلق عليها هذا الاسم .
(٢) لعل الأصوب أن يقال إن بحيرة نو هي التي تصب في بحر الجبل ، حاملة إليه شطرا يسيراً من مياه بحر الغزال .

ولنقطة التقاء بحر الجبل ببخيرة نو مكان خاص في حساب الأبعاد لنهر النيل وروافده . وذلك لأن وزارة الأشغال المصرية قد اصططلحت على أن تجعل مقاييسها لختلف الأنهار مبنية من بخيرة نو ، حيث تكون نقطة الصفر ، ثم تحسب الأبعاد منها بالكيلومترات أينما ذهبنا نحو بحر الغزال أو الجبل أو النيل الأبيض أو السوبات .

ولعل هذا هو السبب الذي جعل رجال الري يبدأون النيل الأبيض من بخيرة نو . مع أنه ليس هنالك مبرر قوى لأن يتخذ النهر اسماً جديداً . فإلياه لا تزال هي مياه بحر الجبل ، لم تزد فيها بخيرة نو و بحر الغزال إلا جزءاً تافها . ونحن على كل حال لابد لنا أن نجاري رجال الري في مصطلحاتهم لأنهم مرجعنا الأكبر في جغرافية أعلى نهر النيل .

ولكن هذا لا يمنعنا عند متابعة وصفنا للنهر أن نذكر أن النيل ما بين بخيرة نو ونهر السوبات ما هو إلا تمة لبحر الجبل .

وهنالك تغيير واحد خطير نلاحظه عند بخيرة نو . وذلك أن النهر يغير اتجاهه فجأة ، فيجري من الغرب إلى الشرق ؛ ومن الممكن تعليل هذا التغيير بأن الاستمرار في الاتجاه إلى الشمال بات مستحيلاً ، لأن الأرض تأخذ في الارتفاع قليلاً قليلاً ، حتى تبلغ في النهاية إلى مرتفعات النوبا . ومن الجائز أيضاً أن هذا الاتجاه من الغرب إلى الشرق يمثل مجرى مائياً قديماً . ومهما يكن من شيء ، فإن النهر يلتزم هذا الاتجاه من الغرب إلى الشرق حتى يلتقي بالسوبات ، أي مسافة ١٢٠ كيلومترا .

في هذه المسافة تختلف حالة النهر بعض الاختلاف عما كانت عليه في منطقة السدود . فعلى الرغم من أن الأعشاب ونباتات الماء المختلفة لا تزال تحف بجانب النهر ، وتحمل شطراً من مجراه ؛ غير أن المساحة التي تحملها أقل مما هي جنوب بخيرة نو ، والغدران والمستنقعات قلما تتكون على جانبي النهر إلا في زمن الفيضان

ولا تحتل حتى في أعلى الفيضان سوى حيز ضيق ، والصفاف العالية لا تبعذر رؤيتها في أى وقت من الأوقات .

وهناك خور يدعى لول ، يجرى موازياً للنهر من الشمال في هذه المسافة ، ثم يتصل به بعد بلدة تونجا ، وهو رافد قليل ^{الخطورة} . وهناك فرع صغير يتفرع من النهر قبيل التقائه بالسوبات ، ثم يتصل به قبيل سلا كال . ويسمى بحر الحرامى .^ص وترجع التسمية فيما يقال إلى أن هذا الجرى كان يستخدمه تجار الرقيق تجنبها للنهر الرئيسى ، حيث أقيمت المحطات لمراقبتهم والقبض عليهم .

وهناك أخوار أخرى قليلة الأهمية في الجانب الشمالى (الأيسر) من النهر أما من الجهة اليمنى فينصب في بحر الجبل أولا رافد صغير يدعوه أهل البلاد (ميمة السنيورة) نسبة إلى السيدة الكسندرينه تنى Alexandrine Tinné المستكشفة المشهورة التى ارتادت هذه المنطقة في العقد السابع من القرن الماضى . وإلى شرق بحيرة نو بنحو ثمانين كيلو متراً ينصب ماء بحر الزراف في بحر الجبل من الجهة اليمنى .

يجرى بحر الزراف من مستنقعات بحر الجبل شمال غابة شامبي ثم يسيل شمالاً في مجرى كثير الالتواء والانحناء . على أن له ضفتين مرتفعتين قلما تفيض مياهه من فوقهما اللهم إلى في النهاية الشمالية للنهر . فهو يختلف إذن عن مجرى بحر الجبل بأن الغدران والمستنقعات والأعشاب المائية حوله قليلة إلا عند نقطة التقائه ببحر الجبل . ولم يكن بحر الزراف متصلاً في أعلاه بمجرى بحر الجبل اتصالاً مباشراً . ومن حاول من المستكشفين أن يصل إلى بحر الجبل عن طريق الزراف كان يجد صعوبة كبيرة ، لأن مجرى النهرين كانا منفصلين لا يوصل بينهما سوى مياه الفيضان التى تسيل عن جانبي بحر الجبل ويتكون منها مستنقعات وغدران بين مجرى النهرين . ولكن في سنة ١٩١٠ أرسلت الحكومة المصرية أسطولا من السفن ذات (الكراكات) فقام بحفر قناتين ، طولهما نحو أربعة وستة كيلومترات

توصلان ما بين مجرى الجبل والزراف : فأصبح هذا الأخير متصلاً اتصالاً مباشراً
ببحر الجبل في نقطة منتصف المسافة بين غابة شامبي وحلة النوير . وطول بحر
الزراف من تلك النقطة إلى ملتقاه ببحر الجبل نحو ٢٩٠ كيلومتراً .

بحر الغزال :

يطلق اسم بحر الغزال بوجه التخصيص على النهر الذي ما بين مشرع الرق
وبحيرة نوولسكنه بوجه التعميم يطلق على مجموعة الأنهار التي تنحدر من المرتفعات
التي تفصل مياه نهر الأوبلي عن نهر النيل وهذه تتحد كلها وتصب في بحيرة نو ، بعد
أن تفصل بها مياه أنهار تنبع من هضاب دارفور . ولم تزل معلوماتنا الجغرافية عن
إقليم بحر الغزال قليلة نسبياً إذا قورنت إلى ما نعرفه عن سائر جهات أعلى النيل .
إن الجداول والروافد التي تنحدر من الجهة الشمالية والشرقية للمرتفعات الفاصلة
بين حوض الغزال والسكنغو عددها عظيم جداً حتى أن ركوس Reclus نعت
هذه المنطقة ببلاد النهرات Pays des Rivières . وهذا العدد الكبير من
الجدائل يتحد ويكون نحو ثمانية أنهار وهي من الشرق إلى الغرب نهر الياي Yei
ومجرها من الجنوب إلى الشمال ، وينتهي إلى إقليم ممتلئ بالمستنقعات أيام الفيضان
وقد يفنى ماؤه قبل يصل إلى بحر الغزال ، ويشبهه تماماً نهر النعام أو الرهل
Rohl وهو لا يصل إلى النيل كما ذكر بعض الكتاب . وإلى غرب هذين نهر
المريدي Meridi والتنجج Tonj وهما نهران مهمان غير أنهما ينتهيان أيضاً إلى
منطقة المستنقعات التي تحق بمشرع الرق . ومن هذه المستنقعات يبدأ بحر الغزال
ويسيل متجهاً نحو الشمال في مجرى تحف به الغدران ويشبه الجزء الأدنى من بحر
الجبل لكن بشكل مصغر .

وبعد مشرع الرق بنحو ٢٠ ميلاً (نحو ٣٢ كيلومتراً) يتسع بحر الغزال

ويصبح عبارة عن غدير كبير عرضه نحو كيلومترين في طول ١٦ كيلومتراً . واسم هذا الغدير بحيرة عمبادى Ambadi . وبالقرب منها يلتقى بحر الغزال بنهر الجور ولعله أهم أنهار هذه المنطقة كلها . ويتألف نهر الجور من رافدين كبيرين هما نهر سويح Sueh ونهر واو Wau ويتحدان جنوبى بلدة واو بقليل : ونهر الجور والسويح صالحان للملاحة في أيام امتلائهما إلى مسافة نحو ١٠٠ كيلومتراً جنوبى واو . وإلى نهر الجور من جهة الغرب نهر اللول Lol وهو يتألف من اتحاد روافد البونجو Pongo والكورو Kuru والساو Sapo . . . ونهر اللول نفسه يتحد مع بحر العرب قبل أن يتصلا معاً ببحر الغزال على بعد نحو ٥٠ ميلاً (نحو ٨١ كم) شمال مشرع الرق . . . ونحو ١٠٠ ميل (١٦١ كم) من بحيرة نو ، واتجاه مجرى بحر العرب هو من الغرب إلى الشرق ومنابعه بالقرب من حفرة الفحاس ؛ وربما أمده جداول تسيل من جبال مراء وهضاب دارفور .

وجميع أنهار بحر الغزال متشابهة في أن الجزء الأدنى لجراها عرضة لتكوين السدود والمستنقعات . وبحر الغزال نفسه نهر بطيء منخفض الضفاف ، ومقدار ما يحمله من الماء إلى بحيرة نو قليل جداً ولا يكاد يستمد منه نهر النيل شيئاً ، لأن بحيرة نو وما يحيط بها من المستنقعات كفيلة بأن يتبخر من سطحها الجزء الأكبر مما يأتى به بحر الغزال من المياه .

يتضح لنا مما تقدم أن أنهار الجبل والغزال تحتل حوضاً حافته مرتفعة ووسطه منخفض . وهذا الانخفاض ، الذى دعاه كرنكل « حوض الغزال » ، هو عبارة عن منطقة من مناطق الهبوط في إفريقية ، حديثة التكوين من الوجهة الجيولوجية بخلاف حوض الكنفو فهو قديم العهد ^(١) . فهذه المنطقة كانت جزءاً

(١) راجع كتاب كرنكل Geologic ص ١٣٢ .

من الهضبة الإفريقية قبل أن تهبط . وليس أدل على هذا من التشابه التام في
البنية بين الأقاليم التي جنوبها وإقليم جبال النوبا وكردوفان .
فإلى هذا المنخفض العظيم تجرى الأنهار كلها من جميع الجهات تقريباً فيجری
إليه بحر الجبل والزراف والغزال والسوبات و بعض جداول من جبال النوبا .
وخاصية هذا الحوض الذي يضم كل هذه الأنهار هي أن حافته المرتفعة تشغل حيزاً
صغيراً بينما المنخفض نفسه يشغل معظم مساحة الحوض . ولهذا كانت تلك الأنهار
قليلة السرعة كثيرة الغدران والمستنقعات . لأن أكثر مساحة الحوض عبارة عن
أقطار فسيحة مستوية انحدارها ضعيف جداً يكاد يكون في حكم العدم . ومن جهة
أخرى فإن حافات الحوض ليست بعظيمة الارتفاع إلا في بض الجهات : فجبال
لاتوكا التي تمتد بمحاذ غمولى قد يزيد ارتفاعها أحياناً عن ٢٠٠٠ متر ، وفي بعض
المواقع (جبل لانجيا) قد يصل إلى ٣٠٠٠ متر . وكذلك الجبال المقابلة لها
غرب النيل (جبال كوكو) ففيها مرتفعات تبلغ الألفى متراً دون هذا بقليل ،
لكن هذه القمم العالية قليلة ولا تحتل إلا حيزاً محصوراً ثم تقل حتى تنعدم فيما
بعد خط عرض ٥° شمالاً ، فتصل من غير تدرج إلى قلب الحوض المنخفض الذي
لا يزيد ارتفاع قاعه في المتوسط على ٤٠٠ متر فوق سطح البحر . والمرتفعات
الفاصلة بين مياه بحر الغزال من جهة والأوبانجي والشارى من جهة أخرى ، وهي
التي دعاها كرنكل بمرتفعات بندَا Banda-Schwelle ، لا يزيد ارتفاعها على
٨٠٠ متر في أكثر المواقع . وإن كان هنالك بعض القمم المنفردة كجبل باجنزى
Bagenzi وارتفاعه نحو ١٢٠٠ متر . . . وهذه المرتفعات ليست سوى جزء من
الهضبة الإفريقية صخورها من النيس الجرانيتي granitoid gneiss ، وما
ارتفاعها إلا لمبوط الانخفاضات المجاورة التي فيها بحر الغزال وحوض الكنفو
وحوض تشاد .

وهذا المنخفض العظيم — المسمى بمنخفض بحر الغزال — تغطيه طبقات

رسوبية هي نتيجة تفقت الصخور المتحولة التي تتكون منها هضبة إفريقية .
والأنهار التي تجرى إلى هذا المنخفض تلقى بما تحمله من الرواسب بعد خروجها من
المنطقة الجبلية . وبعد هذا تسيل صافية خالية من الرواسب ، فليس لديها والحالة
هذه ما تستطيع بواسطته أن تبني لها ضفافا مرتفعة . ولهذا كان بحر الجبل والغزال
يسيلان في مجرى منخفض الجوانب ، بحيث لا يمكن لأيهما أن يحتوى كل مياه
الفيضان . فيفيض مياه النهر عن جانبيه وتنتشر المستنقعات . وكل هذا نتيجة
لازمة لتضاريس حوض هذه الأنهار .

أما الأخدود الكبير الذي تتبعناه من جنوبي بحيرة إدورد الذي يحيط بنهر
السليمكي وبحيرة البرت ونيل البرت وأعلى بحر الجبل ، فإنه ينتهي فجأة شمال
غندوكرو . فلا يرى له أثر بعد هذا .

على أنه فيما بين نمولى وغندوكرو ظاهر واضح وعلى الأخص في الجانب
الغربي لبحر الجبل . فإن حافته الغربية مرتفعة بنحو ألف متر عن مجرى نهر
النيل . وهي أكثر ارتفاعا في الجنوب حيث يطلق عليها اسم جبال نيري Nieri
ثم يقل ارتفاعها كلما اتجهنا شمالا حتى تختفي شمال غندوكرو . وهذا الجزء من
الأخدود هو بلا شك حديث التكوين جدا من الجهة الجيولوجية ، ولا يرجع
إلى أبعد من العصر الرابع . ومن قبل تكون الأخدود كانت مرتفعات اللاتوكا
والكوكو متصلة بعضها ببعض .

الفصل الخامس

السوبات والنيل الأبيض

يصل بحر الجبل إلى بحيرة نو فيمر بجانبها الشرق ويفتحى متجها إلى الشرق كما رأينا في الفصل السابق . وذلك بعد أن يجتاز منطقة المستنقعات ، ويفقد فيها جزءاً كبيراً من مائه . فنهاية بحر الجبل أضعف بكثير من بدايته . ومع ذلك فإننا مضطرون لأن نعد هذه النقطة التي ينتهى إليها بحر الجبل هي ابتداء النيل الأبيض ، مجارة لما اصطلح عليه الكتاب . ولا شك أن هذا ابتداء ضعيف جداً لنهر لا يزال بينه وبين البحر بضعة آلاف من الكيلو مترات . ولا يرجع ضعف النهر هنا إلى ما فقد من الماء جنوب بحيرة نو ، بل يرجع أيضاً إلى أنه قد فقد الشطر الأعظم مما كان يحمله من الرواسب ، ويغدو وليس في مائه ما يمكنه من بناء الجسور ، التي تحفظ ماءه من أن يضيع وسط المنخفضات التي يجري فيها .

ولكن حالة الضعف التي يبدأ بها النيل الأبيض لا تدوم طويلاً ، لأنه لا يلبث بعد أن يقطع ١٢٠ كيلو متراً أن يأتيه إمداد قوى جديد ، يحمله رافد عظيم وهو نهر السوبات . وبفضل مائه الغزير وتياره المتدفق ، يستمد النيل الأبيض قوة وحيوية متجددة ، ويتسنى له أن يعاود جريانه نحو الشمال .

إن نهر السوبات لا يقذف بمياهه وسط المنخفض العظيم الواقع في جنوب السودان كما يفعل بحر الجبل وبحر الغزال . بل يمر بالطرف الشمالى منه مرأ ، ولا يجري فيه مسافة عظيمة . وقد استطاع بفضل ما يحمله من الرواسب ، وما له من قوة التيار ، أن يجتاز تلك المسافة دون أن تكتنف مجراه المستنقعات بكثرة أو تتكدس على شاطئيه الحشائش المائية والأعشاب . فقد ساعدت رواسبه الوافرة

على تكوين ضفاف مرتفعة ، يجرى النهر وسطها ، ولا يكاد يخرج عنها إلا قليلا كما سنرى .

والسوبات رافدان رئيسيان هما اليبور والبارو ؛ ولكننا نستطيع أن نبتين المنابع العليا للنهر في صورة أدق إذا ذكرنا أن النهر يستمد ماءه من ثلاثة أقاليم مختلفة ، وهى الهضبة الاستوائية ، والمرتفعات الواقعة شمال بحيرة رودلف ، والثالث أوسط هضبة الحبشة .

والهضبة الاستوائية هى أقل المنابع خطراً وأضعفها أثراً ، وإن كانت أعظمها بعداً نحو الجنوب . وهذه الهضبة تنتهى فى الشمال بمجموعة من الجبال والمرتفعات يسكنها شعب اللاتوكا والديديجا وتسمى باسمهما . فمن هذه المرتفعات ، أى من الحافة الشمالية للهضبة الاستوائية تسيل أودية وجداول عديدة منحدرية نحو الشمال ؛ ولكنها لا تجرى بعيداً ، حتى تهبط إلى الأرض السهلة التى يتألف منها قاع المنخفض ، فيصبح مجراها ضعيفاً وتيارها بطيئاً . وتكتنفها المستنقعات إلى مسافات بعيدة . ولا يزال علمنا عن هذا الجزء من حوض النيل ضئيلاً .

وإذا صرفنا النظر عن الجداول العديدة القليلة الخطر ، فإن أهم مياه تلك المنابع الجنوبية تتجمع فى رافدين لهما بعض الأهمية هما نهر لوتيللا Lotilla وفيشينو Viveno ؛ ولعل الأول أهم الرافدين ، ومنابعه أبعد ؛ وهو يجرى من مرتفعات ديديجا متجهاً نحو الشمال بانتظام ، ملتزماً إلى درجة بعيدة درجة ٣٣° من خطوط الطول الشرقية . أما نهر فيشينو فينبع من مرتفعات اللاتوكا ، ثم يتجه نحو الشمال الغربى حتى يقترب من بحر الجبل فى محاذاة منجلا ، ثم يتحول بعد ذلك نحو الشمال الشرقى ، حتى يلتقى بلوتيللا . وبعد التقائهما بقليل يتصل بهما نهر ثالث يدعى نهر كنجن Kangen . وهذه النقطة هى ابتداء نهر پيبور ، وهنا تقع البلدة المعروفة باسم مركز پيبور Pibor Post . وابتداء من هذه النقطة تزداد معلوماتنا نوعاً عن النهر ، فهو ضيق الجرى كثير

الالتواء تكثفه الأعشاب المائية ، وكثيراً ما تترامى في مجراه في شكل سدود . ولا يلبث النهر أن تصله إمدادات من جهات أخرى خلاف تلك النهرات التي تجيء من أقصى الجنوب .

وهذه الإمدادات هي التي تتألف منها المجموعة الثانية من منابع السوبات ، وهي عبارة عن روافد تنحدر من الأطراف الجنوبية الغربية لهضبة الحبشة ، وتكون من ثلاثة أنهار : أولها نهر الأجواى Agwei وهو يصب في النهر شمال بلدة پيبور بنحو مائة كيلو متر . وهو أقل الثلاثة خطراً ؛ أما النهر الثاني فهو نهر اكوبو Akobo ويتصل بنهر پيبور عند بلدة اكوبو Akobo Post ، وهو يجمع مياهه من روافد عديدة من الطرف الجنوبي الغربي لهضبة الحبشة ، ولكنها لا تأتي من مكان بعيد في داخل الهضبة . ومن نفس الإقليم تنبع روافد أخرى تغذي أنهار بحيرة رودلف مثل نهر كيبش Kibish ، وليس بين منابع اكوبو و منابع روافد رودلف مسافة كبيرة ، أى أن خط تقسيم المياه منخفض ، وغير واضح . والحدود بين الحبشة والسودان تتبع الجرى الأسفل لنهر اكوبو .


أما الرافد الثالث الذي يتصل بنهر پيبور فهو نهر جिला Gila ، وينحدر أيضاً من أطراف هضبة الحبشة ، و منابعه أعلى من منابع نهر اكوبو . وينحدر نحو المنخفض انحداراً شديداً . وعند اتصاله بنهر پيبور يبدو كأنه أهم النهرين ، ومع ذلك فإنه هو أيضاً لا يؤثر تأثيراً كبيراً في مجرى نهر پيبور ، الذي يظل بعد إمداده بنهرى اكوبو وجيلا نهرأ بطيئاً كثير الالتواء بطيء الجريان ، تعترضه السدود من آن لآن . ومع ذلك فإن نهر جيلا يعد بحق أهم روافد نهر پيبور جميعاً .

ولسكن من الواضح أن جميع هذه المنابع والروافد العليا ، التي تمتد الپيبور بالماء من شمال الهضبة الاستوائية وجنوب غرب الهضبة الحبشية ، لم تستطع أن

الحسين

مكتبة

الحسين



ت. الحسين * * *
مكتبة * * *
الحسين

تجعل منه نهراً ذا شأن ، وذلك لسببين : أولهما أن الروافد في ذاتها قليلة الماء ، والثاني طول المسافة وقلة انحدار الأرض مما يجعل الجرى بطيئاً ، ويمكن من تكوين المستنقعات والسدود . وصفوة القول أن السوبات لو اقتصرت موارده على نهر اليبور وروافده — على كثرتها وتنوعها — لما كان نهراً ذا شأن ، ولما استطاع أن يكون له أثر في مجرى النيل ..

وهذا ما يجعل للمجموعة الثالثة من منابع السوبات ذلك الخطر العظيم . وهي المنابع التي يتألف من مائها الغزير نهر بارو الخطير ، الذي يتصل باليبور قبيل بلدة الناصر ، فيتكون من اتحادها نهر السوبات . والعنصر الأكبر في هذا الاتحاد هو نهر بارو من غير شك .

ينبع نهر بارو من إقليم جورى في الجانب الغربى من الهضبة الحبشية في دائرة العرض الثامنة شمال خط الاستواء ، في إقليم مطره غزير جداً ، وموسم المطر فيه طويل . وارتفاعه يبلغ ألفى متر فوق سطح البحر . وفي هذا المستوى تقع أيضاً الروافد الأخرى التي تمتد نهر بارو بالماء مثل نهر بر Birbir ونهر غابه Gaba ونهر جوكاو Jokau . وهذا الإقليم الغربى من الحبشة هو الذى يسكنه شعب واليجا ، ويدعى باسمه .

يندفع نهر بارو من تلك المرتفعات اندفاعاً شديداً حتى يبلغ سفح الهضبة ، حيث توجد بلدة غمبيلا Gambeila و بلدة إيتانج Itang ؛ وكلاهما داخل في حدود الحبشة والنهر هنا ذو ضفاف عالية يغطيها الشجر ، ويعد إقليم غمبيلا هذا بمثابة نقطة التحول في نهر بارو ، من الجرى الجملى الشديد الانحدار ، إلى الجرى السهل الانحدار . ولا شك أن هذا التحول ليس تدريجياً ، ولذلك لا نعجب إذا كان النهر فيما مضى يفيض عن جانبيه ، ويكون سهلاً رسوبياً ، قبل أن أمكنه أن يبني ضفافه ويستقر في مجراه الحالى ، ولا يزال هذا الإقليم معرضاً لأن تتكون فيه بعض المستنقعات في زمن الفيضان .

الالتواء تكثفه الأعشاب المائية ، وكثيراً ما تترامى في مجراه في شكل سدود . ولا يلبث النهر أن تصله إمدادات من جهات أخرى خلاف تلك النهيرات التي تجمىء من أقصى الجنوب .

وهذه الإمدادات هي التي تتألف منها المجموعة الثانية من منابع السوبات ، وهي عبارة عن روافد تنحدر من الأطراف الجنوبية الغربية لهضبة الحبشة ، وتتكون من ثلاثة أنهار : أولها نهر الأجواى Agwei وهو يصب في النهر شمال بلدة بيبور بنحو مائة كيلو متر . وهو أقل الثلاثة خطراً ؛ أما النهر الثاني فهو نهر اكوبو Akobo ويتصل بنهر بيبور عند بلدة اكوبو Akobo Post ، وهو يجمع مياهه من روافد عديدة من الطرف الجنوبي الغربي لهضبة الحبشة ، ولكنها لا تأتي من مكان بعيد في داخل الهضبة . ومن نفس الإقليم تنبع روافد أخرى تغذى أنهار بحيرة رودلف مثل نهر كيبش Kibish ، وليس بين منابع اكوبو و منابع روافد رودلف مسافة كبيرة ، أى أن خط تقسيم المياه منخفض ، وغير واضح . والحدود بين الحبشة والسودان تتبع الجرى الأسفل لنهر اكوبو .

أما الرافد الثالث الذي يتصل بنهر بيبور فهو نهر جيلا Gila ، وينحدر أيضاً من أطراف هضبة الحبشة ، و منابعه أعلى من منابع نهر اكوبو . وينحدر نحو المنخفض انحداراً شديداً . وعند اتصاله بنهر بيبور يبدو كأنه أهم النهرين ، ومع ذلك فإنه هو أيضاً لا يؤثر تأثيراً كبيراً في مجرى نهر بيبور ، الذي يظل بعد إمداده بنهرى اكوبو وجيلا نهرأ بطيئاً كثير الالتواء بطيء الجريان ، تعترضه السدود من آن لآن . ومع ذلك فإن نهر جيلا يعد بحق أهم روافد نهر بيبور جميعاً .

ولكن من الواضح أن جميع هذه المنابع والروافد العليا ، التي تمتد إلى بيبور بالماء من شمال الهضبة الاستوائية وجنوب غرب الهضبة الحبشية ، لم تستطع أن

تجعل منه نهراً ذا شأن ، وذلك لسببين : أولهما أن الروافد في ذاتها قليلة الماء ، والثاني طول المسافة وقلة انحدار الأرض مما يجعل الجرى بطيئاً ، ويمكن من تكوين المستنقعات والسدود . وصفوة القول أن السوبات لو اقتصرت موارده على نهر البيبور وروافده — على كثرتها وتنوعها — لما كان نهراً ذا شأن ، ولما استطاع أن يكون له أثر في مجرى النيل ..

وهذا ما يجعل للمجموعة الثالثة من منابع السوبات ذلك الخطر العظيم . وهي المنابع التي يتألف من مائها الغزير نهر بارو الخطير ، الذي يتصل بالبيبور قبيل بلدة الناصر ، فيتكون من اتحادها نهر السوبات . والعنصر الأكبر في هذا الاتحاد هو نهر بارو من غير شك .

ينبع نهر بارو من إقليم جورى في الجانب الغربى من الهضبة الحبشية في دائرة العرض الثامنة شمال خط الاستواء ، في إقليم مطره غزير جداً ، وموسم المطر فيه طويل . وارتفاعه يبلغ ألفى متر فوق سطح البحر . وفي هذا المستوى تقع أيضاً الروافد الأخرى التي تمتد نهر بارو بالماء مثل نهر بربر Birbir ونهر غابه Gaba ونهر جوكاو Jokau . وهذا الإقليم الغربى من الحبشة هو الذى يسكنه شعب واليجا ، ويدعى باسمه .

يندفع نهر بارو من تلك المرتفعات اندفاعاً شديداً حتى يبلغ سفح الهضبة ، حيث توجد بلدة غمبيلا Gambeila و بلدة إيتانج Itang ؛ وكلاهما داخل في حدود الحبشة والنهر هنا ذو ضفاف عالية يغطيها الشجر ، ويعد إقليم غمبيلا هذا بمثابة نقطة التحول في نهر بارو ، من الجرى الجبلى الشديد الانحدار ، إلى الجرى السهل الانحدار . ولا شك أن هذا التحول ليس تدريجياً ، ولذلك لا نعجب إذا كان النهر فيما مضى يفيض عن جانبيه ، ويكون سهلاً رسوبياً ، قبل أن أمكنه أن يبني ضفافه ويستقر في مجراه الحالى ، ولا يزال هذا الإقليم معرضاً لأن تتكون فيه بعض المستنقعات في زمن الفيضان .

وليس بين أنهار النيل الحبشية نهر ينقض من مجراه الأعلى إلى مجراه الأسفل
بمثل تلك السرعة التي ينقض بها نهر بارو . وعلى الرغم من أننا نعرف على وجه
التحقيق تخطيط النهر وأروافده في هذا الإقليم الغربي من الهضبة الحبشية ، فإننا
نعلم أن المنابع ليست بعيدة ، ولعلها لا تبعد عن غمبيلا بأكثر من ٢٠٠ كيلومتر .
ومن بعد تلك البلدة يجري النهر ٥٤٠ كيلومترا أخرى قبل أن يتصل بالنيل
الأبيض ، فيكون طوله نحو ٧٤٠ كيلومترا . ويكون مجراه الجبلي بالنسبة للنهر
كله قصيراً جداً ؛ يهبط فيه النهر من ارتفاع ألفي متر إلى ارتفاع نحو خمسمائة متر .
بعد ذلك يجري النهر في أرض موطأة سهلة . ولهذا ألقى بكثير من رواسبه ، وكون
منها سهولاً فيضية في إقليم إيتانج .. على أن شدة انحدار النهر وسقوطه من ذلك
الارتفاع الشاهق وغزارة المياه التي يحملها ، كل هذا أكسب النهر قوة وسرعة
تظهر آثارها واضحة في مجرى نهر السوبات كله ، بل وفي النيل الأبيض نفسه .
بعد غمبيلا بنحو ٢٥٠ كيلومتراً يتصل نهر بارو بنهر بيمبور ، ويخرج من بلاد
الحبشة إلى السودان ، ومن اتحاد النهرين يتألف النهر الذي يدعى باسم السوبات .
فالاسم إذن مقصور على تلك المسافة التي تقع بين التقاء بارو بنهر بيمبور وبين اتصال
السوبات بالنيل الأبيض ، وهي مسافة تبلغ نحو ثلثمائة من الكيلومترات .
وفي وقت الفيضان الشديد تغلغ مياه السوبات بلون القرميد ؛ ثم تعود بعد
ذلك ذات لون أبيض تشوبه كدرة ؛ وهذه هي التي أكسبت النيل الأبيض
هذه التسمية . وهذه الحقيقة ما هي إلا دليل آخر على أن النيل الأبيض امتداد
للسوبات لا لبحر الجبل ، فالسوبات لا يحمل الماء وحده إلى النهر بل يحمل إليه
الرواسب أيضاً . ولولا السوبات ما تسفى للنهر أن يحفر هذا الجرى الممتد إلى
الخرطوم ، لأن مياه بحر الجبل القليلة الانحدار ، الخالية من الرواسب ، عاجزة
تماماً عن حفر ذلك الوادي ، وعن بناء الشواطئ التي تحفظ النهر من التسرب إلى
الأقطار المجاورة .

ولا بد أن تكون حمولة نهر بارو من الرواسب عظيمة جداً ، لأنه على الرغم مما يفقد منها في إقليم غمبيلا ، يحتفظ بجزء كبير منها في بقية مجراه . ويلفت المسترهرست نظرنا إلى صور مختلفة للنهر بين الناصر وأبونج Abwong وهي عبارة عن صور شمسية للنهر التقطنها الطائرات ، ترينا خطوطاً موازية للنهر أو محاذية له إلى مسافات طويلة ؛ ويستدل بهذا على أن النهر ربما غير مجراه غير مرة ، وهذا أمر ليس بعيد الاحتمال . وهذه الظاهرة تتكرر في أجزاء أخرى من النيل ، وبوجه خاص في الجزء الجنوبي من النيل الأبيض ^(١) .

بعد أن يمر السوبات ببدة حلة دوليب ، على الضفة اليمنى ، ببضعة عشر كيلومتراً ، يصل إلى النقطة التي يلتقى عندها بالنيل الأبيض . ونقطة التقاء النهرين عبارة عن مساحة متسعة من الماء فيها بعض الجزر ؛ وذلك بالطبع ما ننتظره عندما تلتقى مياه سريعة التدفق كمياه السوبات ، مع وفرة رواسبها ، بمياه بطيئة الجريان قليلة الرواسب كالمياه التي يحملها النيل الأبيض من بحر الجبل ؛ فإن تصادم التيار السريع والبطيء يدعو حتماً إلى كثير من الأرساب ، وتكوين الجزر الرسوبية .

وفي وسط هذه الجزر يتحول مجرى السوبات ، فينحني نحو الشمال الشرقي ، مجارياً في اتجاهه هذا اتجاه النيل الأبيض نفسه .

وواضح مما تقدم أن نقطة التقاء النيل الأبيض بالسوبات نقطة هامة في مجرى النيل . وبين هذه النقطة ونهاية النيل الأبيض عند الخرطوم ٨٤٤ كيلومتراً وبذلك يكون طول النيل الأبيض من بحيرة نو إلى نهايته ٩٦٤ كيلومتراً .

(١) راجع الجزء الأول من كتاب المسترهرست والمستر فليس المسمى The Nile Basin صفحة ١٠٢ و ١٠٣ والأشكال رقم ١٠٦ و ١٠٦ ب و ١١٢ في ذلك الكتاب .

ولجرى النهرين ملتقى السوباط والخرطوم خاصية غربية ، وهى أن مبدأ ونهايته لا يختلفان من حيث الارتفاع إلا اختلافاً يسيراً . فنحن نرى مثلاً فى كتاب مصلحة الطبيعيات عن الأحوال المناخية لحوض النيل^(١) أن ارتفاع حلة دوليب عن سطح البحر ٣٩١ متراً وارتفاع الخرطوم ٣٩٠ متراً . وهذا الاختلاف القليل فى ارتفاع البلاد الواقعة على طرفى النهر يقابله تماماً الاختلاف القليل ما بين ارتفاع مجرى النهر عند أوله وآخره . فقد ذكر ولكوكس وكريج^(٢) أن مجرى النيل الأبيض عند الخرطوم يقل ارتفاعه بمقدار عشرة أمثاق ونصف متر عن مستوى النهر نفسه عند حلة دوليب . ويكون الاختلاف أقل من هذا فى زمن الفيضان ، فتكون درجة انحدار النيل الأبيض بوجه عام نحو ١ : ٨٠٠٠٠ ، وهو أضعف انحدار للنيل فى أى جزء عظيم من مجراه . فإن وجدت بعض انحدارات ضعيفة فى منطقة السدود ، فإن امتدادها ليس عظيماً بهذا المقدار . وسرعة النهر قليلة جداً بالطبع تبعاً لهذا الانحدار الضعيف ، فهى قل أن تزيد على كيلومتر ونصف فى الساعة بينما سرعة التيار فى نهاية نهر النيل أى فى فرع رشيد فى شهر أكتوبر هى نحو ٦ أو ٧ كيلومترات^(٣) ، وهذا الاختلاف القليل فى مستوى النيل الأبيض مع ضعف التيار هو الذى حمل أكثر الكتياب على وصفه بأنه أقرب إلى أن يكون بحيرة مستطيلة جداً من أن يكون نهراً جارياً . ولقد يكون من المستغرب والحالة هذه أن النيل الأبيض لم يتحول إلى حالة يشبه فيها بحر الجبل فى منطقة السدود ... حقيقة أنه توجد مستنقعات وبرك فى كثير من جهات وادى النيل الأبيض لكنها أبعد من أن تكون شبيهة فى اتساعها وامتدادها بمستنقعات بحر الجبل أو الغزال أو الزراف . فإى شئ حال دون أن يكون شأن وادى النيل الأبيض

(١) Climatological Normals صفحة VII . والأرقام المذكورة تشير إلى ارتفاع محطة الأرصاد الجوية .

(٢) Egyptian Irrigation, I, p. 273 .

(٣) يراجع فى هذا الكتاب ولكوكس وكريج ص ١٤٣ من الجزء الأول من الطبعة الثالثة وهى التى يشار إليها هنا دائماً .

كشأن وادى بحر الجبل شمال بور ؟ الظاهر أن هذه الحال نتيجة تأثير بحر السوبات وما يحمله من الرواسب ، فإنه برغم ما يفقد من حمولة بين غمبيلا وحلة دوليب لا يزال مقداراً عظيماً من الرواسب بعد التقائه ببحر الجبل ، ومن هذه الرواسب تكونت ضفاف مرتفعة نوعاً على جانبي النهر لحالت دون فقدان مقدار عظيم من مياه الفيضان . وعدا هذا فإن الأقطار التي يجري وسطها النيل الأبيض ليست عبارة عن منخفضات واسعة كما هي الحال في الأقاليم التي يجري وسطها بحر الجبل . فلهذين السببين قل تكون المستنقعات حول النيل الأبيض بالنسبة لبحر الجبل .

وقد وصف السر وليم غارستن^(١) النيل الأبيض وصفا مستفيضاً نكتفي هنا بذكره إجمالاً . لقلة الاختلاف في حالة النهر من مكان إلى مكان .

يلتقى السوبات بالنيل الأبيض ، فلا تمتزج مياههما تمام الامتزاج ، بل إن مياه السوبات الملأى بالرواسب تبقى منفصلة عن مياه بحر الجبل الخضرة ، ويمكن مشاهدة الخط الفاصل بينهما إلى مسافة بعيدة بعد التقائهما . وهذا شأن جميع الأنهار التي تتحد إذا كانت مياههما مختلفة في التركيب والكثافة . ولكن لا تلبث مياه النهرين أن تمتزج . وفي وقت جريان السوبات تكون مياهه هي المقلبة فيتلون بلونها النيل الأبيض ... وفي زمن انخفاض السوبات يصبح النهر ما بين حلة دوليب والخرطوم عبارة عن بحيرة مياهها ضعيفة الحركة ، يميل لونها إلى الخضرة لما يتكون فيها من النباتات الصغيرة "Algæ" ، وقد تكون لها رائحة غير مستحسنة .

وفي مبدأ النيل الأبيض يكون النهر مرتفع الضفاف واتساعه نحو ٣٠٠ أو ٤٠٠ متر . وكثيراً ما تعترض مجراه الجزر لكنها صغيرة الحجم في الجزء الجنوبي .

(١) راجع تقريره ص ١٢٠ وما يليها .

وتزيد كثرة وحجبا فيما بعد جبل أحمد أغا . وعن جانبي النهر مستنقعات تزيد وتنقص تبعاً لزيادة النهر ونقصه ، وقد يبلغ اتساعها كيلو مترا أو أكثر — وهي أكثر انتشاراً واتساعاً في الجهة الغربية منها في الجانب الشرقي . وحين ينخفض النهر تجف المستنقعات ويصير من الممكن السير في قاعها ... فتصبح عبارة عن منخفضات عميقة في الوسط ثم يقل عمقها عن الجانبين سواء إلى جهة النهر أو إلى الجهة الأخرى ، وفي وقت جفاف المستنقعات ترى في وسطها مسيلات صغيرة من الماء أو (أخوار) بعضها يجري ملاصقاً لجرى النيل الأبيض .

ومن وراء المستنقعات منطقة تكسوها الغابات وهي تمتد إلى مسافات تتراوح ما بين ٥٠٠ وألفي متر . وقلما تصل مياه الفيضان إلا إلى حافة تلك الغابات .

وعلى بعد ٢٦٩ كيلو مترا من ملتقى السوبات ببحر الجبل يجري النيل الأبيض بالقرب من جبل منفرد يدعى جبل أحمد أغا لا يزيد ارتفاعه عن ١٢٠ مترا وهو على بعد ثلاثة كيلو مترات من النهر ثم في منتصف المسافة تقريباً بين السوبات والخرطوم يجري النهر بالقرب من تلال من حجر الجرانيت لا يزيد ارتفاع كل منها على ١٠٠ متر عن سطح النهر ، وبطلق عليها جميعاً اسم الجبلين وهي على الجانب الشرقي للنهر . وبها سميت قرية واقعة على النهر بالقرب منها . وجرى النهر هنا صخري .

ومن بعد الجبلين تقل المستنقعات تدريجاً وتدنو منطقة الغابات من حافة النهر . وإلى شمال الجبلين بنحو خمسين كيلو مترا يتسع مجرى النهر ويقل عمقه جدا في موضع يسمى مخاضة أبي زيد ، وتمتد هذه المخاضة إلى نحو سبعة كيلو مترات ، وهي أكبر عائق للملاحة فيما بين غندوكرو والخرطوم ، وفي السنين التي ينقص فيها مستوى النهر أكثر من المعتاد قد لا يزيد عمق الماء هنا على ٤٠ أو ٥٠ سنتيمترا وتعتبر الناس من ضفة إلى أخرى بماشيتها من غير مشقة : ففي مثل هذه السنوات

تصبح الملاحة صعبة وكثيراً ما تضطر السفن لتقليل حمولتها حتى تستطيع اجتياز النهر في هذا الموضوع .

ويقول السر وليام غارستن إن مجرى النهر عند أبي زيد يعترضه حاجز صخري ممتد من ضفة إلى أخرى . وإن مثل هذا الحاجز موجود أيضاً عند كاكا وأحمد أغا وقوز أبو جمعه . وإنها كلها تعوق الملاحة قليلاً في سنى القحط والجفاف الشديد^(١) . وأمثال هذه الحواجز الصخرية هي التي يتكون لديها عادة جنادل أو مساقط أو مندفعات ، ولكن مثل هذا الشيء لا يوجد الآن . فإما أنها منخفضة جداً بحيث لا تعوق جريان الماء ، أو أنها كانت فيما مضى جنادل ثم برت حتى سويت بقاع النهر .

وفما بين أحمد أغا والدويم تكثر الجزر الطويلة التي تقسم مجرى النهر شطرين وأشهر هذه جزيرة بنجاني Pangani وطولها نحو ٤٠ كيلو متراً وعرضها ٤ كيلو مترات وهي شمال بلدة رنك Renk ثم جزيرة آبا Abba وهي أطول من الأولى قليلاً ومبدؤها شمال قوز أبو جمعه ويمجرى النهر من حول هذه الجزر شرقاً وغرباً والمجرى الغربي أكبر .

وعند قوز أبو جمعه تنتهى المستنقعات : وعند الدويم تنتهى منطقة الجزر . وما بين الدويم والخرطوم لا تسكاد توجد واحدة في مجرى النهر . ويتسع النهر تدريجياً ويقل عمقه في هذه المنطقة .

وعلى بعد نحو ٥٠ كيلو متراً من الخرطوم يجرى النهر ما بين جبلي مندره غرباً وجبل الأوليا شرقاً ، ويتسع النهر هنا إلى نحو ١٠٠٠ متر ثم يزيد اتساعه حتى يتجاوز الألفي متر . وتبقى هذه حاله إلى قرب الخرطوم .

(١) تقريره ص ١٢٤ (النسخة الإنكليزية) .

يجرى النيل الأبيض في منبسط من الأرض تتكون تربته من مواد نشأت من تفتت صخور جبال النوبا وكردوفان غرباً ومرتفعات الجزيرة شرقاً. وتفصل مياه النيل الأبيض عن الأزرق من جهة الشرق مرتفعات غير واضحة ولا ظاهرة إلا في مواضع قليلة حيث تكون تلالاً منفردة تجرى منها بعض أخوار تنحدر إلى النيل الأبيض وأشهرها خور آدار ، وهذه التلال جرانيتية التركيب ومنها جبل مويبا إلى جنوب غربى سنار وجبل دالى Dali وجبل جولى Gule وهذا الأخير واقع في منتصف المسافة بين النيل الأبيض والأزرق شرق بلدة الرنك .

أما جبال النوبا^(١) وتلال كردوفان . فهي الحد الغربى لحوض النيل الأبيض والحد الشمالى لمنخفض الغزال . وهي تختلف عن مرتفعات الجزيرة في المقدار لا في النوع لأن تركيبها وصخورها تشبه تركيب تلك التلال . لكن المرتفعات هنا كثيرة جداً وعالية نوعاً : مما يبرر تسمية أهالى البلاد لها باسم « الجبال » . وأعلى قممها جبل تالودى (١٠٧٥ متراً) وهيبان (١٣٩٨ متراً) وأم غزیه (١٤٨٠ متراً) . والقمم كثيرة جداً لكنها لا تكون سلسلة متصلة من الجبال . بل هي أعلام منفردة منتشرة من غير نظام خاص تحيط بها أرض سهلة قد ملئت قيعانها بالرواسب الناتجة من تفتت صخور تلك الجبال وهذا التفتت ناشئ إما عن تأثير التعرية المائية أو الهوائية . وهذه التربة إما طبقات رملية وقد يبلغ سمكها أربعين متراً وفيها رواسب من مركبات الحديد قد ساعدت على إدماجها بعضها في بعض — والأهالى كثيراً ما يستخرجون الحديد منها ويصنعونه آلات — وإما صلصالية لأنها أقرب إلى السواد وهي تتشقق في فصل الجفاف . ثم تلتئم شقوقها بسرعة عند أول سقوط الأمطار ثم لا يمكن الماء بعد ذلك أن يتسرب منها فتساعد والحالة هذه على تكوين المستنقعات .

(١) من المستحب أن تكتب كلمة النوبا (بالألف) ، وهي التى تشير إلى شعب النوبا (المفرد نوباوى) الذى يعيش في جنوب كردوفان ، تمييزاً لها عن بلاد النوبة (المفرد نوبى) الشعب الذى يعيش في جنوب مصر وشمال السودان .

هذا والجبـال المرتفعة الواقعة غرب النيل الأبيض يقل ارتفاعها كلما ذهبنا من بلاد النوبا جنوباً إلى بلاد كردوفان شمالاً . فبرغم وجود تلال صخرية منتشرة فيما بين الأبيض وبلاد النوبا فإن ارتفاعها ليس كثيراً : وجمال النوبا وكردوفان تتركب من صخور الجرانيت والميسكا والنائيس والهـورنبلندشست وغيرها من الصخور المتحولة السـكثيرة الانتشار في هضبة أفريقيا الوسطى والشرقية . والتي يفصلها عنها الآن منخفض بحر الغزال . وهذه الطبقات هي التكوينات الأساسية لصخور حوض النيل الأعلى والأوسط سواء أ كانت ظاهرة على سطح الأرض أم تكسوها رواسب نهريـة وهوائية أو طبقات من الخرسان النوبي كما هي الحال في شمال الخرطوم أو صخور طفحـية كما هي الحال في هضبة الحبشة وفي بعض جهات أخرى .

إلى غربى كردوفان بلاد دارفور التى يـعدها أكثر الجغرافيين جزءاً من حوض النيل فإن كثيراً من ماؤها ينصرف إلى بحر العرب والغزال والبعض إلى وادى ملك الذى ينحدر إلى النيل . ودارفور لا تختلف كثيراً فى تركيبها عن بلاد النوبا وكردوفان . غير أن جبالها أعلى ، وليس علوها راجعاً إلى صلابـة الطبقات الأركية التى تتكون منها صخورها . بل إن هنالك صخوراً بركانية حديثة التكوين ، مما يدل على أن هذه المنطقة كانت حديثاً عرضة لـتطورات بركانية ذات شأن . وأعلى جبال دارفور هي جبال مرّـه وأعلى قممها الجبل البركانى دريبا^(١) الذى يظن أن ارتفاعه يزيد على ثلاثة آلاف متر . وفى قمته بحيرات بركانية تدعى بالاسم عينه .

(١) فى خريطة السودان ١ : ٣٠٠٠٠٠٠٠ يدعى هذا الجبل باسم بانى دافاجو (Banidafago) أونورجينا (Nurgina) وهذه الخريطة يجب أن تكون فى يد كل طالب يدرس جغرافية نهر النيل .

الفصل السادس

هضبة الحبشة

بحيرة طانه ، النيل الأزرق ، العطبرة ، خور الجاش

تقع منابع النيل الأزرق والعطبرة وخور الجاش في هضبة مترامية الأطراف هي أعلى هضاب أفريقية ، وجبالها من أعلى جبال أفريقية ، وارتفاعها في المتوسط يتراوح بين ألفين وألفين وخمسمائة متر . لكن لها عدة قمم عالية قد تصل إلى أكثر من ٤٠٠٠ متر . وهي أعلى ما تكون في الشمال والشرق ، ولكن قد توجد مرتفعات عظيمة في وسطها بل وبالقرب من حافتها الغربية . وما حول هضبة الحبشة أصقاع منخفضة يفصلها عنها انكسارات مستطيلة اتجاهها عادة من الجنوب إلى الشمال ، والحافة الشرقية للهضبة هي الحافة الغربية للأخدود الأفريقي الأكبر الذي يحمله البحر الأحمر وسواحل وإقليم الآفار .

من هذه الهضبة الكبرى تسيل الأنهار كثيرة عدا تلك التي ذكرناها ، ففيها أيضاً منابع الأومو ونهيرات بحيرة رودلف الأخرى . وكذلك السوبات وروافده فلهضبة والحالة هذه ممتدة من خط عرض ٤° شمال خط الاستواء إلى عرض ١٨° ومن درجة ٣٤ الطولية إلى درجة ٤٠ ، وانحدار الهضبة من جهة الشرق والجنوب شديد جداً وحدودها هنالك بارزة ناتئة ، والانتقال من الهضبة إلى منخفض الآفار وبلاد السومال انتقال فجائي . وأما الانحدار الغربي فأكثر تدرجاً ولكنه أيضاً انحدار شديد . ومن جهة الشمال يفصل بين الهضبة وبين جبال سواكن إقليم منخفض .

وبرغم المرتفعات الكثيرة المنتشرة في أرجاء الحبشة يجب أن لا ننسى أن

هذه ليست إقليماً جبلياً كجبال الألب في سويسره مثلاً ، بل هي هضبة . فالتضاريس المنتشرة ليست بسلاسل جبال ، وإنما هي أقاليم عالية تكون في الغالب مستوية السطح ، ويقول في هذا كرنكل « إن الحبشة ليست ألبية التضاريس كما يزعم الكثير ، وليست المرتفعات الرأسية هي الكثيرة الحدوث بل المرتفعات الأفقية المنتشرة على شكل مدرجات . ولقد تصل المرتفعات التي من هذا النوع إلى ٣٠٠٠ متر ، ومع ذلك فارتفاعها تدريجي غير محسوس » ^(١) .

فالمنظر السائد إذن في هضبة الحبشة هو المرتفعات المستوية في وسطها شقوق وهوات عميقة تجري فيها أنهارها وجداولها الكثيرة . ولكن ليس معنى هذا أن هضبة الحبشة خلو من الجبال الشاهقة ، بل إن هنالك أقطاراً امتازت بكثرة أعلاها المرتفعة . وهي في وسط الهضبة المترامية الأطراف كالجزر القائمة وسط البحار . ففي الجزء الشمالى إقليم سيمين Simyen ؛ وأشهر أعلامه رأس داشان (٤٦٢٠ م) أعلى جبال الحبشة وجبل بواحيت Buahit (٤٥٤٢ م) وأبو جريد (٤٥٦٣ م) وغيرها ، وهو إقليم يمكن أن يدعى بحق إقليماً ألبياً قمه العليا يكسوها الجليد زمناً طويلاً كل عام .

وكذلك عند منابع نهر سقيمت (تاكازى) جبل (أبونا يوسف) وارتفاعه ٤١٩٦ متراً . وفي وسط هضبة جوجام جبال تشوكى ، ومن قممها العليا أغسيوس فائرا (٤٢٠٠ متر) ثم جبال أميداميت Amedamit ويزيد ارتفاعها على ٤٠٠٠ متر . وأما جنوب جوجام فالتضاريس هضبية الشكل والمرتفعات البارزة قليلة .

وشكل هذه الجبال يتوقف على الصخور التي تتكون منها ... فإما كان منها مركباً من صخور نارية كان عبارة عن قمم عالية وعرة الانحدار ، وإذا كانت مركبة من الخرسان أو الصخور المتحولة كانت جوانبها منحدرة انحداراً تدريجياً ،

والأجزاء العليا والقمم عادة من صخور البازلت بينما سفوح الجبال كثيراً ما تكون من الحجر الرملى أو من الصخور الأركية .

وجيولوجية هضبة الحبشة كما نعلمها اليوم هى بوجه عام بسيطة ، فلو قطعنا فى الهضبة قطعاً رأسياً لألفينا أساسها الأسفل مكوناً من نفس الصخور المتحولة الأركية التى تتكون منها هضاب وسط أفريقية وشرقها ، والتى فوق هذه الصخور طبقات من الخرسان (الحجر الرملى) يدعوها الجيولوجيون خرسان أدجرات Adigrat وهذه تشبه من بعض الوجوه الخرسان النوبى المنتشر فى وادى النيل شمال الخرطوم لكنها أقدم منه عهداً لأن خرسان أدجرات مرصوص فى بعض المواضع تحت طبقات من الكلس (تدعى طبقات انتالو Antalo Series) ، ويرجع عمرها إلى عصر الجورا ، وفوق كل هذه التكوينات طبقات كثيفة من صخور البازلت وهى التى تكسو هضبة الحبشة وتغطى منها مساحات كبيرة جداً . ثم أخيراً من فوق هذا البازلت صخور طفحجية (لافا) حديثة العهد جداً منتشرة حول بحيرة طانا وفى النصف الشرقى لهضبة الحبشة ، وفى المنخفض الكبير بين هضبة الحبشة وساحل البحر الأحمر (أى إقليم الآفار) .

(١) فاما التكوينات الأركية فتتظهر على سطح الهضبة فى كثير من المواضع حيث أزال التعرية ما قد تراكم فوقها من الصخور الأحدث عهداً . وهذا على الأخص فى أودية الأنهار المختلفة . وكذلك ترى هذه الصخور فى الحافة الشرقية للهضبة ، وأنهار النيل الأزرق والعطبرة وأفرعها ومارب وبركة ، كلها تجري فوق هذه الصخور التى تمتد شمالاً على طول ساحل البحر الأحمر .

(٢) وأما خرسان أديجرات فيرجع تكوينه إلى أوائل الزمن الميزوزوى ، ونظراً لخلوه من الحفريات تقريباً كان من المتعذر تحديد عمره بالدقة ، ومع هذا فإن كرنكل يرى أن معظمه يرجع إلى آخر عهد الثلاثى (ترياس) والأجزاء العليا إلى عهد اللياس Lias ، وإذا ذكرنا أن الخرسان النوبى إنما يرجع تكوينه إلى

العصر الطباشيرى (Cretaceous) أى إلى أواخر الزمن الميوزوى أدركنا أنهما ليسا شيئاً واحداً كما هو مذکور مثلاً فى تقرير بعثة بحيرة طانا (١).
هذا وخرسان أدجرات منتشر فى جوانب هضبة الحبشة شرقاً وغرباً وفى أودية الأنهار حيث كشفت عنه التعرية النهرية . وفى مواضع أخرى قليلة .

(٣) وأما طبقات الكلس المسماة بطبقات أنتالوفى مرصوصة ما بين الخرسان المذكور وبين البازلت وقد وجدت منها فى حوض النيل الأزرق تكوينات سمكها ٦٠ متراً (٢) وطبقاتها أفقية كطبقات الخرسان التى تحتها ، وكلسها رمادى اللون ، ويميل فى بعض المواضع إلى السمرة . وهى ليست بكثيرة الانتشار على سطح الهضبة ، اللهم إلا حيث توجد الأودية الواسعة أو حيث أزلت التعرية صخور البازلت واللافا ، وليس هنالك اختلاف فى أن تكوين هذه الطبقات يرجع إلى عصر الجورا ، فهى والحالة هذه أحدث عهداً من خرسان أدجرات وأقدم من الخرسان النوبى .

على أنه توجد طبقات من الخرسان فى هضبة الحبشة خلاف خرسان أدجرات وهذه هى التى تشابه خرسان بلاد النوبة ؛ وهى متى وجدت كانت فوق طبقات كلس أنتالوفى . ويرجع تكوينها إلى العهد الطباشيرى لخرسان النوبة .

(٤) وأهم صخور هضبة الحبشة من غير شك صخور البازلت والصخور النارية الأخرى التى تكسو القسم الأعظم منها وقد يكون البازلت طبقات كثيفة سمكها يزيد على ألفى متر بل قد يصل إلى ثلاثة آلاف متر ، وإن تكن أقل من هذا بكثير فى بعض المواضع ، والقمم العالية والجبال الشاهقة المنتشرة فى الهضبة كلها مكون من تلك الصخور التى يرجع تكوينها بالطبع إلى تقلبات بركانية (Vulcanism) عنيفة قد اعترت هذه الأنطار فى أعصر جيولوجية مختلفة . وهذه

(١) Report of the Mission to Lake Tana ص ٣٥ .

(٢) تقرير بعثة طانا ص ٣٦ .

الصخور نتيجة انقذاف الحم والصخور الذائبة من فوهات براكين أو من شقوق
وصدوع في الطبقات الأساسية ، ففاضت هذه المقذوقات حتى غشيت القسم
الأعظم من سطح الحبشة .

وصخور البازلت في هذه الهضبة نوعان ، قديم يرجع إلى أواسط أو أواخر
العصر الطباشيري ، وقد سماه بلاندفورد Blandford باسم طبقات أشانجي
"Ashangi Series" . وحديث يرجع إلى العصر الثالث والرابع وتسمى صخوره
بطبقات مجدالا "Magdala Serie" وهو مرتبط بتكوين الأخدود الإفريقي
الأعظم والتقلبات الأرضية العنيفة التي انتابت شرق أفريقيا حيثئذ ، والطبقات
العليا مرصوفة رصاً أفقياً منتظماً فوق طبقات البازلت السفلى وأما هذه فقد تأثرت
من غير شك بالحوادث الجيولوجية الحديثة فأصابها التواء وانحناء في كثير من
المواضع . كما أنها بقيت مدة طويلة (طوال عصر الأيوسين ؟) عرضة لعوامل التعرية
التي فككت بعض أجزائها ، إلى أن حل عصر الأوليجوسين فبدأت مقذوقات
مجدالا تغطي عليها وتغطيها ، وبقيت هذه الحال إلى نهاية العصر الثالث وأوائل
الرابع ، وطبقات البازلت القديمة لا يزيد سمكها على ٧٠٠ متر بناء على تقدير
جراهم ، وأما البازلت الأحدث فقد يصل سمكه إلى ٢٦٠٠ متر .

وعدا طبقات البازلت هذه فإن هنالك صخوراً طفحية حديثة منتشرة شرقي
هضبة الحبشة إلى ساحل البحر الأحمر . وسكة حديد جيبوتي إلى عاصمة الحبشة
ممتدة فوق هذه الصخور ، وهذا الإقليم خارج عن حوض النيل لكن تلك
الصخور التي يرجع تاريخ تكوينها إلى أوائل العصر الرابع منتشرة أيضاً حول
بحيرة طانا وعلى الأخص عند طرفها الجنوبي حيث تدعى بصخور بحردار جرجس
وهذه الصخور مزيج من البازلت والأوليفين ، وهي ممتدة في شرق وغرب نهر

آبای الأصغر وحول مخرج النيل الأزرق من بحيرة طانا حيث تكون حاجزاً عرضياً ، هو السبب في حجز مياه كثير من الأنهار وفي تجمعها على شكل بحيرة .

* * *

هضبة الحبشة إذن كانت جزءاً من الهضبة الإفريقية تتركب من الصخور الأركية المتحولة ، وفي آخر الزمن الباليوزوى أو أوائل الميزوزوى تكونت فوقها طبقات الخرسان ، ثم طغى بحر الجورا فتكونت طبقات الكلس من رواسبه . وقد بقيت هذه المنطقة تغمرها مياه البحر الطباشيري مدة وجيزة جداً لأن رواسب هذا البحر قليلة السمك . ثم ارتفعت في أواسط العصر الطباشيري ، وبدأت في نهايته الحركات البركانية التي تراكت فيها صخور البازلت المعروفة بأشانجي وأعقب هذا فترة هدوء تعرض فيها البازلت الأول لعوامل التعرية وفي الأوليجوسين بدأت المقذوفات البركانية تفيض على هضبة الحبشة بطبقات جديدة من البازلت وهذا استمر إلى البليوسين . وفي العصر الرابع تجدد انقذاف صخور طفحية جديدة ، ولعل هذه الأقطار لم تصل بعد إلى حالة استقرار .

هذا وارتفاع هضبة الحبشة يرجع فيما يظهر إلى أسباب ثلاثة : أولاً ارتفاع هذه الكتلة من سطح الأرض (elevation) ، ثانياً هبوط ما حولها من الأصقاع ، ثالثاً تراكم المواد والصخور البركانية . فليست هضبة الحبشة مجرد هورست Horst فقط بل هي هورست تغطية طبقات سميكة من الصخور النارية .

ولا بد لنا قبل ختام الكلام على جيولوجية الحبشة أن نذكر أن صخور البازلت هذه متى تفككت وتفتتت كونت تربة حمراء ذات خصوبة نادرة ، وهي التربة السائدة في بلاد الحبشة وهي أيضاً التي تحملها أنهار الحبشة إلى أرض مصر

* * *

بحيرة طانا :

تتجمع المياه العليا للنيل الأزرق في بحيرة طانا كما تتجمع مياه أعلى النيل من جهة الهضبة الاستوائية في بحيرة فكتوريا . ومستوى بحيرة طانا يبلغ نحو ١٨٤٠ متراً فوق سطح البحر فهي أعلى من بحيرة فكتوريا بأكثر من ٧٠٠ متر، ومساحتها نحو ٣٠٦٠ كم^٢ وموقع البحيرة قريب جداً إلى الحافة الغربية من هضبة الحبشة ، وليس في وسطها كما كان يتوهم بعض الجغرافيين ، فإن بعثة الحكومة المصرية التي ارتادت بحيرة طانا في عام ١٩٢٠ و ١٩٢١ قد وفقت إلى تحديد موقع البحيرة فإذا هي لا تبعد إلا بضعة كيلومترات عن المرتفعات والتلال escarpments التي تكون الحافة الغربية لهضبة الحبشة ، وبهذا تكون منابع العطبرة والدندر والرهذ أقرب إلى غرب الهضبة مما قد يظن ، حتى إن المستر دپوي كان يرى إمكان تحويل مياه بحيرة طانا إلى نهر العطبرة بواسطة نفق لا يزيد طوله على ثلاثة عشرة كيلومتراً . وإن لم يكن من الصواب محاولة تنفيذ مثل هذا الرأي .

وارتفاع الحافة الغربية لهضبة الحبشة يبلغ ٢٣٠٠ متر، فالذهاب من بحيرة طانا نحو السودان بعد مسيرة بضعة كيلومترات يرقى إلى ذلك الارتفاع ثم يهبط بسرعة إلى ارتفاع نحو ١٢٠٠ متر وبعد ذلك ينحدر تدريجاً إلى سهول السودان ، وأعضاء بعثة بحيرة طانا لا يرون أن هنالك عيوباً في هذه المنطقة سببت تلك المنحدرات الوعرة ويرون أن سببها التقرية البسيطة^(١) .

والمرتفعات الشمالية التي تفصل بين حوض البحيرة و منابع العطبرة ليست بالكثيرة الارتفاع . والساحل الشمالى للبحيرة تتوسطه شبه جزيرة صخرية تدعى جرجورا Gorgora و إلى الشمال منها سهل فسيح يدعى سهل دنبعة Dembia plain

(١) ص ٣١ من تقرير البعثة المذكورة طبع بالإنكليزية (١٩٢٥) بالمطبعة الأميرية .

وهو سهل رسوبى متركب من رواسب أنهار ماجاتش ودمبرا وإلى الجهة الشمالية الشرقية جبال عالية تبلغ زهاء ٤٠٠٠ متر، وهى الحد الفاصل بين أنهار البحيرة وبين مياه نهر سقيت أوتكازى . وهذه الجبال تقترب من البحيرة فى الجهة الشمالية الشرقية حتى تكون ملاصقة لساحلها . وإلى جنوب تلك الجبال وبجذاء الساحل الشرقى سهل رسوبى آخر اسمه سهل فوغارا (Fogara plain) ، وهو يتركب من رواسب نهري رب Reb وغمارا Gumara ومساحة هذا السهل نحو ٣٠٠ كيلومتر مربع وينتهى من جهة الشرق إلى جبال عالية . وحين يرتفع مستوى البحيرة فى زمن الأمطار تغمر مياهها قسما عظيما من سهل فوغارا إلى بعد سبعة كيلومترات من الحافة الشرقية للبحيرة .

وإلى جنوب البحيرة إقليم جبلى آخر ، ومن بين أعلامه الشاهقة جبال أميداميت التى يزيد ارتفاعها على أربعة آلاف متر .

والسواحل بوجه عام منخفضة إلا فى المواضع القليلة التى تقترب الجبال فيها من البحيرة . والأهالى يفضلون الابتعاد عن السواحل ، ويؤثرون السكنى فى المرتفعات التى وراءها ... وعادتهم أن يقسموا البلاد إلى ثلاثة أضرب : الأول ما كان منخفضاً ويدعونه كُلا (kolla) ، وهو ما لا يزيد ارتفاعه عن نحو ١٨٠٠ متر ، والضرب الثانى ما كان متوسط الارتفاع ويدعونه ويناديجا Woina Dega وهو ما يتراوح ارتفاعه بين ١٨٠٠ و ٢٤٠٠ متر فوق سطح البحر ثم الديجا Dega وهى الأقطار الشديدة العلو التى يزيد ارتفاعها على ٢٤٠٠ متر . وهم على وجه العموم يفضلون الضرب الثانى على ما سواه ، لكن سواحل بحيرة طانا وإن كانت من هذا النوع غير أن احتمال طغيان البحيرة وقت الفيضان وانتشار البعوض فى بعض نواحيها رغب الأهالى عنها . فهم إنما ينزلون إلى سواحلها ما بين ديسمبر ويونيو طلبا للمرعى فى السهول الساحلية ، والمساحة المنزرعة على السواحل قليلة .

بحيرة طانا :

تتجمع المياه العليا للنيل الأزرق في بحيرة طانا كما تتجمع مياه أعلى النيل من جهة الهضبة الاستوائية في بحيرة فكتوريا . ومستوى بحيرة طانا يبلغ نحو ١٨٤٠ متراً فوق سطح البحر فهي أعلى من بحيرة فكتوريا بأكثر من ٧٠٠ متر، ومساحتها نحو ٣٠٦٠ كم^٢ وموقع البحيرة قريب جداً إلى الحافة الغربية من هضبة الحبشة ، وليس في وسطها كما كان يتوهم بعض الجغرافيين ، فإن بعثة الحكومة المصرية التي ارتادت بحيرة طانا في عام ١٩٢٠ و ١٩٢١ قد وقفت إلى تحديد موقع البحيرة فإذا هي لا تبعد إلا بضعة كيلومترات عن المرتفعات والتلال escarpments التي تكون الحافة الغربية لهضبة الحبشة ، وبهذا تكون منابع العطبرة والدندر والرهة أقرب إلى غرب الهضبة مما قد يظن ، حتى إن المستر ديبوي كان يرى إمكان تحويل مياه بحيرة طانا إلى نهر العطبرة بواسطة نفق لا يزيد طوله على ثلاثة عشرة كيلومتراً . وإن لم يكن من الصواب محاولة تنفيذ مثل هذا الرأي .

وارتفاع الحافة الغربية لهضبة الحبشة يبلغ ٢٣٠٠ متر، فالذهاب من بحيرة طانا نحو السودان بعد مسيرة بضعة كيلومترات يرقى إلى ذلك الارتفاع ثم يهبط بسرعة إلى ارتفاع نحو ١٢٠٠ متر وبعد ذلك يفحدر تدريجاً إلى سهول السودان ، وأعضاء بعثة بحيرة طانا لا يرون أن هنالك عيوباً في هذه المنطقة سببت تلك المنحدرات الوعرة ويرون أن سببها القعرية البسيطة^(١) .

والمرتفعات الشمالية التي تفصل بين حوض البحيرة و منابع العطبرة ليست بالكثيرة الارتفاع . والساحل الشمالى للبحيرة تتوسطه شبه جزيرة صخرية تدعى جر جورا Gorgora و إلى الشمال منها سهل فسيح يدعى سهل دنبة Dembia plain

(١) ص ٣١ من تقرير البعثة المذكورة طبع بالإنكليزية (١٩٢٥) بالمطبعة الأميرية .

وهو سهل رسوبى متركب من رواسب أنهار ماجاتش وديمبرا وإلى الجهة الشمالية الشرقية جبال عالية تبلغ زهاء ٤٠٠٠ متر، وهى الحد الفاصل بين أنهار البحيرة وبين مياه نهر ستيت أوتكازى . وهذه الجبال تقترب من البحيرة فى الجهة الشمالية الشرقية حتى تكون ملاصقة لساحلها . وإلى جنوب تلك الجبال وبحذاء الساحل الشرقى سهل رسوبى آخر اسمه سهل فوغارا (Fogara plain) ، وهو يتركب من رواسب نهري رب Reb وغمارا Gumara ومساحة هذا السهل نحو ٣٠٠ كيلومتر مربع وينتهى من جهة الشرق إلى جبال عالية . وحين يرتفع مستوى البحيرة فى زمن الأمطار تغمر مياهها قسما عظيما من سهل فوغارا إلى بعد سبعة كيلومترات من الحافة الشرقية للبحيرة .

وإلى جنوب البحيرة إقليم جبلى آخر ، ومن بين أعلامه الشاهقة جبال أميداميت التى يزيد ارتفاعها على أربعة آلاف متر .

والسواحل بوجه عام منخفضة إلا فى المواضع القليلة التى تقترب الجبال فيها من البحيرة . والأهالى يفضلون الابتعاد عن السواحل ، ويؤثرون السكنى فى المرتفعات التى وراءها ... وعادتهم أن يقسموا البلاد إلى ثلاثة أضرب : الأول ما كان منخفضاً ويدعونه كُلا (kolla) ، وهو ما لا يزيد ارتفاعه عن نحو ١٨٠٠ متر ، والضرب الثانى ما كان متوسط الارتفاع ويدعونه ويناديجا Woina Dega وهو ما يتراوح ارتفاعه بين ١٨٠٠ و ٢٤٠٠ متر فوق سطح البحر ثم الديجا Dega وهى الأقطار الشديدة العلو التى يزيد ارتفاعها على ٢٤٠٠ متر . وهم على وجه العموم يفضلون الضرب الثانى على ما سواه ، لسكن سواحل بحيرة طانا وإن كانت من هذا النوع غير أن احتمال طغيان البحيرة وقت الفيضان وانتشار البعوض فى بعض نواحيها رغب الأهالى عنها . فهم إنما ينزلون إلى سواحلها ما بين ديسمبر ويونيو طلبا للزراعة فى السهول الساحلية ، والمساحة المنزرعة على السواحل قليلة .

وبالقرب من سواحل البحيرة المختلفة جزر صغيرة عديدة ، لكن أهم الجزر الآلهة بالسكان جزيرتا دك Dek وديغا Dega . وهما في القسم الجنوبي الغربي من البحيرة والأولى أكبرهما ، وعلى كثير من الجزر الصغرى معابد وأديرة .

لعل استدارة شكل بحيرة طانا أوهم كثيراً من الجغرافيين أن أصلها فوهة بركان . وقد ينخدع بمثل هذا التعليل من لم ير هذه البحيرة إلا في خريطة لأفريقية ذات مقياس صغير فتبدو البحيرة مستديرة كأنها فوهة بركان امتلأت ماء ؛ ولكن أى بركان هذا الذى قطر فوهته ستون أو سبعون كيلومتراً . ثم ماذا تكون مساحة قاعدته ، بل وأين تلك القاعدة ؟ إن قليلاً من التفكير ~~لن يقنعنا~~ ^{لن يقنعنا} بأن البحيرة ليست بفوهة بركان . كان حوض البحيرة فيما مضى حوضاً تجري فيه جداول وأنهار تتحد جميعاً لتسكون النيل الأزرق ، ثم كان ما ذكرناه من قبل من انقذاف المواد البركانية بكثرة هائلة في منطقة بحر دار جرجس والأقطار المتاخمة لها . فسدت هذه الصخور البركانية طريق جريان تلك الأنهار وكونت حاجزاً صخرياً ممتداً من الغرب إلى الشرق ، فعاقبت مسيل تلك الأنهار فتمعنت مياهها فيما وراء ذلك الحاجز ، وهكذا نشأت بحيرة طانا في عصر البلستوسين ، ولم يمض على تكوينها والحالة هذه زمن طويل . والصخور الجنوبية وعلى الأخص بالقرب من بحر دار جرجس في حالة من الجسدة وقلة التأثير بالتعرية بحيث لا تدع مجالاً للشك في حداثة عهدها . وهى الصخور التى كانت بتراكمتها سبباً في تكوين البحيرة . وبعثة بحيرة طانا ترى أن عمر البحيرة قد لا يعدو عشرة آلاف عام ، وهو تقدير لا يستند إلى بحث مستفيض^(١) . ومن قبل تكونها كان النيل الأزرق يغتذى من مياه الأنهار والجداول التى تنصب الآن في البحيرة مباشرة من غير وساطة البحيرة .


والأنهار والجداول والمسيلات التي تنحدر إلى البحيرة كثيرة جداً ، وقد ذكرنا بعضها من قبل وأهمها نهر ماجاتش Magach ودمبرا Dimbra شمالاً ونهر رب Reb وغمارا Gumara شرقاً ، ونهر أباي Abai الصغير وهو يصدر عن المرتفعات الواقعة جنوب غربى البحيرة . ويمجرى نحو الشمال فى مسيل قد يبلغ اتساعه مائة متر فى بعض المواضع . واتجاه مجراه كما رأينا من الجنوب إلى الشمال أى بعكس مجرى النيل الأزرق (الآبى الأكبر) حين يخرج من بحيرة طانا . وهذا قد يرى غريباً لأن المجرىين فى إقليم واحد ، وقد يقتربان بحيث لا يفصل الواحد عن الآخر أكثر من خمسين كيلومتراً . ولو كانت هذه الحال فى منطقة جبال التوائية تجرى أنهارها تبعاً لميل طبقاتها لكانت تلك الظاهرة غريبة . ولكها فى إقليم بركانى قد تراكت فيه الصخور البركانية فى مواضع شتى من غير أن تتبع نظاماً مطرداً . وما يقال عن اتجاه نهر الآبى الأصغر يقال مثله عن اتجاه نهر غمارا .

النيل الأزرق :

وتتجمع مياه هذه الأنهار فى بحيرة طانا ملقمة على جوانبها وقاعها ما تحمله من الرواسب فيخرج منها ماء النيل الأزرق نظيفاً لا يحمل من الرواسب شيئاً . ومقدرته على التعرية ضعيفة ، فالوادى ليس عميقاً والضفاف منخفضة .

ويخرج النيل الأزرق فى خليج ممتد إلى الجنوب ويعترض المخرج جزيرتان : دبرا سرىم Debra Maria وشىابو Shimabbo : وهما تقسمان مخرج النهر إلى ثلاثة طرق : والجنوبية منها قليلة الأهمية ، والشمالية تدعى رأس الآبى (واتساعها نحو ٣٠٠ متر) والوسطى بوغاز دبرا سرىم (٧٥ متراً) .

ويحفر بالمخرج على جانبيه برك ومستنقعات تكثر على الضفة الغربية جنوبى بحر دار جرجس . وإلى شرق جزيرة دبرا سرىم خليج عرضه ٦٠٠ متر ، فى جنوبه



(شکل ۱۲) منبع الآبای

جزر عديدة وجنادل تشارا تشارا التي تعترض مجرى الآبای الأكبر ، وإلى ما بعد هذه الجنادل بنحو اثني عشر كيلومترا بجري النهر إلى الجنوب في مجرى تتراوح سعته ما بين ٢٠٠ و ٣٠٠ متر وإلى غربه مستنقعات . وفي مجراه بعض الالتواء ، حتى إذا وصل النهر إلى منحدرات بوري فازاس (Burifasas) ضاق مجراه إلى نحو مائة متر واشتد جريان الماء . ومن بعد هذه المندفعات يتسع المجرى إلى أكثر من ٣٠٠ متر وتعرضه تلال اجر بار Egirrbar فيغير النهر اتجاهه ويدور حول هذه التلال ملتزما جانبها الغربي . وهنا يضيق المجرى ثانية . وينتهي بعد ذلك إلى شلالات أرافامي Arafami ، وهي تبعد عن نهاية بحيرة طانا بنحو اثني عشر كيلومترا ؛ وهنا تعترض مجرى النهر طبقات من صخور اللافا فيسقط النهر عن شلالات ارتفاعها نحو سبعة أمتار في زمن الجفاف وتزيد على هذا من غير شك في زمن الفيضان .

والنهر في كل هذه المنطقة يجري ما بين صخور اللافا عن اليمين وطبقات البازلت عن الشمال ؛ في واد غير مرتفع الجوانب لقلة حفر النهر لمجراه ، وقاعه صخري اللهم إلا في قليل من المواضع حيث تكسو الصخور طبقة صغيرة من الرمل أو الطين .

من بعد شلالات أرافامي يغير النهر اتجاهه فيجري إلى الشرق فالجنوب ويرسم مجراه خطاً ملتوياً التواء عظيماً في إقليم جوجم Gojam ، (شكل ١١) وكأنه ليس للنهر هنا اتجاه خاص ؛ وقد يظن لأول وهلة أن هنالك سراً غامضاً ، لاتخاذ النهر هذا الطريق الملتوى . ولكن مثل هذا الافتراض إنما يجوز إذا كانت هضبة الحبشة نفسها مطردة في نظام تضاريسها واتجاه منحدراتها . ولكن الحبشة إقليم بركاني تراكمت فوقه المقذوفات البركانية في مساحات خاصة ، ومن غير أن يكون هنالك نظام دقيق وزعت بمقتضاه هذه المواد البركانية فهي كما رأينا منشرة بكثرة في سائر الهضبة ومنها كتل كبرى متراكمة على شكل جبال منها

ما هو في الشمال ومنها ما هو في الجنوب وأخرى غيرها في الوسط وهلم جرا . فمن هذه السكتل البركانية ما هو منتشر في جنوب وجنوب شرقى بحيرة طانا بحيث يعترض جريان النيل الأزرق في ذلك الاتجاه ، لهذا يرسم النهر دائرة كبرى متجنباً المرتفعات المذكورة ، حتى إذا تجاوزها أخذ اتجاهه يتحول إلى الغرب فالشمال الغربى . ولو أن هضبة الحبشة كانت التوائية folded plateau لكان لصخورها ميل خاص وانحدار خاص ولكان من المنتظر في تلك الحالة أن تجري الأنهار تبعاً لميل الطبقات ولاستفكرنا التواء النيل الأزرق في إقليم جوجم بالشكل المذكور ، لكن هضبة الحبشة بركانية التضاريس غير خاضعة لمثل ذلك النظام .

يسيل النيل الأزرق في إقليم جوجم فلا يلبث حتى تنحدر إليه من المرتفعات الجانبية جداول وروافد كثيرة ، والنهر هنا شديد الجريان وكثير الحفر لجراه ، وواديه عبارة عن خانق عميق جدا في بعض المواضع بحيث يقرب عمقه من ١٥٠٠ متر^(١) واتساع أعلى الوادى قد يصل إلى بضعة كيلومترات . وتبدو في جوانبه



(شكل ١٣) قطاع مستعرض لنهر الآبای

الصخور التي تتركب منها هضبة الحبشة : ففي بعض المواضع قد ترى في أسفل الوادى وعن جانبيه الصخور الأركية المتحولة . ومن فوقها خرسان أدجرات

(١) كرنسكل عن ٢٠٠ .

وكاس أنقالو . فالخرسان النوبى فصخور البازلت واللافا . وعند الطبقتين الأولى والأخيرة تكون جدران الوادى رأسية أو شديدة الانحدار . وحيث توجد الطبقات الأخرى تكون جوانبه مدرجة Terraced أو ضعيفة الانحدار . (شكل ١٣)
والنيل الأزرق بوجه عام نهر جبلى شديد الانحدار فى كل مجراه من بحيرة طانا إلى الخرطوم ، فستوى بحيرة طانا ١٨٤٠ متراً والخرطوم أقل من ٤٠٠ متر فوق سطح البحر ؛ فيكون انحدار النهر ١٤٤٠ متراً فى مسافة ١٦٢٢ كيلومتراً .
وأكثر ما يكون هذا الانحدار فى الشطر الأعلى للنهر ما بين منابعه وبين بلدة الرصيرص التى تعلو عن سطح البحر بنحو ٤٦٦ متراً فالانحدار فيما بعد الرصيرص ضعيف ؛ وهذا التغير الفجائى فى الانحدار كان له أثره فى تكوين حوض النيل الأزرق فيما بعد هذه البلدة ؛ فمن هنالك إلى الخرطوم (٦٤٠ كيلومتراً) يجرى النهر وسط سهول رسوبية تكونت فى زمن كان فيه فيضان النهر يعم مساحات عظيمة فى هذه المنطقة . وتكوين هذه السهول الرسوبية له نظيره تماماً فى حوض السوبات بعد خروجه من هضبة الحبشة . والنيل الأزرق هنا يجرى فى واد كثير الالتواءات كشأن الأنهار التى تلقى بكثير مما تحمل من الرواسب أثناء جريانها فى أرض سهلة أو قليلة الانحدار نسبياً .

وتعترض النيل الأزرق لدى الرصيرص جنادل ؛ من بعدها يصلح النهر للملاحة حتى الخرطوم متى توفرت المياه للسفن النهرية .

ولا يفوتنا أن نلاحظ أن الرصيرص واقعة على نفس خط العرض الذى يخترق بحيرة طانا (١١٥١° شمالاً) فهى إذن واقعة غربى تلك البحيرة ؛ والمسافة التى تفصلهما لا تزيد على ٣٠٠ كيلومتر . ولكن النيل الأزرق لا ينحدر إلى الرصيرص بطريق مستقيم ومباشر كما تنحدر أنهار الدندر والرهذ والعطبرة إلى سهول السودان بل ينحنى النهر كما ذكرنا قبلاً إلى الجنوب الشرقى ثم الجنوب الغربى فإلى الغرب وأخيراً بعد اتصاله بنهر ديديسا Didessa يتجه النهر باطراد إلى الشمال الغربى .

فبدلاً من أن يصل النيل الأزرق إلى الرصيرص بعد أن يجري نحو ٣٠٠ كيلومتراً أو ٤٠٠ نجده يصل إلى تلك البلدة بعد جريان ٩٧٥ كيلومتراً^(١) سالكا إليها طريقاً بعيدة ومختراً أقطاراً عديدة . وسواء كان هنالك سبب غامض لجريان النهر على هذا الوجه أم لم يكن ، فإن لهذه الحالة أثراً كبيراً في جغرافية النهر ومقدار ما يحمله من الماء . ويعم تأثيرها نهر النيل كله .

لو كان النيل الأزرق يجري من بحيرة طانا مغرباً نحو سهول السودان سالكا إليها أقصر السبل لكان شأنه شأن الدندر والرهد والعطبرة . ولما امتاز عليها إلا قليلاً . لكنه لا يجري إلى سهول السودان مباشرة ، بل يطوف ما يطوف وسط هضبة الحبشة ، وهو لا يكاد يجري بضع كيلومترات حتى يلتقط مياه جدول سيال أو نهر فياض ولا يجري بعيداً حتى ينصب فيه جعفر كبير ذو شأن ، فلا يخرج النيل الأزرق من هضبة الحبشة وهي إقليم المطر والماء حتى يكون قد استوعب واستجمع من مياهها ومياه أنهارها بل ومن طينها وتربتها مقادير هائلة جعلته سيد جميع الأنهار التي تغذى النيل .

ومنابع أنهار النيل الأزرق وروافده منتشرة في هضبة الحبشة ما بين خطي عرض ٨° و ١٣° وليست قاصرة على جزء محدود من الهضبة . فالمساحة التي تغذى النهر عظيمة وروافده صخرية المجرى شديدة الانحدار لا تحف بها مستنقعات ولا يفقدها التبخر إلا القليل من مياهها . وهذه الروافد كثيرة العدد ، ولنكتفئ هنا بذكر المهم منها ، فمن الجانب الأيسر يصب في النيل الأزرق نهر جَمَّا Jamma وموَجِر Muger وجودر Guder وهي جميعاً تجري من مرتفعات شوا ، والثاني منها ينبع في شمال أديس أبابا . ومن بعد هذه يتحد النيل الأزرق بنهر ديديسا وهو أهم روافده اليسرى . ومنابع هذا النهر عند خط عرض ٨° بالقرب من منابع السوبات وجريانه إلى الشمال الغربي ، وسعة مجراه نحو ١٠٠ متر قرب اتصاله بالنيل

(١) هذا الرقم عن ولسكوكس وكريج ص ٢٨١ .

الأزرق ومن بعد الديديسا يجرى إلى النيل الأزرق نهر دابوس أو يابوس ومنابعه في الحافة الغربية للهضبة ومجراه إلى الشمال الشرق^(١).

على أن أم روافد النيل الأزرق هي بلا شك الدندر والرهـد ومنابعهما في هضبة الحبشة في الشمال الغربي من طانا ، ونهر جيرا Gira وهو أم روافد الرهد لا تبعد منابعه بأكثر من عشرين كيلومترا عن تلك البحيرة ، ومثل هذا يقال أيضاً عن نهر السد Sidd وهو من أم روافد الدندر . وكلا هذين الرافدين يجرى إلى سهول السودان ، واتجاه مجراهما نحو الشمال الغربي حتى يصب الدندر في النيل الأزرق بالقرب من عرض ١٤ والرهـد بالقرب من واد مدنى . ولعل الدندر هو أم الرافدين على الأخص من حيث مقدار ما يحمله من الماء وكلاهما كثير الانحناء والاتواء في جريانه في سهول السودان ... وهذه الالتواءات التي لهذهين النهرين وللنيل الأزرق نفسه ليست ثابتة على حال واحد بل يطرأ عليها التغيرات طبقاً لناموس جريان الأنهار في السهول الرسوبية : ويظهر من الخرائط أن هنالك بحيرات منقطعة عن النهر والتواءات حادة جداً وجزراً عديدة تعترض مسيل النهر^(٢).

هذا والنيل الأزرق في الإقليم ما بين الرصيرص والخرطوم نهر متسع المجرى تتراوح سعته ما بين ٤٠٠ و ٧٠٠ متر . ولدى الخرطوم يلتقى بالنيل الأبيض في شكل زاوية قائمة يكون عندها النيل الأزرق متجهاً من الشرق إلى الغرب والأبيض من الجنوب إلى الشمال (شكل ١٤)

(١) ليونز يقول خطأ بأن منابعه في جبال شانجل (ص ٢٢٣) مع أنها أقرب إلى مصبه منها إلى منابعه . وأقرب الجبال إلى منابع دابوس جبل كرشه (٢١٠٠ م) [J. Kershe] .
(٢) راجع خريطة السودان مقياس ١ : ٣٥٠,٠٠٠ الإقليم ما بين سنار وواد مدنى .

المطبرة :

ولعل هذا خير موضع للسلام على المطبرة ، ومنابع هذا النهر واقعة في هضبة الحبشة في إقليمين مختلفين الأول شمالها الغربي والثاني حافتها الشرقية ، والمنابع الأولى واقعة شمال شرق بحيرة طانا في إقليم غندار (Gondar) فهناك ينبع نهر السلام ويجرى أولاً إلى الشمال الغربي ثم إلى الغرب ومن روافده نهر عنجريب (Angareb) وجرما (Germa) . وفي إقليم غندار أيضاً ينبع نهر غوانج (Goang) ونهر غندوه ومنابعهما قريبة من منابع نهر الرهد . ويتحدان غير بعيد من بلدة القلابات ويتكون المطبرة من اتحادهما معاً ويتصل نهر السلام بهما بعد اتحادهما بنحو مائة كيلومتر .

على أن هذه الأنهار كلها ليست أهم روافد المطبرة . وإنما أهم روافده وأطولها وأغزرها ماء هو نهر تاكازي (Takazze or Takazye) ويدعى في السودان نهر ستميت ، ومنابع هذا النهر واقعة في شرق هضبة الحبشة على درجة عرض ١٢° وروافده عديدة جداً . ويجراها فيما بين درجة عرض ١٢° و ١٤° برسم انحنائين وقد يشبه حرف الـ Z ، وهو أطول روافد المطبرة . وإن لم يكن طوله معروفاً تماماً فلهل ما ذكره ليونز صحيح بأنه يبلغ ٧٦٤ كيلومتراً من منابعه إلى نقطة اتصاله بالمطبرة .

وبينما روافد المطبرة الأخرى تنحدر من هضبة الحبشة إلى سهول السودان مباشرة فإن تكازي يجري إلى مسافات بعيدة في قلب هضبة الحبشة كما يفعل النيل الأزرق ويتغذى من مياه أقطار مختلفة ، وواديه الأعلى عميق جداً ومتسع . فقد جاء في كتاب ليونز^(١) نقلاً عن الرحالة رولفس Rohlf's أن عمق وادي التكازي غير بعيد جداً من منابعه يبلغ ٨٠٠ — ٩٠٠ متر واتساع الوادي ٤ ١/٣ كيلومتر

(١) Physiography of the Nile ص ٢٣٣ وما بعدها .

واتساع قاعه ٣٠٠ متر . واتساع النهر نفسه ١٠٠ متر وانحداره شديد جداً بمقدار ١٢١ متر فى الكيلومتر الواحد . ويعلو مستوى النهر وقت الفيضان بنحو ٦ أمتار عنه فى زمن الجفاف .

ولعل كثيراً من هذه الأرقام قابل للتعديل ، لأن علمنا بجغرافية هذا الإقليم قليل . ونهر العظيرة لو نظرنا إليه نظرة شاملة لألفيناه نهراً جبلياً يحاكى نظامه جريان السيل الجارف لا مسيل الانهار الدائمة . فهو يحف فى وقت التحريق حتى لا يبقى فى أكثر مجراه ماء مطلقاً ؛ حتى إذا هطلت الامطار فى الحبشة فى أواخر مايو وفى يونيو ازداد مستوى النهر وجاء الفيضان فجأة .

والمسافة بين نقطة التقاء نهركازى بالعظيرة وبين نقطة التقاء العظيرة بالنيل عند بلدة العظيرة ، إلى جنوب بلدة بربر ، وطولها نحو ٥٠٠ كيلو متر واقعة كلها فى سهول السودان خارج هضبة الحبشة . ولكن النهر رغم هذا لا يشابه النيل الأزرق فى مثل هذا الجزء من مجراه . فليست له تلك الالتواءات والانحناءات الكثيرة التى للنيل الأزرق فيما بعد الرصيرص . ولعل السبب فى ذلك شدة انحدار النهر وشدة اندفاع مياهه . فإن انحداره ما بين خشم القربة والنيل لا يقل عن ١:١ بينا انحدار النيل الأزرق قد يبلغ ١:١٠ فيما بين الرصيرص والخرطوم ولشدة انحدار العظيرة استطاع أن يحمل من الطين والرواسب الأخرى إلى نهر النيل أكثر مما يحمله أى نهر آخر — بالنسبة لحجمه وطوله — وهو آخر روافد النيل الكبرى ، فلا يتصل بالنيل بعد العظيرة رافد ذو شأن بل أخوار وسيول قليلة الأهمية من الناحية المائية .

ومن هذه الأخوار ما قد يعجز عن الوصول إلى النيل لقلة مائه وانحداره ، فتنتهى مياهه إلى منخفض فى الصحراء : وأشهر هذه من غير شك هو خور الجاش وينبع الجاش فى أقصى الشمال الشرقى لهضبة الحبشة ، ومجراه الأعلى هو الحد الفاصل بين بلاد أرتريا والحبشة . وبعد هذا يكون مجراه فى داخل بلاد

أرتريا ، ثم في سهول السودان الشرقية بالقرب من بلدة كسلا . ويطلق عليه في مجراه الأعلى اسم مارب وهو هنالك نهر متوسط العمق شديد الانحدار . أما في السودان فواديته قليل العمق جداً ويكاد قاعه أن يكون في مستوى السهول التي يجري وسطها . ولهذا فإن كثيراً من مائه يفيض على جانبي الوادي .

وخور الجاش يفيض مدة لا تزيد على الثمانين يوماً من أوائل يوليو إلى أواخر سبتمبر . وفيما عدا ذلك فإن مجرى النهر خال من الماء تماماً ؛ ومياهه تنتهي بشبه دلتا رأسها عند بلدة كسلا وسهايتها الإقليم المنخفض الواقع شمال تلك المدينة . فمن بعد بلدة كسلا مباشرة يتشعب المجرى شعباً كثيرة ؛ وهذه تعود فيتحده بعضها مع بعض . ثم تضيق مياهها وتختفي معالمها وسط إقليم شبه صحراوي ، يبعد عن كسلا بنحو ١٠٠ كيلو متر إلى جهة الشمال ^(١) .

وليس خور الجاش من روافد العطبرة كما قد يُتوهم من تصفح بعض الخرائط القديمة . وإن كان من الجائز في الأعوام النادرة التي يزيد فيها المطر عن المعتاد أن يعلا مستوى خور الجاش حتى تصل بعض مياهه إلى العطبرة بالقرب من قرية اسمها أداراما Adarama . ورغم هذا فالجاش داخل في حيز حوض النيل وإن لم يصل من مائه إلى النيل شيء . ولو كان هنالك حاجة بالنيل لماء الجاش لما كان من المستحيل توصيله بالعطبرة .

هذه حالة الجاش الطبيعية ولكن بعض المشاريع الهندسية قد أقيمت على النهر من أجل الانتفاع بمائه في رى سهل كسلا . فأنشئت قناطر لتنظيم فيضانه ، وحفرت الترع والمصارف ، لتيسير زراعة مساحة من الأرض تتراوح بين الثلاثين والخمسين ألفاً من الأفدنة .

(١) انظر تقرير ديبوي عن خور الجاش ص ٣٢ وهو في آخر كتاب غارستن عن أعالي النيل . والوصف المذكور هو لدلتا الجاش في حالتها الطبيعية ، وقبل استخدام فيضانه في المشروعات الزراعية .

الفصل السابع

النيل بين الخرطوم والبحر الأبيض المتوسط

يتجه النيل الأزرق — في نهايته — اتجاهها من الشرق نحو الغرب ، ويوشك أن يحكى هذا الاتجاه زاوية فائئة مع اتجاه النيل الأبيض . وعلى هذا الجزء من النيل الأزرق — ذى الاتجاه الشرقى الغربى — تقع مدينة الخرطوم على الضفة اليسرى أو الجنوبية من النهر . فليست الخرطوم كما يتوهم البعض واقعة عند التقاء النيلين الأزرق والأبيض ، بل تقع كلها على النيل الأزرق ووجهتها نحو الشمال . وفيما يليها نحو الغرب موضع يدعى مُقرن ، هو أقرب إلى نقطة التقاء النهرين ، ولكنه اشتهر ، بوجه خاص ، لأنه الموضع الذى تبدأ منه حركة النقل النهري فى مختلف الجهات فى النيل الأزرق والأبيض أو فى النيل شمال الخرطوم .

ولنقطة التقاء النيل الأزرق والأبيض أهمية عظيمة فى الدراسات الجغرافية ، لأنها ترينا فى وضوح تلك الظاهرات التى تحدث عندما تلتقى مياه سريعة محملة بالرواسب بمياه بطيئة قليلة الرواسب ، وقد ترتب على تدافع مياه النهرين ، إلقاء النيل الأزرق بكثير من رواسبه ، وهذه نراها فى صورة جزر وسط النهر ، أو مساحات رسوبية ملاصقة للشاطئ^١ (راجع شكل ١٤) .

تقع مدينة الخرطوم على بعد ٣٤٨٥ كيلومتراً من منابع نهر كاجيرا حسب تقدير ولسكوكس وكريج ، وعلى بعد نحو ٣٠٨٢ كيلومتراً من البحر المتوسط . فكان الخرطوم والحالة هذه فى منتصف المسافة تقريباً ما بين أقصى منابع النيل وبين المصب وهى أقرب إلى المصب بنحو ٤٠٣ كيلومترات . وهذه مسافة كبيرة فى ذاتها لولا أنها قليلة بالنسبة لنهر طوله — حسب هذا التقدير ٦٥٦٧ كيلومتراً من منبع كاجيرا إلى مصب دمياط . ولقد نتساءل هنا : ألم يأن لهذا النهر بعد أن جرى ٣٤٨٥

كيلومتراً أن يكون مسيله في سهل رسوبى يلقي فيه ما يحمله من الرمل والطين ؟ الحقيقة أن النهر من قبل بلوغه الخرطوم قد دخل في أكثر من سهل رسوبى وخرج منه ثانية ، وليذكر القارى ما سبق ذكره من أننا لسنا هنا بصدد نهر كسائر الأنهار ، فعند الخرطوم يتحد النيلان الأبيض والأزرق ، وقد أصبح الأول ضعيف الجريان قليل الرواسب ، بحيث لا يتصور أنه إذا ترك وحده استطاع أن يحفر له مجرى يسيل فيه إلى البحر . فيأتى النيل الأزرق الغزير المياه الكثير الرواسب المندفعة التيار فيعيد إلى النهر قوته وعنفوانه . والنيل فيما بعد الخرطوم من صنع هذا النهر ، لا من صنع النيل الأبيض ولا يمكن أن يتصور نهر النيل كما نعرفه من غير ما يمد به النيل الأزرق .

على أن النيل شمال الخرطوم مباشرة لا يجرى في سهل رسوبى ، فإن سهول النيل الخصبة لا تبدأ إلا فيما وراء أسوان وبين هذه وبين الخرطوم يجرى النهر أكثر من ١٨٨٥ كيلومتراً . وبين الخرطوم وأسوان يجرى النيل في مجرى صفاته تخالف ما قد يحق لنا أن نتظره . نحن نعلم أن النهر صالح للملاحة من عند كرو إلى الخرطوم والنيل الأزرق كذلك صالح للملاحة من الرصيرص إلى الخرطوم . وفي كل تلك المسافات الطويلة لا يعترض جريان النهر جنادل أو شلالات . فمن المستغرب أن يكون النيل في بلاد النوبة ، ما بين الخرطوم وأسوان ، كثير الجنادل والخواق وغير صالح للملاحة ، كأن القوى التى عبدت مجرى النهر جنوب الخرطوم لم تستطع بعد — أو لم تعط الزمن الكافى — أن تزيل العقبات التى تعترض النهر شمال تلك المدينة . وعدا هذا فإن النهر هنا يرسم في جريانه ما بين خطى عرض ١٦ و ٢٢ انحناءين كبيرين يحاكى مجموعها الحرف الأفرنجى S ، ووجه الغرابة في مثل هذه الالتواءات أن النهر يجرى في اتجاهات متضادة مرة بعد مرة ولا يثبت على اتجاه واحد . ففما بين سبلوكة والعطبرة يتجه في جريانه نحو الشمال الشرقى ، ثم ما بين أبى حمد وأمبيكل Ambikol يتجه نحو الجنوب الغربى ، ويعود بعد اختراقه

درجة ٢١° من درجات العرض فيتجه نحو الشمال الشرقى مرة أخرى . أى أن النهر يعكس اتجاهه تماماً أكثر من مرة فيما بين الخرطوم وأسوان .

كل هذه الأشياء قد أثارت عدة مسائل سنتعرض لبحثها في الفصل الآتى ، ولنكتف هنا بوصف النهر والأقطار التى تحف به .

النيل فيما بين الخرطوم وأسوان أكثر انحداراً منه فى جنوب الخرطوم ، ومتوسط انحداره فيما بين البلدين نحو ١ : ٦٨٠٠ ، ولكن هذا الانحدار ليس واحداً فى كل مجرى النهر بل يزيد فى أقاليم الجنادل والخوانق .

يتحد النيل الأبيض والأزرق فيجريان شمال الخرطوم فى مسيل متسع قليل الانحدار فى أوله ، ما بين سهول فسيحة صخورها من الخرسان النوبى المتكون فوق طبقات من الصخور البلورية القديمة الشديدة الصلابة . والنهر فى هذه المنطقة كثير النحت والحفر قليل الإرساب ، حيث استطاع أن يزيل طبقات الخرسان النوبى وهى قليلة الصلابة ، تعترض مسيره الصخور البلورية الصلبة ، وليس تحتها وإزالتها بالشىء السهل . فحيث تبدو هذه الصخور يكون مجرى النهر كثير الجنادل والمندفعات التى تسمى هنا بالشلالات (Cataracts) ، والتى تدعى بالشلال السادس فالخامس فالرابع فالثالث إلى آخره بترتيب يبدأ من الجنوب إلى الشمال ، أى أن آخرها فى العدد وهو السادس يعترض سير النهر أولاً . ولا سبب لهذا سوى أن الذين سموها بتلك الأعداد جاءوا من الشمال فكانوا يعدونها ابتداء من الجهة التى جاءوا منها . وقد ألفنا أن نسمى شلال أسوان الأول حتى لم نعد نشعر بغرابة تلك التسمية . وإنما تبدو غرابتها إذا ذكرنا أن الشلال الأول هو فى الواقع آخر شلال يعترض سير النهر .

هذا وفى تسميتها لهذه المندفعات بالشلالات شىء من التجاوز . وكذلك فى تسميتها الانكليزية Cataract . إذ ليس هناك مساقط للماء فى موضع ما . وإنما هى كما

سنرى مواضع من النهر يشتد فيها انحدار مجراه وتعترضه في بعضها صخور وجنادل .
فليكن لفظ شلال هنا دالا على مجرد عقبة في مجرى النهر بوجه عام .


وأول هذه المسالك الصعبة التي تعترض مجرى النهر ، تلك المساحة التي يطلق عليها أحيانا اسم الشلال السادس ، وتارة اسم خانق سبلوقة ، ولو أن الخانق ما هو إلا جزء منها كما سنرى .

تبدأ هذه المنطقة الصعبة على بعد ٦٠ كيلومتراً من الخرطوم عند بلدة وادرملى ؛
وتنتهى بعد مسافة ٦٠ كيلومتراً أخرى ، عند موضع يدعى قوز الحبشى . وهذه
المسافة ليست كلها على حال واحدة . ومن الممكن أن تقسم إلى ثلاثة أقسام في
الجنوب والوسط والشمال .

١ : فالقسم الجنوبي (أو الأعلى) يمتد إلى نحو ٢١ كيلومتراً شمال وادرملى ،
وفيه يتدفق ماء النهر بانحدار شديد بنسبة ١ : ٧٠٠٠ ؛ والملاحة شاقة ضد التيار
وعلى الأخص في زمن الفيضان . والأراضي التي تحيط بالنهر سهلة بوجه عام ، وإن
لم تخل من بعض اليلال الصخرية ؛ وهذه تكون عادة بعيدة عن النهر . وينتهى
هذا الجزء من النهر عند جزيرة الريان ، وفي وسطها « جبل » الريان ، وهو
عبارة عن كتلة ناتئة صخورها من الجرانيت ، وهو يلاصق الجانب الشرقى
من النهر .

ب : أما الجزء الثانى (الأوسط) من الشلال السادس ؛ فيبتدىء شمال
جزيرة الريان ، وهو عبارة عن خانق طوله ١٢ كيلومتراً ؛ وهو الجزء الوحيد الذى
يسمح أن يدعى خانقاً .

ج : أما الجزء الشمالى (أو الأسفل) فيبلغ طوله ٢٧ كيلومتراً ، فيه تكثر
الجزر الصخرية ، وتحتل من مجرى النهر مكاناً كبيراً ، وهو يمتاز بالانحدار الشديد
(بنسبة ١ : ٥٠٠٠) وفي هذا الجزء تقعذر الملاحة حقاً . ولا تحيط بالنهر هنا تلال
أو كتل صخرية ، بل يمتد وسط أرض سهلة .



(شكل ١٥ و ١٦) خريطة وقطاع طولى لخائف سبلوق

وواضح مما تقدم أن الجزء الأوسط هو الذى يصح أن يدعى خانق سبلوقة ؛ وهو يمثل ظاهرة فريدة فى مجرى نهر النيل كله .

فالنهر هنا ضيق الجرى لا يزيد اتساعه على ٣٥٠ متراً ، وفى مواضع كثيرة يضيق بحيث لا يتجاوز ١٦٠ متراً . وهو خال من الجزر ، تحيط به عن اليمين والشمال مرتفعات من الصخور البلورية ، تعلو على مستوى النهر بنحو ١٢٠ متراً ، وتمتد إلى مسافة ثمانى كيلومترات غرباً وشرقاً . هذه الصخور الشديدة الصلابة يخترقها النهر اختراقاً بدلا من أن يدور حولها ، وهو الأمر الذى يبدو غريباً لأول وهلة .

ومن أهم ما يمتاز به النهر فى هذا الموضع قلة الانحدار ، فبالرغم من ضيق الجرى لا تبلغ نسبة الانحدار هنا أكثر من ١ : ٢٧٠٠٠ ؛ وهو انحدار أشبه بما يحدث فى منطقة السدود فى بحر الجبل . وهذا الانحدار الضعيف يوحى بأن للنهر عمقاً عظيماً ، حتى يستطيع أن يحمل ما يحمله من الماء . وذلك ما نجده فعلاً ، فإن النهر هنا يبلغ أعماقاً لا نظير لها فى أى موضع آخر ؛ فيبلغ ٣٢ و ٣٣ متراً . (شكل ١٦) وإذا تأملنا خريطة الخانق فى شكل (١٥) وجدناه يمتد فى استقامة ملحوظة ، وجوانبه الصخرية متوازية ، والمرتفعات البلورية متشابهة البنية والتضاريس ؛ وبعد أن يمتد الخانق من الغرب نحو الشرق ، يغير اتجاهه بواسطة كوع واضح ، ويتحول نحو الشمال .

وعلى الرغم من أن هذه الحال توحى بأن النهر هنا يسلك مجرى ، كان العامل الأول فى تكوينه انكسارات وعيوب فى هذه المساحة الصخرية ، فإن معظم الكتاب يرى أن وادى النهر نتيجة التعرية المائية ، لا نتيجة الانكسار . وقد زعم المستر هيوم^(١) أنه من بحمته لهذا الإقليم على وجه السرعة ، لم تظهر له عيوب فى

الصخور ، أو انكسارات حتى يمكن الاستعانة بها على تأويل جريان النهر وسط هذا المرتفع الصخري ؛ ويظن أن النهر كان يجري في مجراه هذا من قبل أن تنحط الأراضي المجاورة إلى مستواها الحالى ، ولعلها كانت حينئذ أعلى من المرتفعات التى يخترقها النيل .

أما جون بول^(١) فيرى أن الخائق يرجع إلى التعرية المائية ، ولكنه يصل هذه الظاهرة بظروف تكوين بحيرة السد ، وتسرب مائها إلى الشمال ، وسنعود إلى إيضاح هذا رأى فيما بعد عند الكلام على تطور النيل .


من بعد سبلوقه يتسع مجرى النهر ويعتدل انحداره وتبقى هذه حاله إلى ما بعد عبيدية Abidia شمالى بربر . وفي هذه المنطقة يتصل به نهر العظيرة على بعد ٣٢٧ كيلومتراً من الخرطوم ومن بعد عبيدية يبضع كيلومترات يبدأ الشلال الخامس ، ومعنى هذا أن مجرى النهر ، إلى مسافة ١٠٠ كيلومتر ، شديد الانحدار وتعرضه بعض الجنادل من موضع إلى آخر ، ودرجة انحدار النهر في هذه المنطقة $\frac{1}{4400}$ ^(٢) .

وفي نهايتها تعرض مجرى النهر جزيرة مجرات وطولها نحو ٣٠ كيلومتراً وهى تواجه بلدة أبى حمد . وعندها يغير النهر اتجاهه فيتجهول نحو الجنوب الغربى . ومن جزيرة مجرات إلى جزيرة شرى Shirri يسيل النهر في مجرى خال من العقبات . ومن بعد هذه الجزيرة يبدأ الشلال الرابع ، وهو عبارة عن جزء من مجرى النهر طوله نحو ١١٠ كيلومترات تكثفه مندفعات وجزر صغيرة وجنادل . والنهر هنا أيضاً شديد الانحدار ، ونسبة الانحدار تبلغ ١ : ٣٢٠٠ .

والإقليم الواقع بين أول الشلال الخامس وآخر الرابع قليل الزراعة وال عمران حتى فى الأجزاء الخالية من الجنادل . ثم تتبدل الحال قبيل مرسى . فالنهر هنا يجري بانحدار ضعيف ($\frac{1}{13000}$) ، يشبه انحدار النيل فى مصر ؛ والأراضى المنزرعة

(١) راجع كتاب Contributions to the Geography of Egypt ص ٨١

(٢) راجع كتاب ولكس وكريغ ص ٣٨٦ وما بعدها .



(شكل ١٧) جزيرة مجرات

عن جانبيه كثيرة ، وهذا الإقليم ، ما بين مروى وأبو فاطمة ، هو أحرر بقعة في وادي النيل ما بين الخرطوم وأسوان ، وفي نهايته جزيرة أرجو ما بين دنقلة وكرمه وهي جزيرة خصبة . وعند أبي فاطمة وهي النقطة التي تفصل مركز دنقلة عن وادي حلفا تعترض مجرى النهر الصخور البلورية الصلبة مرة أخرى ، وهنا يبدأ ما يسمى بالشلال الثالث . ونهايته ليست بعيدة عن وادي حلفا ، أي أنه متصل تقريباً بالشلال الثاني .

وطول الشلال الثالث والحالة هذه لا يقل ٣٨٠ كيلومتراً ، يعترض مجرى النهر في أثنائها ما لا يقل عن ١٣ مجموعة من الجنادل والعقبات ، وقد يطلق اسم الشلال الثالث في الخرائط على أول هذه الجنادل الواقعة قرب جزيرة أردوان . وهي دون درجة ٢٠° من درجات العرض بقليل .

فن بعد أبو فاطمة مباشرة يعترض سير النهر ثلاث مجموعات من الجنادل وهي حنك Hanneck وسيمت Simit وشعبان Shaban ، ويرجع تكوين هذه جميعاً إلى وجود صخور من الفايس والجرانيت تعترض النهر ، وجر يانه هنا سريع وانحداره شديد جداً .

وبعد هذه الجنادل بنحو ٦٠ كيلومتراً تعترض النهر جنادل تشبهاً ويطلق عليها اسم جنادل كاجبار Kajbar . ثم من بعد هذه يكون النهر خالياً من العقبات إلى مسافة ١١٠ كيلومترات من بعدها تعترض النهر جنادل عماره Amara ثم جنادل دال الواقعة شمال درجة عرض ٢١ مباشرة ، وتتلوها جنادل عكاشة ثم تفجور Tangur وأمبيجل Ambugol وأتيري Atiri . والنهر في كل هذه المواضع شديد الانحدار فقد يبلغ انحداره في بعضها متراً في كل كيلومتر . ويعترض مجراه صخور بلورية من الفايس والشست ونحوها .

وبعد هذه بنحو عشرة كيلومترات يبلغ النهر جنادل سمنة ولعلها أشهر هذه الجنادل والخوانق والمندفعات جميعاً . لا لأنها عقبة أكبر من سواها ؛ بل لأن هناك هيكلاً قديماً يرجع تاريخ بنائه إلى الأسرة الثانية عشرة ، عليه كتابات تدل على أن النهر كان مستوياً في ذلك الوقت أعلى مما هو اليوم بنحو ٧٢ أمتار . وسنعود إلى بحث هذا الأمر في الفصل الآتي .

ويعتبر خانق سمنة نهاية الشلال الثالث ؛ وإن يكن هناك بعض اختلاف في الرأي عن مبدأ ونهاية ذلك الشلال ، ومن بعد سمنة إلى مسافة ٤٠ كيلومتراً لا تعترض جريان النهر عقبات ، حتى يبلغ سرس Sarras ومن بعدها بقليل شلالات جَمَي Gemai وعمكة ؛ وطولها معا أكثر من ١٦ كيلومتراً وينحدر النهر عندها انحداراً شديداً ، وبالقرب من عمكة تعترضه جزر عديدة تبلغ نحو ٢٠٠ جزيرة منها ٦٠ ذات حجم واضح ؛ وهذه الجنادل هي التي يطلق عليها عادة اسم شلال حلفا ، وهي كغيرها من الشلالات السابق ذكرها يرجع تكوينها إلى

اعتراض الصخور البلورية الشديدة الصلابة في مجرى النهر ، وتكون منها الجزر .
ويقول المستر . د . سكوت T.D. Scott في مقاله المنشور في كتاب
ويلكوكس وكريج^(١) إنه قد رأى أدلة واضحة تثبت أن النيل في إقليم حلفا كان
يجرى فيما مضى في مسيل مرتفع عن مجراه الحالى وإلى شرقيه ، فتكون الحال هنا
أشبه بها عند أسوان كما سنرى .

وبلدة حلفا نفسها واقعة شمال هذه الجنادل بنحو تسعة كيلو مترات . ومن
بعدها يعتدل انحدار النهر إلى درجة ١ : ١٣٠٠٠ ما بين حلفا وأسوان أى مسافة
٣٤٥ كيلومترا .

نستخلص مما تقدم أن النيل ما بين الخرطوم وحلفا يجرى بانحدار شديد ، أشد
بكثير من مجراه جنوبى الخرطوم أو شمالى حلفا . وأيا كانت العوامل التى سببت
هذه الحال ، فليس من شك فى أنها ذات أهمية كبرى فى نظام النهر وفى كيانه
وحسبنا أن نذكر أن هذا الإقليم هو من أشد ، إن لم يكن أشد ، أقاليم إفريقيا
حرارة وجفافاً . ودرجة تبخر الماء فيه عالية جداً بتوفر هذين العاملين . فلو أن
النيل فى هذا الإقليم كان يجرى فى واد سهل معبد ذى التواءات كثيرة ، وكان
فيضاه يعلو على ضفتيه فيغمرها والأفطار المجاورة لها ، لكان ما يفقد من ماء
النيل بالتبخر فى هذا الإقليم أعظم بكثير مما يفقد فى سواء . فأهمية هذه الجنادل
والخنادق والمندفعات فى هذا الجزء من النيل أهمية خطيرة إذ أن انحدار الماء واندفاعه
بهذه السرعة العظيمة قلل من مقدار ما يفقده النهر بالتبخر . هذا عدا أن النهر
عميق فى أكثر هذا الإقليم وقليل الاتساع نسبياً . فسطحه المعرض للتبخر والحالة
هذه ليس كبيراً .

وفى ما بعد حلفا يعتدل انحدار النهر كما ذكرنا ويصبح قابلاً للملاحة ومجراه

خاليا من العقبات حتى يبلغ أسوان . وهو في هذا الإقليم يسيل وسط سهول قليلة الارتفاع صخورها من الخرسان النوبي . ولا يبدو في مجرى النهر صخور بلورية ولا على ضفتيه اللهم إلا بالقرب من شمال بلدة كلبشة . فهنا يضيق مجرى النهر بحيث تبلغ سعته نحو ٢٠٠ متر وتبدو على جانبيه صخور بلورية وفي هذا ما يبعث على الظن بأن هذه البقعة كانت موضعا للجنادل فيما مضى . وقد أزالها جريان النهر . ويدعى هذا الجزء من مجرى النيل باب الكلبشة .

وعلى ضفتي النهر ما بين حلفا وأسوان حواجز جانبية تمتد قليلا إلى النهر عمودية على جانبيه بحيث تعترض جريان النهر بالقرب من ضفتيه ، وهذه الحواجز قديمة العهد جداً ويزعم ويلسكوكس وكريج أن بناءها يرجع في الغالب إلى عهد رمسيس الثانى . ويظن أن من جملة فوائدها أنها تحجز مقداراً من الطين الذى يحمله النهر فيتراكم منه ما بينها مقادير كبيرة ، ومتى انحسرت مياه الفيضان عنها أمكن زرعها واستغلالها . هذا عدا أن فى بناء تلك الحواجز صيانة لجوانب النهر من أن تؤثر فيها مياه الفيضان تأثيراً بليغاً . ولعل زرع هذه الأراضى كان مساعداً على الحياة فى هذه الأصقاع ، التى لا بد أنها كانت أكثر عمراناً فى زمن المصريين القدماء ، لكثرة ما بنوا فيها من الهياكل والتماثيل الجميلة التى يمتاز بعضها بالضخامة والفخامة .

ويقول ويلسكوكس وكريج إن وضعية تلك الحواجز الصخرية على قاع النهر تدل على أنه لم يتأثر بالتعرية كثيراً فى الثلاثة الآلاف عام التى مضت منذ تاريخ بنائها . وضعف انحدار النهر فيما بين حلفا وأسوان قلل من قدرته على التعرية برغم كثرة ما يحمل من الرواسب . والحقيقة أن النهر قد أخذ يدنو من المنطقة السهلية التى يقل فيها النحت ثم ينفذ ويكثر الإرساب^(١) .

هذا ومن بعد حلفا بنحو ٣٤٥ كيلومترا يجتاز النيل شلاله الأول والأخير .


(١) راجع كتاب ولسكوكس وكريج ص ٢٨٧ وما بعدها .

ويختلف شلال أسوان عن الجنادل التي ذكرت من قبل بأنه لا يرجع تكوينه إلى اعتراض صخور بلورية وبركانية — ولو أن هذه الصخور موجودة أيضاً بأسوان — بل سبب تكوينه وجود انكسارات في الصخور اتجاهها العام من الجنوب إلى الشمال ، وقد تكونت أودية أخدودية ضيقة هي التي ينحدر فيها النهر . وفيما بينها جزر نائية تقسم مجرى النهر إلى قسمين أو أكثر . وهذه الجزر تعترض مسيل النهر في مسافة طولها نحو ١٢ كيلومترا . وأشهر هذه الجزر الهيسه وبيجا وعواض وفيلى التي عليها قصر أنس الوجود . وفي شمال السد جزيرة سهيل وسلوجه والسكوم Elephantine وجزيرة السردار . وهذه الجزر تتركب صخورها من الجرانيت الدقيق والغليظ وفي بعضها طبقات ميكا وهورنبلند . ثم الصخر الناري المعروف بالأسوانى Syenite ؛ وهذه الصخور ليست مقصورة على الجزر بل توجد كذلك على جانبي النهر . وبعض الجزر الشماليه تكسوه الرواسب النيلية حتى أمكن أن تزرع وتتخذ منها تلك الحقائق المشهورة .

وانحدار النهر هنا شديد جداً ومجراه ضيق في طول الشلال ولا تقل درجة الانحدار وقت الفيضان عن ١ : ١٠٠٠ .

وإلى شرق النيل في هذا الإقليم واد فسيح تجري فيه السكة الحديدية وترتبه من الرواسب النهرية القديمة مما يدل على أن النهر كان يعم فيضانه هذا الوادى — إن لم يكن هو المجرى الوحيد للنهر فيما مضى ، ثم تحول المجرى إلى حيث هو الآن كما هو الأرجح . ومستوى هذا الوادى أعلى من مستوى قاع النهر الحالى . وهذه الظاهرة شبيهة بمثلتها عند شلال حلغا كما رأينا من قبل . وسنعود إلى بحث هذا الموضوع في الفصل الآتى إن شاء الله .

ومن بعد أسوان يجرى النيل زهاء ١٢٠٠ كيلومتر حتى يبلغ البحر ، دون أن يعترض مجراه جنادل أو خوانق أو أى عوائق أخرى اللهم إلا الجزر التي



(شكل ١٨) عن بول وكرنكل

تكونت من تراكم الرواسب التي جاء بها النهر نفسه .

لنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم * * * * * تاليفه في تاريخه الشريف

فيما بين الخرطوم وأسوان لا ينصب في النيل في وقتنا هذا نهر أو رافد ذو شأن سوى العطبرة . ومع هذا فهناك أودية جافة متصلة بوادي النيل عن ضفتيه اليمنى واليسرى . لكنها وإن كانت في الماضي تمد النيل بكثير من الماء ، فإنها الآن قلما تجري فيها مياه ، اللهم إلا أن تمتلئ بالسيل في الفصل الماطر من عام إلى آخر ، فتعد النهر ببعض ماؤها وإن ضاع أكثره في البيداء . والأقاليم التي تمتد هذه الأودية بالمياه محدودة ؛ وأكثرها واقع في الجزء الأعلى منها . وبعض هذه الأودية الجافة تنحدر إلى النيل من مسافات بعيدة . فوادي مقدم مثلا ينحدر من أواسط كردوفان . ووادي الملك ينحدر من قرب دارفور أو من الإقليم الذي يصل دارفور وكردوفان . وكلها ينتهي إلى وادي النيل فيما بين مروى وخندق وهنالك غيرها أودية عديدة واقعة على ضفة النهر اليسرى . أما على الجانب الأيمن فأشهر هذه الأودية من غير شك هو وادي العلاقي Alaqi و « رافده » المسمى قبقة . وهو ينتهي إلى وادي النيل شمال كرسكو

ولهذه الأودية أهمية خاصة وهى أنها ترينا بوضوح اتساع حوض النيل فى هذه المنطقة حتى أنه ليمتد غربا إلى هضبة دارفور ، وشرقا إلى المنحدرات الغربية لتلال البحر الأحمر . ويبقى الامتداد الشرقى لحوض النيل عظيما فى بقية مجراه حتى يبلغ البحر . أما من الجهة الغربية فإن حوض النهر يأخذ فى الانكماش عند دنقلة إذ تدنو الهضاب الغربية جدا من وادى النهر ، ويكون اتساع حوض النيل من الجهة الغربية قليلا جدا . وتبقى الحال كذلك فى مصر ، اللهم إلا فى الفيوم .

وأما من الجهة الشرقية فإن الحد الأقصى لحوض النيل هو قم الجبال والتلال الممتدة غربى البحر الأحمر ؛ فعلى الجوانب الشرقية لهذه المرتفعات تنحدر أودية تنتهى إلى البحر الأحمر ، وعلى الجوانب الغربية أودية طويلة تنتهى إلى النيل .

فالخط الذى يفصل « مياه » البحر الأحمر عن مياه النيل يمتد والحالة هذه من الجنوب إلى الشمال فى اتجاهات مختلفة فيقترب أحيانا من البحر ثم يبعد عنه حيناً . لكنه بوجه عام أقرب إلى البحر الأحمر . فالانحدار من الجبال إلى ساحل هذا البحر انحدار شديد وانحدارها إلى النيل تدريجى .

وقد يكون الحد الفاصل بين حوض البحر الأحمر والنيل أقرب إلى النيل فى غير موضع كما هى الحال عند وادى عربيه . فإن هذا الوادى يحتل منخفضاً أخدودياً عميقاً نشأ عن وجود انكسارات فى قشرة الأرض فانفصلت هضبة الجلالة الشمالية عن الجنوبية بوادٍ أخدودى هو الذى ندعوه وادى عربيه . وهو أهم موضع تنقطع فيه تلك السلسلة الجبلية الممتدة غربى البحر الأحمر : وهو واقع فى محاذة بنى سويف . والحد الفاصل بين حوض النيل وحوض البحر الأحمر واقع هنا فى منتصف المسافة بينهما أو هو أقرب إلى نهر النيل قليلاً . ويبقى قريباً إلى النيل فيما بعد هضبة الجلالة ، وخصوصاً فيما بين الصف وحلوان . فإن وجود جبل المقطم فى هذا الإقليم سبب اسكاش حوض النيل . والأودية الكثيرة الواقعة شرق حلوان لا تمتد إلى البحر الأحمر كما قد يتوهم ، بل هنالك حد فاصل بين حوض النيل وحوض البحر الأحمر . وهذا الحد أقرب إلى النيل فى تلك المنطقة . أما إلى الشمال من حلوان فيعمود حوض النيل إلى الاتساع وتتردد الحدود الشرقية جنوب وادى طوميلات إلى شمال هضبة التيه ثم إلى غربى العريش . وربما جاز لنا أن نتجاهل منخفض وادى العريش ، فتمتد حدود حوض النيل بهذا إلى المرتفعات الغربية من فلسطين وحوض الأردن .

هذا فيما يختص بحوض النيل فى مصر ، أما النهر نفسه فإنه فى شمال أسوان يبدأ فى تكوين ذلك السهل الرسوبى الخصيب ، الذى ندعوه عادة « وادى النيل » كأن ليس للنيل وادٍ سواه ، وما هذا إلا لشهرة مصر التاريخية وما لهذا الجزء من وادى النيل من نعم غزيرة على مصر وسكانها بل وعلى العالم الذى استمد



من مصر قديما و
 طاء عند كوم أمبو
 كور و يتسع مرة
 تقرب مضية ليبيا
 النيل إلى الجنوب
 فوق طبقات ملتزمة
 متجها من الشرق
 الطبقات انكسار في
 البحث الدقيق وجد
 ومن بعد شبح
 كونه رواسب التي
 من هذا فيما بين
 بين شمال القاهرة
 على البحر الأبيض
 والذي يلتفت إلى
 دائما إلى الزمام
 قبلا إلا ليمود في
 جهة النهر من الشرق
 ويتبع خاص في
 بعد أن السهل
 فلا يكاد يفصل
 ومتى هذا كله

(شكل ١٩) خريطة جيولوجية
 جزء مصر من سوانه (١) تكوينات أديك (٢) (٣) (٤) (٥) (٦) (٧) (٨) (٩) (١٠) (١١)
 (٨) ميوسين (٩) الميوسين (١٠) الميوسين (١١) الميوسين

البحر من

البحر من

البحر من

البحر من

البحر من

البحر من

البحر من

البحر من

البحر من

البحر من

البحر من

البحر من

البحر من

البحر من

البحر من

البحر من

البحر من

البحر من

البحر من

البحر من

البحر من

البحر من

البحر من

البحر من




البحر من

البحر من

البحر من

البحر من



(شكل ١٩) خريطة جيولوجية للقطر المصري

(١) تكوينات أركية (٢) عصر الفحم (٣) الجورا (٤) خرسان نوبي (٥) كريتاسي (٦) إوسين (٧) أوليجوسين (٨) ميوسين (٩) بليوسين (١٠) بليستوسين (١١) رواسب نيلية (١٢) رواسب ملحية في منخفض القطارة

من مصر قديما وسائل الحضارة والعمارات . هذا الوادى يبدأ ضيقا ثم يتسع فجأة عند كوم أمبو ، ولكنه يضيق ثانية بحيث لا يفصل النهر عن الصحراء فاصل كبير . ويتسع مرة أخرى عند أدفو ، ولا يزال يتسع تدريجيا حتى بلدة قنا . وعندها تقترب هضبة ليبيا من وادى النيل ، ويغير النهر اتجاهه فينحدر إلى الغرب مع ميل قليل إلى الجنوب . وقد علل هيوم هذا الاتجاه بأن وادى النيل غربى قنا واقع فوق طبقات ملتوية إلى أسفل (Syncline) بحيث تكون هنا واديا « التوائيا » متجهًا من الشرق إلى الغرب . وبعض الجيولوجيين يميل إلى القول بأن فى الطبقات انكسارا فى الاتجاه نفسه ، ولعل هذا التعليل أقرب إلى الرجحان لو أثبت البحث الدقيق وجود عيوب فى هذه المنطقة .

ومن بعد نجح حمادى يتسع وادى النيل وتتسع مساحة السهل الخصيب الذى كونه رواسب النهر . ومتوسط اتساعه نحو خمسة عشر كيلومترا . ويقل اتساعه عن هذا فيما بين الصف وحلوان حيث تتراوح سعته بين ستة وعشرة كيلومترات . وفى شمال القاهرة يتسع السهل الرسوبى فيكون فى إقليم الدلتا مثلثا قاعدته مركزة على البحر الأبيض ورأسه جنوب القاهرة .

والذى يلفت النظر فى جريان النيل ما بين أسوان والقاهرة أن النهر يميل دائما إلى التزام الجانب الأيمن من الوادى ، فهو لا يتحول إلى الناحية اليسرى قليلا إلا ليعود فيلتزم الناحية اليمنى . وهذه الظاهرة ليست واضحة فى إقليم قنا حيث يتجه النهر من الشرق إلى الغرب . ولكنها واضحة تماما من بعد نجح حمادى ، وبنوع خاص فيما بين منفوط إلى شمال القاهرة . فعند المنيا وبنى سويف مثلا نجد أن السهل الرسوبى كله واقع على الجانب الأيسر وأما عن الجانب الأيمن فلا يكاد يفصل النهر عن الصحراء فاصل . (شكل ٢٠)

ومعنى هذا كله أن النهر يلتقى برواسبه على الجانب الأيسر ، ودائب فى نحت جزء يسير من جانبه الأيمن بحيث يكون السهل الفيضى عن اليسار ، وعن اليمين

فالخط الذى يفصل « مياه » البحر الأحمر عن مياه النيل يمتد والحالة هذه من الجنوب إلى الشمال فى اتجاهات مختلفة فيقترب أحيانا من البحر ثم يبعد عنه حيناً . لكنه بوجه عام أقرب إلى البحر الأحمر . فالأنحدار من الجبال إلى ساحل هذا البحر انحدار شديد وانحدارها إلى النيل تدريجى .

وقد يكون الحد الفاصل بين حوض البحر الأحمر والنيل أقرب إلى النيل فى غير موضع كما هى الحال عند وادى عربيه . فإن هذا الوادى يحتل منخفضاً أخدودياً عميقاً نشأ عن وجود انكسارات فى قشرة الأرض فانفصلت هضبة الجلالة الشمالية عن الجنوبية بواد أخدودى هو الذى ندعوه وادى عربيه . وهو أهم موضع تنقطع فيه تلك السلسلة الجبلية الممتدة غربى البحر الأحمر : وهو واقع فى محاذة بنى سويف . والحد الفاصل بين حوض النيل وحوض البحر الأحمر واقع هنا فى منتصف المسافة بينهما أو هو أقرب إلى نهر النيل قليلاً . ويبقى قريباً إلى النيل فيما بعد هضبة الجلالة ، وخصوصاً فيما بين الصف وحلوان . فإن وجود جبل المقطم فى هذا الإقليم سبب انكماش حوض النيل . والأودية الكثيرة الواقعة شرق حلوان لا تمتد إلى البحر الأحمر كما قد يتوهم ، بل هنالك حد فاصل بين حوض النيل وحوض البحر الأحمر . وهذا الحد أقرب إلى النيل فى تلك المنطقة . أما إلى الشمال من حلوان فيعود حوض النيل إلى الاتساع وتمر حدوده الشرقية جنوب وادى طوميلات إلى شمال هضبة التيه ثم إلى غربى العريش . وربما جاز لنا أن نتجاهل منخفض وادى العريش ، فتمتد حدود حوض النيل بهذا إلى المرتفعات الغربية من فلسطين وحوض الأردن .


هذا فيما يختص بحوض النيل فى مصر ، أما النهر نفسه فإنه فى شمال أسوان يبدأ فى تكوين ذلك السهل الرسوبى الخصب ، الذى ندعوه عادة « وادى النيل » كأن ليس للنيل واد سواه ، وما هذا إلا لشهرة مصر التاريخية وما لهذا الجزء من وادى النيل من نعم غزيرة على مصر وسكانها بل وعلى العالم الذى استمد

من مصر قديما وسائل الحضارة والعمارات . هذا الوادى يبدأ ضيقا ثم يتسع فجأة عند كوم أمبو ، ولكنه يضيق ثانية بحيث لا يفصل النهر عن الصحراء فاصل كبير . ويتسع مرة أخرى عند أدفو ، ولا يزال يتسع تدريجيا حتى بلدة قنا . وعندها تقترب هضبة ليبيا من وادى النيل ، ويغير النهر اتجاهه فينحدر إلى الغرب مع ميل قليل إلى الجنوب . وقد علل هيوم هذا الاتجاه بأن وادى النيل غربى قنا واقع فوق طبقات ملتوية إلى أسفل (Syncline) بحيث تكون هنا واديا « التوائيا » متجهًا من الشرق إلى الغرب . وبعض الجيولوجيين يميل إلى القول بأن فى الطبقات انكسارا فى الاتجاه نفسه ، ولعل هذا التعليل أقرب إلى الرجحان لو أثبت البحث الدقيق وجود عيوب فى هذه المنطقة .

ومن بعد نجح حمادى يتسع وادى النيل وتتسع مساحة السهل الخصيب الذى كونه رواسب النهر . ومتوسط اتساعه نحو خمسة عشر كيلومترا . ويقل اتساعه عن هذا فيما بين الصف وحلوان حيث تتراوح سعيه بين سبعة وعشرة كيلومترات . وفى شمال القاهرة يتسع السهل الرسوبى فيكون فى إقليم الدلتا مثلثا قاعدته مرتكزة على البحر الأبيض ورأسه جنوب القاهرة .

والذى يلفت النظر فى جريان النيل ما بين أسوان والقاهرة أن النهر يميل دائما إلى التزام الجانب الأيمن من الوادى ، فهو لا يتحول إلى الناحية اليسرى قليلا إلا ليعود فيلتزم الناحية اليمنى . وهذه الظاهرة ليست واضحة فى إقليم قنا حيث يتجه النهر من الشرق إلى الغرب . ولكنها واضحة تماما من بعد نجح حمادى ، وبنوع خاص فيما بين منفلوط إلى شمال القاهرة . فعند المنيا وبنى سويف مثلا نجد أن السهل الرسوبى كله واقع على الجانب الأيسر وأما عن الجانب الأيمن فلا يكاد يفصل النهر عن الصحراء فاصل . (شكل ٢٠)

ومعنى هذا كله أن النهر يلتقى برواسبه على الجانب الأيسر ، ودائب فى نحت جزء يسير من جانبه الأيمن بحيث يكون السهل الفيضى عن اليسار ، وعن اليمين



(شكل ٢٠) خريطة تبين كيف يلزم نهر النيل حافة الهضبة الشرقية وكيف نما السهل الرسوبي إلى الجانب الأيسر للنهر

ضفة مرتفعة (Cliff) من ورائها هضبة صحراوية . فلا بد أن تكون هنالك قوة ما تدفع بالنهر إلى اليمين . وليست هذه الظاهرة قاصرة على النيل . فإن بعض الجغرافيين (de Lapparent, Newbigin) وغيرهما حاول أن يضع قاعدة بأن كل نهر يجري من الجنوب إلى الشمال يلتزم عادة الجانب الأيمن ويلقى رواسبه على الجانب الأيسر . وقد مثلوا لذلك بأنهار في منطقة جبال البرانس ، وبمثال آخر أوضح وهو أنهار سيبيريا . وفي كلتا الحالتين نرى الظاهرة المذكورة ممثلة في جريان تلك الأنهار .

وقد عللوا ذلك في حالة أنهار جبال البرانس المنحدرة شمالا إلى نهر الجارون بأنها تميل إلى الجانب الأيمن (الشرق) بتأثير الرياح الغربية التي تسود في غرب أوروبا . وحيث لم يكن هذا التعليل كافيا في حالة أنهار سيبيريا ، فقد لجأوا إلى تعليل آخر وهو تأثير دورة الأرض حول نفسها التي تجعل الرياح تنحرف إلى اليمين في نصف الكرة الشمالى وإلى اليسار في النصف الجنوبى بمقتضى قانون فِرل .

والشكل المرسوم هنا نقلا عن نيوجن يمثل تطبيق تلك النظرية فإن مياه النهر في جريانها تحدث دوامات (eddies) دورتها ضد دورة الساعة (كما هي الحال في الأعاصير في نصف الكرة الشمالى) فيلاحظ أن حركة هذه الدوامات إذا كانت في الجانب الأيمن كانت مطابقة لمسير تيار النهر وبذلك تزيد في قوة هذا التيار وتعاونته في النحت والحفر . وأما عن الجانب الأيسر فإن حركة هذه الدوامات مضادة لمسير تيار النهر مضعفة له ^(١) مقللة من سرعته ، ويتبع قلة السرعة كثرة الأرساب كما هو معلوم . فيكون النهر والحالة هذه ميلا إلى النحت عن اليمين والإرساب على اليسار .

وهذا التعليل مقبول ، وكل ما يمكن أن يقال في نقده هو أن قانون فرل ينطبق على جميع الأشياء المتحركة فوق سطح الأرض سواء أكان اتجاهها من الشمال

(١) كتاب الجغرافيا الطبيعية ص ٩١ ودروس الجغرافيا الطبيعية لدى لا باران .

إلى الجنوب أو من الشرق إلى الغرب أو غير هذين . فلا ندرى لماذا لم تبين هذه الظاهرة بوضوح إلا في الأنهار التي تجري من الجنوب إلى الشمال بهذا التحديد . وقد رأينا أن النيل في منحناه القنأى لا يلتزم الجانب الأيمن . وعلى كل حال فالنظرية على علاقتها مقبولة ، ولكن قد لا تكون كافية في تفسير هذه الظاهرة . وقد يحسن أن نذكر أن الرياح التي تهب على وادى النيل ، في مصر ، أكثرها من الشمال والشمال الغربى وفى الإقليم الذى نحن بصددته تغلب الشمالية الغربية فى أسبوط ، ولكن تغلب الشمالية فى المنيا وفى بنى سويف ، وكذلك فى الفيوم .



(شكل ٢١)


ولو كانت الرياح التي تهب على ذلك الإقليم كلها تأتي من الشمال الغربى لسهل علينا أن نقول إنها تدفع بمياه النيل إلى الضفة الشرقية قليلا . ولعلها تفعل هذا في شمال أسبوط . وفى الغالب أن لها هذا التأثير أيضا فى إقليم بنى سويف وجزء عظيم من المنيا لأن اتجاه مجرى النهر نفسه ليس إلى الشمال تماما بل يميل إلى الشرق . فقد لا يبعد أن يكون للرياح الشمالية هنا من التأثير ما للشمالية الغربية فى شمالى أسبوط . وفى كلتا الحالتين تندفع المياه قليلا إلى اليمين بتأثير الرياح . أما فيما بين قنا ونجع حمادى فإن الرياح الشمالية تدفع المياه نحو الجنوب أى إلى الضفة اليسرى — بعكس قانون فول — وذلك لأن النهر يجرى من الشرق إلى الغرب . ومع هذا فإننا لا بد لنا أن نلاحظ أن النيل لا تبدو فيه تلك الظاهرة دائما . والشذوذ ظاهر بنوع خاص فى الدلتا ، فالنصف الجنوبى من فرع رشيد تحف

به الصحراء عن اليسار وسهل المنوفية عن اليمين . والحال ليست هكذا في فرع دمياط فإن السهول الرسوبية ممتدة على اليمين إلى مسافات بعيدة . والخروج هنا على تلك الظاهرة لا يرجع إلى خطأ القوانين التي ذكرناها ، بل يرجع إلى تاريخ تطور الدلتا نفسها أو إلى أن هذه السهول الفسيحة تكونت في خليج عظيم انتشرت فيه الرواسب انتشاراً . ثم إن من الثابت لدى الجغرافيين أن النصف الشرقى للدلتا كانت فيه أفرع أخرى للنيل ، ثم ارتفع هذا الجزء من أرض مصر . وانخفض النصف الغربى للدلتا ، وبات فرع رشيد هو أهم فروع النيل . فإذا كان النصف الشرقى للدلتا قد ارتفع والغربى قد انخفض فهذا أدعى لأن يكون فرع رشيد أقرب إلى سهول ليبيا .

انحدار النيل في مجراه من أسوان إلى البحر في غاية الاعتدال ويتراوح بين ١ : ١٠.٠٠٠ و ١٤.٠٠٠ ولعل الإنسان الذى سكن وادى النيل لو شاء أن يتمنى حالة خاصة لانحدار النيل في مصر لما تمنى خيراً من هذه الحال . فلا النهر سريع الانحدار جداً كما هو في هضبة الحبشة أو إقليم الشلالات . ولا هو بطيء جداً كالنيل الأبيض أو بحر الجبل في منطقة السدود . الحالة الأولى بالطبع بعيدة القصور لأن النهر هنا في نهاية جريانه والحالة الثانية مستحيلة لأن طبقات الأرض التى يجرى فوقها نيل مصر هى بحكم تكوينها الجيولوجى مائلة ميلاً معتدلاً من الجنوب إلى الشمال ، وقد تبعها النهر في جريانه . فلو أن الانحدار كان شديداً لكان عائقاً للملاحة في النهر مانعاً لاتصال سكان الوادى ولنشأة الحضارة المبنية على هذا الاتصال ، ولو أن الانحدار كان بطيئاً جداً لأدى إلى تكوين المستنقعات ولكان فيضان النهر خطراً جداً . ومتوسط مستوى النهر في شمال أسوان يبلغ نحو ٨٣ متراً وفي القاهرة ١٢ متراً فوق سطح البحر .

وجريان النهر في هذا السهل الخصيب الذى نسميه وادى النيل هو كجريان

سائر الأنهار في السهول الرسوبية التي كونتها . فالنهر كثير الالتواء والانحناء وهذا واضح بنوع خاص في الدلتا . وتعترض مجرى النهر جزر كثيرة كما هي الحال في إقليم القاهرة وإلى شمالها . وقد لا يكون من الصعب أن نجد بحيرة أو بحيرات متقطعة لو أننا بحثنا وادي النيل بحثاً أدق مما عمل . ومن دراسة خريطة إقليم بنها



(شكل ٢٧) هنا تكثر الالتواءات والجزر في مجرى النيل . وهناك بقايا بحيرات متقطعة ، وكذلك بقية بحر الفرعونية الذي كان يجري من فرع دمياط إلى فرع رشيد وقد سدت أطرافه في عصر محمد علي

مثلاً (مقياس ١ : ١٠٠٠٠٠) يبدو لنا أن هنالك بحيرة منقطعة كانت من غير شك من قبل مقصلة بالنيل . وإلى غرب تلك البحيرة قرية لم تزل تسمى إلى الآن جزيرة الأعجم . وهي ليست بعد جزيرة (شكل ٢٢) وقد يكون مثل هذه البحيرة كثيراً في الدلتا لولا أنه قد جف فلا تظهره إلا الخرائط الدقيقة ذات المقياس الكبير المبين بها خطوط الارتفاع بوضوح .

وقد ساعدت كثرة الرواسب وقلة المد والجزر في البحر الأبيض المتوسط على سرعة تكوين الدلتا فبرغم أن النيل في صورته الحالية لا يعد نهراً قديماً من الوجهة [×] الجيولوجية فإن دلتاه ناشئة والمستنقعات والبرك فيها قليلة لوقورت إلى غيرها من الدالات . ومهولها ليست مرتفعة كثيراً عن سطح البحر بل تنحدر تدريجاً من ارتفاع ١٨ متراً عند القاهرة إلى ساحل البحر . ولم تزل هناك بحيرات ذات مساحة كبيرة — وإن تكن قليلة العمق — في الجزء الأدنى من الدلتا ، وتشغل مساحة تبلغ ٦٤١٠٠٠ فدان ^(١)؛ ولقد كان بعضها في الأرجح أعظم اتساعاً فيما مضى مما هو اليوم . ولقد توجد في أطراف الدلتا الشمالية مساحات كبيرة منخفضة قليلاً عن سطح البحر لا يمنع طغيانه عليها سوى حاجز ساحلي من الرمل قليل الارتفاع . ومع هذا ففي فصل الشتاء عند هبوب العواصف كثيراً ما تغمر مياه البحر جزءاً عظيماً منها . وبعض هذه الأراضي كان فيما مضى أكثر ارتفاعاً وأكثر صلاحاً للسكن والمعيشة ، ثم انخفض في عصر حديث ويشهد بهذا بقايا مساكن مهجورة منتشرة في ذلك الإقليم ، وقد اتسعت مساحة البحيرات تبعاً لذلك في العصور الحديثة .

وقد اعتاد الجغرافيون أن يقسموا الدالات إلى ما هو ذو فرع واحد رئيسي وأخرى ثانوية كالجنج والنيجر أو ما له مصبان رئيسيان ومصبات أخرى أقل أهمية

(١) مساحة بحيرة المنزلة ٤٠٧٠٠٠ والبرلس ١٤٠٠٠٠ ومريوط ٥٩٠٠٠ وإدكو ٣٥٠٠٠ من الأفدنة . وقد تم ردم جزء غير قليل من مريوط وإدكو ونقصت مساحتها تبعاً لذلك .

ومنها ما له عدة مصبات متساوية الأهمية كنهـر بتشورا ومكنزى . والنيل بالطبع من النوع الثانى : وفرعاه الرئيسيان كانت تعزـزهما فيما مضى عدة مصبات ثانوية طبيعية . واليوم قد انمـحى أكثر هذه الفروع الصغيرة وحل محل بعضها قنوات ومصارف صناعية .

وفرع دميـاط أطول الفرعين . وطوله (من القناطر الخيرية إلى البحر) ٢٤٢ كيلوا مترا بينما طول فرع رشيد ٢٣٦ كيلومترا . على أن فرع رشيد أهم الفرعين من حيث اتساع المجرى ومقدار ما يحمل من الماء ؛ فمتوسط سعة فرع رشيد ٥٠٠ متر وسعة فرع دميـاط ٢٧٠ مترا ؛ ويمكن للمسافر من القاهرة إلى الاسكندرية أن يلاحظ بسهولة قصر كوبرى بنها (٢٨٥ مترا) وطول كوبرى كفر الزيات (٥٣٠ مترا) ويرى كريج وويلسكس أن فرع دميـاط آخذ مجراه فى الامتلاء بالرواسب ^(١) is gradually silting up بينما فرع رشيد يفتح مجراه قليلا .

يجرى نهر النيل من أسوان إلى البحر المتوسط فى سهول رسوبية مكونة من التربة التى تأتى بها أنهار الحبشة . فتكوينها الجيولوجى إذن حديث جدا . وأما طبقات الصخور التى يجرى وسطها النيل فإنها أقدم فى الجنوب منها فى الشمال . فالنهر فى جريانه إلى البحر يسيل بين طبقات أحدث فأحدث من الوجهة الجيولوجية وأقدم الصخور فى الجنوب — بقطع النظر عن المواضع القليلة التى فيها صخور بلورية قديمة — هو الخرسان النوبى الذى تبدأ طبقاته تحف بواى النيل ابتداء من إقليم الخرطوم على الأقل — إن لم يكن جنوبها — وهى صخور تكونت فى أواسط وأواخر العهد الطباشيرى . وكان تكوينها فى الغالب فوق سطح الأرض أو على

(١) كتاب الرى فى مصر ج ١ ص ٢٩٦ .

الشواطىء لا فى قاع البحار . إذ لم يوجد بها من الحفريات سوى بقايا قليلة^(١) ويرجح والحالة هذه أن تكون رواسب صحراوية أو ساحلية .

وبقرب إسنا تتغير التكوينات الجيولوجية التى حول وادى النيل حيث يجرى هنا بين صخور جيرية بيضاء يرجع تكوينها إلى آخر العهد الطباشيرى الكمبانى والدانى Campanian and Danian وهذه هى الصخور التى يستخرج منها الكثير من النترات والفوسفات سواء فى إقليم أسنا أو بين القصير وسفاجه . ومن بعد هذه الصخور تبدأ التكوينات الايوسينية بالقرب من أرمنت فلا تزال تحف بوادى النيل إلى القاهرة . وهذه هى أكثر الصخور انتشاراً لا فى وادى النيل بحسب بل فى سائر القطر المصرى .

وإلى شرق القاهرة تلتوى طبقات الايوسين بحيث تكون محدبا Anticline أعلاه قريب من القلعة وسفحاه عند مصر الجديدة من جهة الشمال والمعادى من جهة الجنوب . ويتكون هذا المحدب الذى ندعوه جبل المقطم من طبقتين من حجر الجير ، السفلى بيضاء والعليا مائلة إلى الاصفرار وهذه الأخيرة هشة سهلة التففت بعوامل التعرية وهى آخر ما تكون من الطبقات الايوسينية . وبينما المقطم السفلى يتكون من رواسب عميقة رسبت فى قاع البحر نجد المقطم العلوى مكونا من رواسب ساحلية .

فى المقطم كثير من العيوب والانكسارات الرأسية وليس هذا بغريب إذا ذكرنا أن هذا الإقليم كان فى عصر قريب (ميوسين ؟) عرضة لتأثيرات بركانية عنيفة . ولا يزيد ارتفاع المقطم عن ٢٤٠ مترا فى أعلى نقطة فيه ، ثم ينخفض إلى

(١) يرى هيوم أن الخرسان النوبى تكون تحت البحر الطباشيرى عند أول طفئانه على شمال أفريقية ؟ راجع كتيبه المسمى Notes on the Geol. Map of Egypt ص ٩ ولكن راجع أيضاً مقالة بارثو Barthoux فى أعمال المؤتمر الجغرافى الذى عقد بالقاهرة سنة ١٩٢٥ الجزء الثالث ص ٦٨ وما بعدها .

الجنوب عند المعادى كما ذكرنا ، وإلى الجنوب من هذه النقطة هضبة مرتفعة تصل أعلى قمة فيها (جبل حوف) إلى ٣٧٥ مترا .

وتسكاد التكوينات الجيولوجية غرب القاهرة مباشرة ألا تختلف كثيراً عنها في شرقها اللهم إلا فيما يتعلق بإقليم أبى رواش ، فهنا نجد هضبة صخورها من حجر الجير الطباشيرى Cretaceous Limestone تنكسوها الصخور الاوسينية غير متجانسة معها فى البناء discordant وهذه التلال هى أيضا تكون محدبا anticline محوره من الغرب إلى الشرق مائلا إلى الشمال قليلا ؛ فهو يشبه فى اتجاهه محور المقطم . ويرى هيوم أن الإقليمين ربما كانا متأثرين بحركة التوائية واحدة وأن أحدهما متمم للآخر — وأن وادى النيل عبارة عن منطقة هبطت فيما بين شطرى هذا المحدب : الشرق وهو المقطم والغربى وهو أبورواش ^(١) .

وعدا هذه الطبقات الاوسينية نجد أن وراءها

سواء فى شرق أو غرب القاهرة صخوراً يرجع تكوينها إلى الأوليغوسين ثم إلى الميوسين وكلا هذين أكثر انتشاراً فى الغرب وفى صحراء ليبيا منه فى شرقى القاهرة .

وأما البليوسين فقليل من صخور وادى النيل تكون فيه . ومن هذه بعض

(١) راجع أعمال المؤتمر الجغرافى الدولى (القاهرة ١٩٢٥) جزء ٣ ص ١٠٦ .



الصخور الرملية التي تحف بوادى النيل نفسه ما بين الفشن والقاهرة ، وهذه أثر من آثار طغيان البحر على وادى النيل فى العصر البليوسين ، حين كان البحر يعم المنخفض الذى تكونت فيه الدلتا ووادى النيل إلى الفشن على الأقل . وعدا هذا فإنه فى وادى النطرون وعند المكس صخور يرجع تكوينها إلى هذا العصر .

أما عصر البليستوسين فقد تكونت فيه تلك المدرجات Terraces التي تحف بوادى النيل ، وكذلك الأقاليم الساحلية الواقعة فى شرقى وغربى الدلتا إلى مسافات بعيدة ما بين العريش من جهة ومطروح من الجهة الأخرى . أى إلى ما وراء حدود حوض النيل نفسه .

* * *

هنالك جزء من حوض النيل فى مصر يحق لنا أن نجعل له ذكرا خاصا هو إقليم الفيوم . وهو يحتل منخفضا من الأرض إلى الغرب من وادى النيل . ويتصل به بواسطة طريق ضيق منخفض فى وسط صحراء ليبيا : فى الشمال الغربى من بنى سويف . وينصب فى هذا المنخفض فرع من أفرع النيل وهو الذى ندعوه بحر يوسف ويخرج الآن من ترعة الإبراهيمية . ولكن فيما مضى كان يخرج من النيل مباشرة قريبا من ديروط . ولا أدل على أنه مجرى طبيعى لا قناة صناعية من كثرة التوائه وانحنائه فى جريانه . وهو يسيل موازيا للنيل تقريبا وإلى غربيه . ملتزما الناحية الغربية لوادى النيل ؛ حتى إنه ليجرى بجانب الصحراء فى بعض الجهات حتى يصل إلى بلدة اللاهون ، وهناك بغير اتجاهه فينحدر مغربا إلى أن ينتهى إلى المنخفض الكبير الذى فيه مديرية الفيوم . وتنتهى مياهه الآن إلى بحيرة صغيرة اسمها بركة فارون ، لا تزيد مساحتها اليوم عن ٢٢٥ كيلومترا مربعا ، ولا يزيد طولها عن ٤٠ وعرضها عن ١٠ كيلومترات ، ومستوى سطحها منخفض عن سطح البحر بنحو ٤٥ مترا .

أما المنخفض العظيم الذى فيه بحيرة قارون وأراضى الفيوم المزروعة ، فإنه يشمل منطقته مساحتها ١٢ر٠٠٠ كيلومتر مربع ، وقاعها منخفض عن سطح البحر كما رأينا ، والأراضى المزروعة فيها تبلغ نحو ١٨٠٠ كيلومتر مربع فقط ، والباقي صحراء أو بحيرات . وهنالك منخفض آخر إلى الجنوب الغربى من مديرية الفيوم اسمه وادى الريان ، منفصل عن منخفض الفيوم بحاجز من الحجر الجيري سمكه نحو ١٥ كيلومترا ، وسعة هذا المنخفض تبلغ نحو ٧٠٠ كيلومتر مربع وقاعه منخفض عن سطح البحر بنحو ٤٢ مترا فى أعق أجزائه .

ووادى الريان خال من الرواسب النهرية ومن القواقع النهرية مما يدل على أن مياه النيل التى كانت فيما مضى تغمر جزءاً عظيماً من منخفض الفيوم لم تصل إلى وادى الريان . فلم يكن يوما من الأيام جزءاً من بحيرة موريس حتى فى وقت أعظم اتساع لها .

وعلى كل حال فإن كلا من المنخفضين : الريان والفيوم لا يختلفان فى تكوينه عن المنخفضات التى فيها الواحات البحرية والفرافرة مثلا . وسبب تكوين هذا المنخفض أن الصخور التى تكون صحراء ليبيا هنا ليست كلها من حجر الجير الصلب بل تتخللها طبقات سمكية من الطين والطفل وتعريتهما سهلة . فنشأ عن إزالتهما ، بواسطة التعرية الهوائية ، هذه المنخفضات . ولقد قيل إن سبب تكوين منخفض الفيوم هو وجود انكسارات فى الصخر تبعه هبوط فى كتلة من القشرة الأرضية . ولكن بدنل Beadnell الذى قام بمساحة هذه المنطقة جيولوجيا يرى أن كل الأدلة تثبت أنه إذا كان هنالك عيوب فهى قليلة ولا أهمية لها فى تكوين المنخفض^(١) .

(١) راجع كتاب Topography and Geology of the Fayum province ص ١٥ (القاهرة ١٩٠٥) وكذلك الفصل الثامن من كتاب John Ball وعنوانه Contributions to the Geography of Egypt طبع القاهرة (١٩٣٩) .

الفصل الثامن

تطور نهر النيل

في الفصول السابقة من هذا الكتاب حاولنا أن نصف حوض النيل من منابعه إلى مصابه وصفا شاملا بقدر ما وصل إليه علمنا . وقد رأينا أثناء سردنا لخصائص النهر في جهات مختلفة أنه أولا ليس بالنهر الذي يمكن أن تطبق عليه القوانين العامة التي تخضع لها الأنهار ، ثانيا أن هنالك بعض أدلة على أن النهر لم تكن أحواله جميعها في كل عصر من عصور تطوره هي بعينها التي نشاهدها اليوم ، وهذا كله يدعونا لأن نستعرض هنا الآراء التي قيلت خاصة بتاريخ هذا النهر وأحواله في الأعصر الجيولوجية — قديمة كانت أو حديثة . ونحاول نقد هذه الآراء وتمحيصها لعل فيها ما يهدينا إلى حسن فهم جغرافية هذا النهر كما نعرفها اليوم . هذا مع العلم بأن كل بحث في الجغرافية القديمة Paleogeography هو بطبيعته صعب غامض . لأن الشواهد الجيولوجية الباقية لتدلنا على جغرافية أقاليم قديمة إنما هي شواهد قليلة ناقصة لا يمكن أن نهتدى بها إلى وصف دقيق منفصل لجغرافية ذلك الإقليم في العصر الطباشيري مثلا أو عصر الأيوسين ، أضف إلى هذا أن هنالك جهات عديدة في حوض النيل ، لا نعرفها إلا معرفة سطحية ، بحيث لا يكون من السهل أن نحيط علما بجغرافيتها القديمة بينما نحن لم نلم بعد تماما بجغرافيتها الحديثة .

يخالف نهر النيل أكثر أنهار أفريقيا الكبرى بأنه يجري من الجنوب إلى الشمال بينما الأخرى اتجاهها في الغالب من الشرق إلى الغرب أو بالعكس ، ويقول

جرى بحورى إن الاتجاه الغربى والشرق هذا هو من بقايا تأثير العهد الميزوزوى^(١) وكثير من أنهار أفريقية لا يزال متأثراً بما كانت عليه فى ذلك العهد . أما النيل فمتأثر بالحركات الأرضية التى انتابت القشرة الأرضية فى العصر الثالث وهذه كانت نتيجة تكوين أودية شمالية جنوبية . والنيل كما نعرفه الآن من أحدث ، إن لم يكن هو أحدث ، أنهار أفريقية .

والنيل يجرى أولاً فوق صخور ترجع إلى الزمن الأركى القديم ، ثم فى مجراه الأوسط والأدنى يجرى فوق صخور أحدث عهداً حتى ينتهى إلى البحر فوق صخور حديثة التكوين جداً .. وهذا قد يحملنا على الظن بأن تاريخ نهر النيل بسيط جداً وأنه نشأ بالتدريج تبعاً لعمر الصخور التى يجرى فوقها . فتكونت أعاليه أولاً ثم أواسطه ثم مجراه الأدنى ، تبعاً لتكوين الصخور : الأحداث فالأحدث من جهة وتبعاً لانكماش بحر تثنى Tethys القديم من جهة أخرى ، ولكن هذه الصورة البسيطة عن تطور النهر يبدو لنا خطأ متى ذكرنا أن هضبة أفريقية التى فيها أعلى النيل ، بالرغم من قدم عهدها ، قد انتابتها فى عصر جيولوجية حديثة تغيرات وتقلبات هائلة أثرت من غير شك تأثيراً كبيراً فى نظام الأنهار التى تجرى فيها . ولقد رأينا من قبل أن فى هضبة أفريقية براكين بعضها نائر وبعضها خامد وكلها حديثة العهد نسبياً . ورأينا كذلك فى أعلى النيل مسيلات لاشك فى أنها حديثة التكوين برغم قدم الهضبة التى تجرى فيها .

هذه القطع من النهر ، الحديثة التكوين جداً ، موزعة فى مجراه من غير نظام خاص ، وليس لها اطراد أو انسجام ينطبق — ولو بعض الانطباق — على أصول النظام النهري فالجنادل والخوانق والشلالات منتشرة فى نصفيه الجنوبى والشمالى وهى تبدو مزدحمة فى أجزاء محدودة من النهر ثم تختفى ، ثم تعود إلى الظهور . ولو تأملنا على سبيل المثال فى الجزء الأعلى من النهر : نيل فكتوريا وألبرت ، لرأينا

(١) فى مجلة G.J. جزء ٥٦ (١٩٢٠) ص ٣٧٦ .

في هذه المسافة القصيرة نسبياً ثلاثة مجموعات من الجنادل والشلالات ، التي لم تتح للنهر بعد مدة تمكنه من أن يؤثر فيها تأثيراً شديداً ؛ وهذا بوجه خاص هو الحال في إقليم جنوبي السودان ما بين نمولى وغندكرو .

ولا بد لنا من أن نسلم بأن بحر الجبل كله — كما نعرفه اليوم — من أوله في الجنوب إلى نهايته في بحيرة نو . هو نهر حديث التكوين ، وإن اختلفت مظاهر حدثاته . فإلى الشمال من نمولى ، نرى مجرى ضيقاً وعراً ، ينحدر النهر فيه انحداراً شديداً ، بمياه غزيرة مكددة مكددة ، ومع ذلك لم تؤثر التعرية النهرية فيه أثراً بليغاً . والنصف الشمالى من النهر أيضاً حديث جداً ، لخلوه من الشواطئ والجسور التي يكونها الإرساب النهرى المنتظم على مدى الأزمان .

ولئن كانت تلك القطع الجديدة من النهر ، تدل دلالة لا سبيل إلى إنكارها على أن النهر لم يتكوّن كله مرة واحدة ، وأن فيه أجزاء تختلف في تاريخ تكوينها وفي عمرها ، بعضها عن بعض . فإن هذه الحقيقة تبدو لنا في وضوح أكثر إذا درسنا القطاع الطولى لنهر النيل ، الذى يوضح لنا درجة انحدار النهر في أجزائه المختلفة . إن علمنا بما يسميه المهندسون « مناسيب » النهر ، أو مستوى كل جزء من أجزائه فوق سطح البحر ، في وقت الفيضان والانخفاض ، لا يزال ينقصه كثير من التفاصيل الجزئية ، ولكننا بفضل جهود رجال الرى ، قد أصبحنا ملهين بهذه المناسيب بصفة عامة ، تمكننا من أن نرسم قطاعات طولية للنهر في كثير من أجزائه .

إذا تأملنا القطاع الطولى لبحر الجبل مثلاً ، رأينا للنهر ثلاث مراحل مختلفة كل الاختلاف ، ففي الجزء الأول — من بحيرة ألبرت إلى نمولى ، نهر ضعيف الانحدار جداً . ثم من نمولى إلى الرجاف نهر شديد الانحدار جداً ، ثم يليه في الشمال نهر يتدرج بسرعة نحو الانحدار الضعيف . فهذا التباين العظيم في أجزاء النهر الثلاثة يدلنا على أنها لم تتحد معاً ، ولم ينتظمها نهر واحد إلا منذ زمن

وجيز ، لأن من طبيعة التعرية النهرية أن تسوى أجزاء المجرى بالتدريج ، حتى تحققي منها تلك الانقلابات المفاجئية .

وهذه الحالة تبدو في صورة أوضح في نهر النيل الأعظم ما بين الخرطوم وأسوان ، ففي هذه المسافة يسقط النهر نحو ٢٥٠ مترا ، مع أنه لا يسقط من شمال أسوان إلى البحر سوى تسعين مترا ، ويوشك ألا يكون له سقوط محسوس جنوب الخرطوم . فلا شك أن مجرى النيل الأبيض والأزرق ، ومجرى النيل في مصر لم يتصل بعضها ببعض اتصالا تاما إلا في وقت حديث وفضلا عن ذلك فإن مناسيب النهر بين الخرطوم وأسوان هي كما رأينا في الفصل السابق مختلفة أشد الاختلاف ، من مكان إلى آخر ، ولا تتبع نظاما مطردا ، مما يدل على أن النيل النوبي هو نفسه نهر حديث التكوين . فهذه الاعتبارات وغيرها حملت كثيرا من الباحثين على القول بأن نهر النيل كما نعرفه اليوم ، إنما يرجع تكوينه إلى آخر العصر المطير (Pluvial Period) الذي يعادل في أوربا العصر الجليدي أو أواسط عصر البليستوسين . وسنعرض في هذا الفصل لهذا الرأي لنرى مبلغ صحته ، ونوضح ما قد يكون فيه من دقة أو إسراف .

* * *

إن موضوع تطور نهر النيل يمكن أن ينظر إليه من ثلاث نواح مختلفة . وقد بحث من كل ناحية على حدة :

(١) الأولى : ويمكننا أن نسميها الناحية الجيولوجية البحتة وهي التي تحاول الاهتداء بواسطة بحث طبقات الأرض وما فيها من الحفريات وأنواع التربة وسمك الرواسب النهرية ونوعها وتوزيعها ونحو ذلك ، إلى معرفة ما إذا كان هنالك بقايا نهر قديم كان يجري فيما مضى في جهات لا يجري فيها نهر الآن . ثم يحاول بعض الباحثين إيجاد صلة بين نهر جيولوجي قديم قد انقرض وبين نهر النيل كما نعرفه .

(ب) الناحية الثانية : ويمكننا أن نسميها الناحية البيولوجية أو الزولوجية ،
أى الخاصة بدراسة الحيوانات . فهى الناحية التى تبحث حيوانات الأنهار
والبحيرات المختلفة فى حوض النيل والأحواض الأخرى فى أفريقيا وغرب آسيا .
ثم تجعل من تشابه حيوانات بعض البحيرات واختلافها دليلا يثبت به أن أنهارا
كالنيل والنيجر مثلا المنفصلين الآن كانا فيما مضى متصلين وهكذا .

(ح) الناحية الثالثة : التى يمكننا أن نسميها ناحية الجغرافيا الطبيعية هى
التى تعنى بخصائص نهر النيل كما وصفناها فى الفصول السالفة ثم نحاول أن نجد لما
رأيناه من شذوذ فى حالة النهر سببا مرتبطا بنشأة النهر وماضيه وتطوره .
ولعل هذه الناحية الأخيرة هى التى تهتمنا هنا أكثر من سواها ولكن ليس
من السهل — ولعله ليس من المفيد — أن تفصل بين بعض الاعتبارات الجيولوجية
والجغرافية ، لأنها شديدة الارتباط والاتصال .

* * *

(١)

كان النيل فى مصر موضع البحث العلمى قبل أن يبحث أى جزء آخر ،
وذلك لسهولة الوصول إليه ، ولكثرته الذين ارتادوا النهر فى هذا الإقليم ودرسوه
دراسة لا بأس بها . وقد كان إدورد هل من أول الجيولوجيين الذين عالجوا موضوع
تاريخ نهر النيل فى مصر ، وقد قصر بحثه على موضوع نقصان مياه النهر فى الوقت
الحالى عما كانت عليه فيما مضى . واستدل على هذا أولا بوجود ضفاف مرتفعة
(High terraces) على جانبي النهر . ثانيا بوجود أودية جافة فى بعض المواضع
مستوية أعلى من مستوى النهر الحالى .


لاحظ هل وجود طبقات من الحصى فوق ضفاف النيل منتشرة إلى مسافة
٧ أو ٨ أميال فى شمال وادى حلفا بالقرب من ديرة . وهذه الطبقات مرتفعة عن

مستوى فيضان نهر النيل الحالى بنحو ١٠٠ قدم وتحتوى قواقع حديثه العهد .
وقد لاحظ أيضاً مثل هذه الطبقات وإن تكن أقل منها ارتفاعاً قريباً من جرجا
وفى سهول طيبة والسكاب وعلى ضفة النهر اليمنى عند كوم أمبو . ومواقع أخرى
جنوبى شلال أسوان .

فاستدل هل من هذا على أن النيل لم يكن
فيضانه قاصراً على الجرى الحالى بل كان أعلى وأوسع
مما هو اليوم ، بحيث كان يغمر ضفافه الحالية ^(١) .

أما الدليل الثانى الذى استند عليه ، فهو وجود
أودية فسيحة محاذية للنهر فى بعض المواضع . وهى
الآن جافة لا يجرى فيها النيل . وهو يذكّر بنوع
خاص واديا عند كوم أمبو وآخرين عند أسوان
يوصلان ما بين البلدة والشلال . وقد سبق لنا ذكر
هذا . وهو يرى أن هذين الواديين كانا من قبل هما
الجرى الذى يسيل فيه ماء النيل . من قبل أن ينقص
حجمه — كما يزعم الأستاذ — ويكتفى بالجرىان فى
الوادى المنخفض الذى يجرى فيه الآن .

والسبب الذى من أجله نقصت مياه النيل هو
فى نظر هذا الكاتب جفاف كثير من الأودية التى
كانت من قبل تمد النهر بالماء والتى يوجد منها كثير فى



(شكل ٢٤) قطاع للنيل عند فرشوط (عن ادورد هل)

(١) راجع مقاله فى مجلة الجمعية الجيولوجية Q. J. G. S. مجلد عام ١٨٩٦ وعنوان المقالة:

Observations on the geology of the Nile, and on the evidence of the
greater volume of the river at a former period

الصحراء الشرقية . وهو يذ كر بنوع خاص وادى سنور بقرب بنى سويف ووادى طرفه القريب من المنيا ووادى أسيوط ووادى قصاب القريب من جرجا ووادى قنا ووادى أبو واصل القريب من الأقصر . ويرى أنه فى العصر المطير^(١) كانت هذه الأودية روافد وكانت تجرى إلى النيل فكان مأوؤه أغزر وفيضانه أعم : لأن مصر فى ذلك الوقت لم تكن عديمة الأمطار كما هى اليوم بل كان مناخها كمنافخ أوروبا اليوم ...

هذه خلاصة آراء الأستاذ هل ومنها ما يسهل التسليم به وبعضها ليس مؤسسا فيما يبدو على أدلة مقبولة .

فن المعتقد جذا أن مصر كانت فى العصر المطير أ كثر أمطاراً منها اليوم ، فإن الأودية الجافة المنتشرة فى الصحراء الشرقية والتى لا يجرى فيها الآن إلا سيول نادرة بحيث تمر أعوام عديدة بين كل سيل والذى يليه . لا يمكن أن تكون قد تكونت بتأثير هذه السيول بل لا بد أن كان جريان الماء فيها أ كثر مما هو اليوم . وأ كثر انتظاماً واطراداً

ولكن إذا سلمنا بأن مناخ مصر كان أ كثر مطراً فهل نسلم بأنه كان يشبه مناخ أوروبا ؟ وإذا قلنا بهذا الرأى فأى جزء من أوروبا نعى ؟ إن أوروبا قارة ذات أقاليم مختلفة وليس سقوط المطر فيها كلها بدرجة واحدة . فهل كان مناخ مصر فى العصر المطير كمنافخ جنوب أوروبا أم غربها أم شمالها فإن بين كل هذه تبايناً عظيماً ؟ لنذكر أولاً أن أوروبا فى العصر المطير كان يكسو شمالها الجليد ، وكان كذلك يكسو جبالها والأقاليم الجبلية فيها كسويسره . ووجود أمثال هذه الطبقات

(١) يطلق الجيولوجيون اسم العصر المطير Pluvial Period على ذلك العصر الذى يتفق فى الزمن مع عصر الجليد Ice Age فى أوروبا وأمريكا الشمالية . والعصر المطير قاصر على أقاليم سوريا ومصر وشمال وشرق أفريقية والصحراء . وبعض الكتاب يطلقونه على جميع المدة التى أولها نهاية البليوسين وآخرها نهاية البليستوسين . فتكون مدته والحالة هذه أطول من العصر الجليدى فى أوروبا .

من الجليد معناه أن الأحوال المناخية كانت غير ما نعرفه اليوم لا في أوروبا وحدها بل في الجزء الشمالى من أفريقيا ، ويقول بروكس إن المناطق المناخية التى نعرفها اليوم كانت أبعد إلى جهة الجنوب مما هى الآن^(١) . فأخذاً بهذا الرأى يكون المناخ القطبى ممتداً إلى شمال أوروبا ، ومناخ شمال أوروبا ممتداً إلى جنوب أوروبا ، ومناخ جنوب أوروبا منتشرأ فى القسم الشمالى من القارة الأفريقية .

وبمقتضى هذا الرأى يكون مناخ مصر فى العصر المطير أشبه شىء بمناخ فرنسا الجنوبية أو إيطاليا أو إيبيريا . ويجب ألا نغلو فنذهب إلى أبعد من هذا وليس لدينا دليل نركن إليه فى مثل هذا الغلو . إذن لقد كانت أمطار مصر فى ذلك العصر كأقطار إيطاليا مثلاً غزيرة فى الشتاء قليلة جداً وعلى الأرجح منعقدة فى الصيف ، فكانت تلك الأودية التى ذكرناها تمتلئ بالمياه شتاء أى بعد زمن الفيضان — كما نعرفه اليوم — وبعد أن يكون النهر آخذاً فى الانخفاض . فتجىء تلك الأودية بمياهها فتعوض بعض النقص أو كل النقص الذى أخذ يعترى النهر بعد انتهاء زمن الفيضان .

وهذه هى الصورة التى يمكن تخيلها ، وصفاً لما كانت عليه حالة النيل فى ذلك الوقت . فمياه الأودية لم تكن لتزيد فى حجم النيل بل كانت تحول دون نقصان حجمه نقصاً كثيراً فى أشهر الشتاء والربيع من كل عام . هذا على فرض أن النيل فى العصر الميلستوسين كما يفيض فيضانه السنوى الذى نعرفه الآن . وهنالك فريق من المؤلفين يرون أن النيل فى مصر لم يكن له اتصال بأنهار الحبشة ، ولم يكن يستمد منها أكثر مائه كما يفعل اليوم ، لأن هضبة الحبشة فى ذلك العصر كانت فى نظرهم من الأقاليم القليلة فى العالم ، التى كانت أمطارها أقل بكثير مما هى اليوم ، بينما كثير من الأقطار التى هى اليوم صحارى مجربة كانت غزيرة الأمطار

(١) C. P. Brooks فى ص ٣١٤ — ٣١٧ من كتاب Climate throughout

إذ ذاك^(١) . وسواء أصبح هذا الرأي أم لم يصح ، فإننا لا يمكننا أن نقول إن حجم نهر النيل كان أكبر وفيضانه أعم مما هو اليوم لمجرد وجود ضفاف عالية ذات رواسب نهريّة عن جانبيه .

مثل هذه الضفاف العالية والأودية المرتفعة عن مستوى الفيضان الحالى أشياء لا شك فى وجودها . وكثير منها يرجع تاريخه إلى العصر البليستوسين أو ختام البليوسين . فعلام إذن تدل هذه الضفاف المرتفعة ؟

إجابة على هذا السؤال نذكر بعض أمثلة ثابتة لا مجال للشك ولا للتخمين فيها . فى نهاية الشلال الثالث خائق وجنادل سمته ، وبالقرب منها على الضفة اليمنى ذلك الهيكل الذى استكشفه لبيوس Lepsius سنة ١٨٤٢ ورأى عليه كتابة تفيد أن النيل منذ نحو ٤٢٠٠ عام كان مستواه أعلى مما هو اليوم بنحو سبعة أمتار ونصف وقد بحث الدكتور بول هذه البقعة بحثاً جيداً وأداه بحثه إلى أن انخفاض مستوى النيل يرجع إلى أمر واحد وهو أنه كانت تعترض النهر عقبة صخرية ، أزالتها النهر بفتحته الدائم وحفره المستمر^(٢) .

بحث بول أيضاً إقليم شلال أسوان واقتنع بأن الوادى المرتفع الموجود شرق النيل والذى فيه السكة الحديدية اليوم كان من غير شك يوماً ما مجرى لنهر النيل . وقد تحول النيل عن هذا المجرى بتأثير حركات فى القشرة الأرضية - Earth move-ments كونت المجرى المنخفض إلى القرب من المجرى القديم . فلم تبق للنيل مندوحة من أن يسلك أسهل السيلين وأخفضهما .

من هذين المثالين نرى نوعاً من العوامل التى قد تغير من مستوى النهر .

(١) راجع كتاب بروكس فى الموضوع ذاته . ومقالة هيوم وكريج فى أعمال المجمع البريطانى لتقدم العلوم لسنة ١٩١١ Brit. Assoc. for Advancement of Science وعنوان المقالة

The Glacial period etc. in North and East Africa

(٢) راجع مقاله The Semna Cataract فى J. G. S. سنة ١٩٠٣ .

ونحن وإن لم ندع أن انخفاض مستوى النهر كان نتيجة لمثل هذه العوامل فقط ، نرى أنه يحمل بنا أن نقدر كل مسألة من هذا القبيل على حدة لعل لها تفسيراً طبيعياً معقولاً كهذا . وعلى كل حال ليس هنالك شيء خارج عن المألوف في أن يكون مستوى النيل في العصر البلستوسين — أى في عهد نشأة النهر كما سنرى — أعلى مما هو اليوم في كثير من المواضع ، كنتيجة لازمة لتطور النهر . وتفسيراً لهذا نذكر أن النيل يجري في مصر من الجنوب إلى الشمال فوق طبقات تميل نحو الشمال بزاوية تبلغ نحو ٥ أو ٦ درجات . كان النيل في ذلك الوقت أشد انحداراً مما هو اليوم ولا بد أن جرى النهر زمناً قبل أن يتسنى له أن يحفر مجراه ويمهده ويعبده بحيث يصبح كما هو اليوم . فالضفاف العالية بقية طبيعية لزمن النشأة وعهد الحدانة . ولا ضرورة للقول بأن حجم النهر ومقدار الماء فيه كان أكبر مما هو اليوم . مثل هذا الزعم لا يقوم به دليل ثابت .

ولو أن الأستاذ هل نفسه كان يكتب في زماننا هذا ، وبين يديه الأبحاث الحديثة الدالة على أطوار النهر المختلفة ، لما كان من الصعب عليه أن يرد هذا الاختلاف في مستوى النهر إلى أسباب أخرى لا تقل وجاهة عما ذكره . ذلك أن مستوى النيل في مصر لا بد أن كانت له صلة بمستوى البحر المتوسط ، الذي يصب فيه النهر ، وقد تمت بحوث عديدة في العهد الأخير تناولت دراسة الشواطئ القديمة لنهر النيل ، وهي التي تؤلف مدرجات ، أو «مصاطب» عالية عن مستوى الوادى في الوقت الحاضر . وقد لخص هذه الآراء الأستاذ جون بول تلخيصاً حسناً في كتابه : دراسات في جغرافية مصر^(١) .

وقد تبين من هذه البحوث أن مستوى نهر النيل كان يتمشى بوجه عام مع تذبذبات سطح البحر الأبيض المتوسط نفسه ، وأن هذا المستوى كان في أواخر

(١) راجع Contributions to the Geography of Egypt by John Ball الفصل

الثالث والرابع بوجه خاص .

البليوسين أعلى مما هو اليوم بنحو ١٥٠ متراً أو أكثر ، وأنه أخذ في الهبوط تدريجياً ، حتى كانت مستواه في أوائل العصر الحجري القديم أقل من مستواه الحال بنحو اثني عشر متراً . ثم حدث رد فعل إلى مدة وجيزة بعد ذلك ، فارتفع فوق مستواه الحال بنحو ستة عشر متراً ، وذلك في نهاية العصر الذي يسميه علماء الحضارات الحجرية باسم « العصر المستيرى » . ثم عاد بعد ذلك إلى الهبوط حتى انخفض عن المستوى الحال بنحو ٤٣ متراً على الأقل ، وهبط مستوى النهر في القاهرة نحو ٣٣ متراً عما هو عليه اليوم ، وتقدم الساحل الشمالى للقطر المصرى نحو ١١ كيلومتراً .

هذا الهبوط العظيم ، الذى يرى علماء الآثار أنه كان معاصراً للحضارة السبيلية ، أى حضارة آخر العصر الحجري القديم ، كان آخر هبوط لمستوى سطح البحر ؛ وقد أخذ مستوى البحر بعد ذلك فى الارتفاع تدريجياً ، منذ ذلك الحين إلى وقتنا هذا ، بما فى ذلك العصور التاريخية نفسها ، بدليل طغيان البحر على بعض الآثار البطلمية فى مدينة الإسكندرية .



(شكل ٢٥)

قطاع تقريبي لوادى النيل فى صعيد مصر ، يوضح المدرجات النهرية والإطار الصخرى المحيط بالوادى . (أ) - تكوينات عصر الأيوسين والطباشير ، حيث حفر الوادى لأول مرة فى أواخر الزمن الثالث . (ب) - قطع منهارة من الصخور نفسها . (ج) - حطام من الحصى والرمل امتلاء به الوادى فى عصر البليوسين . (د) - أقدم المدرجات وأعلاها من أواخر البليوسين وأوائل البليستوسين . (هـ) - مدرجات معاصرة للحضارة الحجرية القديمة . (و) - مدرجات العصر الحجري القديم المتأخر . (ز) - التربة السفلى القديمة . (ح) - التربة النيلية العليا . (ن) - مجرى نهر النيل . (نقلا عن بول)

هذه التذبذبات في سطح البحر المتوسط لا بد أن كان لها الأثر الأكبر في اختلاف مستوى النهر ، واختلاف المصاطب والمدرجات التي تحف بوادي النيل في مصر . وقد كانت هذه المصاطب موضع دراسة واسعة بواسطة بعض الباحثين أمثال أركل وساندفورد وجون بول وغيرهم ، وقد قسموا هذه المدرجات إلى نحو ثلاث مجموعات ، تشتمل كلها على تسع مصاطب . الخمس العليا ترجع إلى عصر البليوسين وأول الزمن الرابع وارتفاعها على التوالي هو ١٥٠ — ١١٥ — ٩٠ — ٦٠ — ٤٥ متراً فوق مستوى قاع الوادي الحالي ، والأولى والثانية منها تعدان من بقايا عصر البليوسين . وهما في حالة تهدم وتآكل بحيث لا يسهل الاهتداء إليهما إلا في جهات محدودة . أما الثلاث الأخرى فترجع إلى أول الزمن الرابع ، ومن الممكن تتبعها من وادي حلفا إلى القاهرة .

والجموعة التالية تشتمل على مصطبتين ارتفاعهما ٣٠ ، ١٥ متراً فوق قاع الوادي . وقد عُثِرَ فيهما على بقايا أدوات من الطراز الشيلي والأشولي . أما المصطبتان الباقيتان فارتفاعهما ٩ و ٣ أمتار فقط فوق قاع الوادي . وهما آخر تلك السلسلة من المصاطب العالية القديمة ، كما تبدو في كثير من جوانب وادي النيل في القطر المصري . وهكذا نرى أن وجود المصاطب العالية لا يمت بصلة إلى مقدار الماء الذي كان يحمله النهر ، بل ذهب بعض الكتاب إلى أن النيل في مصر في الأعصر المتقدمة لم تكن تصله المياه الجبسية . وهذا الرأي إن صح يدل على أن ماءه كان أقل مما هو اليوم ، إذ ليس من المعقول أن يكون النهر عظيماً ضخماً كما هو اليوم ، ويكون مورده الوحيد تلك الأودية المبعثرة في الصحراء الشرقية .

الجبسة في عصر البليستوسين

يحسن بنا هنا أن ننتقل إلى شرح ذلك الرأي القائل بأن هضبة الجبسة

حرارة منخفضة طول السنة لا في فصل الشتاء فقط ؛ فيقول :

« في أثناء العصر الجليدى ... كان الثلج والجليد متراكمين ومنتشرين في جبال هملايا (أكثر من اليوم)^(١) . فكان مناخ فصل الشتاء الحالى — بما فيه الرياح الجافة التى تهب من الشمال الشرقى — سائداً طول السنة تقريباً . ولم تكن تهب رياح ماطرة على هضبة الحبشة . ومياه النيل (الأزرق) لهذا السبب كانت قليلة . فكانت تفقد (بالتبخر) قبل أن تبلغ القاهرة (!) والنيل فى شكله الحالى لم يكن موجوداً .

« ثم من جهة أخرى نرى الرياح الغربية التى تهب اليوم على سوريا شتاء فتحمل إليها مقداراً حسناً من الأمطار ، كانت إذ ذاك (فى عصر البليستوسين) أشد مما هى الآن ومنتشرة جنوباً إلى أبعد مما هى اليوم . وقد حلت محل الرياح الشمالية والجنوبية الجافة السائدة فى وادى النيل الآن فكانت هذه الرياح الغربية القوية تحمل مطراً غزيراً إلى تلك التلال التى بين النيل والبحر الأحمر . والى تكاد اليوم أن تكون عديمة المطر . فكانت تسيل من تلك التلال أنهار قوية وتجرى مغرّبة حاملة مقادير كبيرة من الرواسب والصخور المفتتة (débris) حتى إذا بلغت سهول مصر ألقت بهذه الرواسب فتكونت من تراكمها طبقات سمكها يبلغ الأربعين أو الخمسين قدماً . وهذه الطبقات ممثلة أحسن تمثيل عند بلدة أوينا (Oina)^(٢) ؛ حيث تنتهى عدة أودية جافة . ومن الغريب أنها (الأودية أو الطبقات) تخترق وادى النيل الحالى وتصل إلى الصحراء فى الجهة الغربية . وهذا دليل آخر على أن النيل لم يكن له فى ذلك الوقت وجود .

« وفى هذه الطبقات وجدت أدوات حجرية من بقايا عصر أقدم من الشيلى

(١) الكلمات التى بين قوسين ليست من كلام بروكس وإنما زيدت للإيضاح .

(٢) لعله يقصد قنا .

(Pre—Chellean) مما يدل على أن مصر في ذلك الوقت كان فيها من المطر ما يكفي لقوام حياة الإنسان .

.....

« وبعد عصر المنديل (Mindel) للماطر جاءت فترة جفاف طويلة وانتشرت الأحوال الصحراوية . وفي هذه الفترة ظهر للمرة الأولى نهر النيل كما نعرفه الآن . وتكونت على جانبيه ضفاف (Terraces) وجدت بها بقايا العصر الشيلي (Chellean) . وفي ذلك العهد أو بعده ارتفعت قشرة الأرض فحفر النيل مجراه وعمقه إلى مسافة أعمق من مستواه الحالي .

« ثم تلا ذلك العصر المجدب عصر مطر آخر في زمن الرس (Riss) . ولكنه أقل أهمية من الأول . وقد تكونت فيه ضفاف أخرى . أما عصر الورم Wurm فلم تتكون به ضفاف . ولعل البلاد لم تكن مسكونة في ذلك العهد . ويرجح أن المناخ كان نصف صحراوي . فلا المطر كافياً لقوام حياة الإنسان ولا فيضان النيل المخصب فيغني الإنسان عن الأمطار . وكما قلنا من قبل إن نظام النهر الحالي لم يبدأ إلا منذ نهاية العصر الجليدي^(١) أي منذ نحو ١٢٠٠٠ سنة .

هذا هو رأى بروكس كما ورد في كتابه المعروف المتداول « تطور المناخ » . وقد استند على رأى هيوم وكريج . ولكن هذين لم يذهبا إلى المدى الذي ذهب إليه بروكس . ويرى القارى أن هذه الفكرة تتلخص في النقاط الآتية :

(١) أن مجرى النيل الحالي لم يكن موجوداً قبل عصر المنديل .

(١) يقسم العصر الجليدي إلى أربعة أقسام أقدمها الجنتس Guntz ويلي المنديل Mindel ثم الريس Riss وآخرها الورم Wurm . وبين كل منها والذي يليه فترة كان المناخ فيها دافئاً والجليد قليلاً . وهذه الأسماء التي وضعها بنك وبركنر Penck — Bruckner إنما تسرى في الأصل على سويسره وتاريخ العصر الجليدي بها . ولكن جرت العادة بذكر هذه الأسماء فيما يختص بالصور الجليدية في غير سويسره من البلاد الأوروبية والأمريكية . وكذلك فيما يختص بأعصر المطر في البلاد التي لم يكن بها جليد .

(٢) أن نظام النهر الحالى بفيضانه ورواسبه لم يبدأ إلا من نهاية العصر الجليدى أى منذ نحو ١٢٠٠٠ سنة . وقبل ذلك لم يكن النيل الأزرق يصل إلى مصر .

(٣) أن الرواسب النهرية الحالية فى وادى النيل قليلة السمك (١٠ أمتار) مما يدل على أن الاتصال بالحبشة حديث .

(٤) أن مصر فى عصر البليستوسين كانت كثيرة الأمطار وأنهارها تجري من مرتفعات البحر الأحمر إلى سهول مصر .

والنقطة الأخيرة يسهل التسليم بها أو على الأقل بجزء كبير مما جاء بها . وقد سبق لنا شرح ذلك . أما النقطة الأخرى فلننتدبرها الواحدة بعد الأخرى .

فيما يختص بالنقطة الأولى : لم يعد هنالك مجال للشك بأن وادى النيل من البحر شمالا إلى إسنا جنوبا — إن لم يكن إلى أبعد منها — كان موجوداً فى أواخر البليوسين وكان الجزء الشمالى منه عبارة عن خليج مستطيل للبحر الأبيض . وآخر الاستكشافات والأبحاث تؤيد هذا . فقد وجدت بقايا عصر البليوسين على جانبي النيل فى واديه الحالى . وقد بين ذلك بوضوح أركل وساند فورد اللذان قاما بأبحاث دقيقة^(١) ، للتحقق من عمر الضفاف المرتفعة على جانبي نهر النيل . فكان من جملة ما اهتموا إليه أن فى وادى النيل ما بين إسنا إلى أسيموط رواسب ترجع إلى عصر البليوسين ، وأن هذه الرواسب تراكت فى واد أقدم منها عهداً . إذن فوادى النيل ما بين أسيموط وإسنا يرجع إلى عصر البليوسين على الأقل .

(١) وقد نشر تقريرها المعهد الشرقى لجامعة شيكاغو فى عام ١٩٢٨ وقد نشر ملخص له فى أعمال المؤتمر الجغرافى الدولى لسنة ١٩٢٨ . وعنوان التقرير : Pleistocene Survey Expedition, First Report ونشرت أعمالها بعد ذلك كاملة فى مؤلف عنوانه :

وأما في شمال أسيوط فنحن نعلم مما ذكرناه قبلاً أن بقايا العصر البليوسيني موجودة فعلاً في وادي النيل إلى جنوب القاهرة حتى بلدة الفشن ، وهي يقايا بحرية تدل على امتداد البحر في صورة خليج إلى الجنوب . وأما فيما يختص ببقية الوادي فقد وجدت بقايا البليوسين مبعثرة في عدة أجزاء منه ، وهي في أكثر الأحيان تحتوي بقايا كائنات تعيش في ماء عذب .

من الثابت إذن أن وادي النيل في مصر — وعلى الأقل فيما بين إسنا والقاهرة — كان موجوداً في أواخر البليوسين . هذا فيما يختص بالوادي نفسه بقطع النظر عما إذا كانت تجري فيه نفس المياه التي تجري فيه اليوم و بقطع النظر عن مسألة مصدر هذه المياه . المهم أن نقرر بشكل لا يحتمل الشك أن وادي النيل ونهر النيل هنا أقدم بكثير مما توهمه بروكس والقائلون برأيه أو الذين قال هو برأيهم .

أما النقطة الثانية التي أراد بروكس إثباتها ، فهي أن هضبة الحبشة في العصر البليستوسيني ، وبوجه خاص في أثناء تلك الفترات التي أطلق عليها اسم العصور الجليدية في أوروبا ، كانت قطراً قليل المطر جداً بسبب اختلال نظام الضغط الجوي على القارة الآسيوية على النحو الذي شرحه . ونهر النيل الأزرق والعطبرة ، وسائر أنهار الحبشة كما نعرفها اليوم لم يكن لها وجود ، أو أنها كانت تكون أودية قليلة الماء ، أشبه بنحور الجاش ، لا تستطيع لقله مائها أن تصل إلى القطر المصري .

هذه الدعوى الهائلة لا تستند إلا إلى سلسلة من الافتراضات ، بأن جبال همالايا كانت تكسوها كتلة ضخمة من الجليد ، وأن الرياح التي تهب اليوم من المحيط الهندي على أفريقيا الشرقية والهند لم تكن تهب في ذلك الزمن . ومن غرائب المصادفات أن مستر كريج الذي قال هو وهيوم بقلة أمطار الحبشة قد ابتكر فيما بعد نظرية تقول إن مصدر أمطار الحبشة في الوقت الحاضر ليس هو المحيط الهندي بل المحيط الأطلسي . وقد كان لهذه النظرية وقتاً ما شأن كبير عند بعض

الكتاب والباحثين ، وهى إن صحت لا تتفق مع النظرية الأولى التى تقول بجفاف هضبة الحبشة بسبب عدم هبوب الرياح الماطرة من المحيط الهندى . وما دام مصدر فيضان النيل الأزرق فى نظر كريج هو المحيط الأطلسى ، فليس بذى أهمية أن تكون أمطار المحيط الهندى قليلة أو كثيرة فى أى عصر من العصور . وصفوة القول أننا لا نريد هنا أن نؤيد رأى كريج فيما يختص بمصدر فيضان النيل ، وإنما أردنا أن نشير — عرضا — إلى أن التمسك بهذا الرأى قل أن يتفق مع التمسك بالرأى الأول . ومهما يكن من شىء فإن دعوى كريج وهيوم و بروكس بأن أمطار الحبشة كانت قليلة فى أثناء الزمن الجليدى ، لم تستند على أساس من البحث فى هضبة الحبشة نفسها ، ودراسة ظاهراتها الطبيعية ، بل اكتفى بالاستنتاج والظن من جهة ، وبلاستدلال بسمك الرواسب النيلية فى مصر من جهة أخرى .

وهنا لا بد لنا أن نلاحظ أن أمامنا فى الواقع مسألتين لامسألة واحدة ، الأولى : هل كانت أمطار الحبشة كثيرة وغزيرة كما هى اليوم ، أم كانت بخلاف ذلك ؟ والثانية : هل كانت أنهارها تصل إلى مصر أولا تصل ؟ فالمسألتان ليستا مسألة واحدة كما توهم أولئك الكتاب ، فإن من الجائز أن يكون للحبشة أمطار ، وأن تجرى منها أنهار ولكنها لا تصل كلها أو جلها إلى القطر المصرى ، والطريقة الوحيدة لدراسة هذا الموضوع هى أن نتناول كلا من المسألتين على حدة .

وقد ترتب على الخلط بين المسألتين أن تورط أولئك المؤلفون إلى استنتاجات واستدلالات بعيدة المدى . فقد رأوا أن سمك الرواسب فى مصر ليس عظيما . فاستنتجوا أن النيل الأزرق لم يكن يصل إلى مصر . وما دام النيل الأزرق لم يصل إلى مصر ، فلا بد أنه لم يكن موجودا ، وأنه — إن وجد — نهر ضعيف هزيل لا يستطيع الوصول إلى مصر . وما دام الأمر كذلك فلا بد أن كانت هضبة

الحبشة قليلة المطر ، وإلا لما عجزت عن إمداد النيل الأزرق بالماء . وقلة المطر في الحبشة دليل قاطع على اختلال النظام الموسمي في جميع نواحيه وفي جميع أقاليمه الآسيوية والأفريقية . وهكذا انتقل بهم التفكير مرحلة بعد مرحلة حتى أبلغهم ذلك المدى البعيد . وكان من الجائز أن يذهبوا بتفكيرهم إلى وجهة أكثر اعتدالا لو أنهم فصلوا بين المسألة المناخية وتطورات المناخ في عصر البليستوسين ، وبين سمك الرواسب النيلية في القطر المصري . فمن الجائز كما ذكرنا أن تكون لهضبة الحبشة أنهار لم تكن تذهب إلى مصر لسبب من الأسباب ، ومن الجائز أيضاً أن تذهب إلى مصر بعد أن تتخلص من جزء كبير من رواسبها .

فمن الواجب أن نبدأ بحث هذه المسألة المزدوجة بدراسة مناخ هضبة الحبشة في عصر البليستوسين ؛ والطريقة المثلى لذلك هي أن تدرس هذه المسألة في هضبة الحبشة نفسها ، لا في الهند ولا في جبال همالايا ، بل في أودية تلك الهضبة وشواطئ بحيراتها ، لعل في هذه الدراسة المحلية ما يساعد على الاستدلال على وفرة المياه أو قلتها في ذلك العصر . وهذه هي الطريقة التي اتبعت في مصر وفي غير مصر من الأقطار ، فإننا لكي نعرف مناخ إفريقية الشمالية في عصر البليستوسين لم نذهب إلى الهند والسند وجبال همالايا ، بل عكفنا على دراسة وادي النيل ، والأودية الجافة التي تحيط به ، وتنساب إليه ، وعلى غير ذلك من الشواهد والأدلة . لقد كان العصر الجليدي في أوروبا يقابله عصر مطير في أفريقيا الشمالية والشمالية الشرقية وفي جزيرة العرب . وكان هذا العصر المطير يشمل أيضاً الصحراء الكبرى الأفريقية . فهل استطاع هذا النظام أن يشمل الهضبة الحبشية ، أو وقف دونها ، ولم يستطع أن يبسط سلطانه عليها ؟

من حسن الحظ أن قام غير واحد من الأساتذة بدراسة الأحوال المناخية السائدة في عصر البليستوسين في أفريقية الشرقية . وقد أخذ الاتحاد الجغرافي الدولي على عاتقه أن يشجع الأبحاث الخاصة بمخلفات ذلك العصر في جميع الأقطار ،

لكي نحصل على صورة حقيقية للبيئة الطبيعية السائدة في كل قطر وقت انتشار الإنسان على سطح الأرض .


ولنكتف هنا بسرد مثال واحد من تلك الأبحاث ، وقد قام به الأستاذ إريك نيلسن Erik Nilsson ، في ثلاث بقاع مختلفة في شرق إفريقيا ، وكلها ذات اتصال وثيق بأعلى النيل عامة ، وهضبة الحبشة بوجه خاص ^(١) .

والبقاع الثلاثة التي تناولها الأستاذ بالبحث هي منطقة الأخدود الإفريقي في مستعمرة كينيا ، والثانية الأخدود الذي يفصل بين هضبة الحبشة الشمالية والجنوبية ، والثالثة إقليم بحيرة طانا بالذات .

فأما الإقليم الأول فواقع على خط الاستواء تقريباً ، ويشتمل على ثلاث بحيرات ، وهي من الجنوب إلى الشمال : نيقاشا والمنتيما ونكورو ، وهي واقعة في حوض مغلق ، إلى الشمال الغربي من نيروبي عاصمة كينيا . وطول هذا الحوض نحو ١٠٠ كيلو متر . ويتمثل فيه الأخدود الإفريقي الشرقي بجميع خصائصه . إذ تحيط به المرتفعات من الشرق (جبال أبرداري Aberdare ، ومن الغرب (مرتفعات ماو MAU) . والحوض مع ذلك مغلق من الشمال والجنوب ، بواسطة حواجز عالية تفصل بينه وبين الأودية الأخدودية التي تليه من الشمال أو الجنوب . والحوض نفسه مقسم إلى قسمين ، إذ يعترضه مرتفع من الأرض ، وهو الذي يسمى ممر جلجل Gilgil ، وارتفاعه يزيد على ألفي متر فوق سطح البحر .

في هذا الوادي الأخدودي قام نيلسن بدراسة الشواطئ القديمة المرتفعة عن المستوى الحالي للبحيرات . وقام بعمل مساحات دقيقة لها ، فبين له أن هنالك ستة مجموعات من الشواطئ القديمة تمتد إلى ارتفاع ٢٠٥٠ متراً فوق سطح البحر ، مع أن الارتفاع الحالي لبحيرة نكورو يبلغ ١٧٥٠ متراً فيكون مستوى البحيرات قد

(١) أبحاث الدكتور نيلسن بجنتي Geograf. Annaler التي تصدر في سنكلهم وكذلك في المجلة الجيولوجية عام ١٩٢٨ ، Geol. Fören Förhändel.



(شكل ٢٦) الحوض الأخدودي في كينيا


هبط بنحو ٣٠٠ متر . وهذه الشواطئ القديمة ترجع إلى العصر المطير ، وتظهر بوضوح وفرة الأمطار في أول الأمر ، ثم تدرجها في النقص بعد ذلك ؛ وفي الوقت الذي يقابل العصر المطير في مصر كان الوادي تحتله بحيرة واحدة ضخمة ، تضيق في الوسط ، حيث يقع ممر جبل ، ولكنها واسعة في الشمال والجنوب ، وليست البحيرات الحالية سوى بقايا أو فضلات من تلك البحيرة العظيمة .

وهكذا نرى أن الأستاذ نيلسن قد أثبت بما لا يحتمل الشك أن العصر المطير كان ممثلاً في شرق أفريقيا تمثيلاً صادقاً ، وقد طابقت هذه النتيجة ما وصل إليه من

قبل الأستاذ ليكي Leakey في بحوثه بشرق أفريقية .

ويؤيد هذا الرأي أيضاً أن ركامات الجليد على كلفجارو ، كانت فيما مضى أكثر انخفاضاً مما هي اليوم ، لأن سقوط الثلج كان أغزر . وقد رأينا من قبل مثل هذه الحال على جوانب جبال روزنورى .

أما الإقليم الثانى الذى درسه الأستاذ نيلسن فهو الوادى الأخدودى الواقع إلى جنوب أديس أبابا ، حيث توجد بحيرات زواى وشالا وغيرها ؛ غير بعيد من منابع نهر هواش . ولا شك أن وجود البحيرات مما يساعد على المقارنة بين حالتها المائية فى العصر الحاضر ، وما كانت عليه فى أوائل وأواسط عصر البليستوسين .



وهذا يدلنا بالتالى على الحالة المناخية ، ووفرة الأمطار وقتها . وقد وجد نيلسن هنا فى وسط الهضبة الجبلية تكررأرأ لماشاهده فى الحوض الأخدودى بكينيا ، فالبحيرات الحالية يبلغ مستواها نحو ١٦٠٠ متر فوق سطح البحر ، ولكنها فى العصر المطير كانت تؤلف بحيرة واحدة عظيمة المساحة ، أعلا من البحيرات الحالية بنحو ٣٠٠ متر ، وبعد أن زال العصر المطير ،

(شكل ٢٧) الحوض الأخدودى فى جنوب الحبشة

أخذ تنكش وتتضال حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم .
والإقليم الثالث الذى درسه نيلسن ، هو بحيرة طانا نفسها والأقطار المحيطة بها ، ومع أن المؤلف قام بأبحاثه هنا على عجل ، فإنه مع ذلك قد عثر على بقايا شواطئ قديمة أعلا من المستوى الحالى لشواطئ بحيرة طانا بنحو ٣٠ مترا . وهى شواطئ لبحيرة كانت تحتل حوض بحيرة طانا الحالى ، ولكنها كانت أعظم منها حجما ، وأغزر ماء . وقد أطلق عليها نيلسن اسم بحيرة يايا Yaya ، باسم مكان تتمثل فيه الرواسب الساحلية القديمة لتلك البحيرة أحسن تمثيل .

إن حالة بحيرة طانا تختلف عن البحيرات السالفة ، لأنها بحيرة مفتوحة يخرج منها نهر ، بينما البحيرات الأخرى تؤلف أحواضا مغلقة ، ومن أجل ذلك لم يكن الاختلاف عظيما بين ارتفاع بحيرة طانا اليوم ، وبين ارتفاع سطحها في العصر المطير . وهناك فائدة عظيمة لمن يدرس الحالة المناخية لتلك الأقطار في عصر البليستوسين أن يتناول ببحثه عدة مواضع ، وأن يقارن بينها حتى لا يتسرب الخطأ بسبب اختلافات أو خصائص موضعية في بعض الجهات ليست متوفرة في البعض الآخر .

والشواهد المختلفة التى جمعها نيلسن من الأقاليم التى بحثها ، بالإضافة إلى الأبحاث التى قام بها غيره من العلماء ، تثبت فى صورة لا تحتل الشك أن العصر المطير ، بأمطاره الغزيرة ، لم يكن يمتد إلى شمال إفريقيا فحسب ، بل كانت أمطاره منتشرة فى جميع أنحاء شرق إفريقيا أيضاً بما فى ذلك أقاليم أعلى النيل والهضبة الحبشية ، وكانت هذه الهضبة على الأرجح أغزر مطراً مما هي اليوم . وما دامت هذه الحقيقة قد ثبتت بالمشاهدة والبحث ، فلا بأس علينا إذا أغفلنا ما قيل عن النظام الموسمى فى عصر البليستوسين .

كانت الهضبة الحبشية إذن وافرة المطر غزيرة الماء فى عصر البليستوسين ، وهذا يستتبع أنها كانت تجرى منها أنهار لا تقل قوة ، ولا وفرة ماء عن الأنهار

التي تجري منها الآن . فهل كانت هذه الأنهار تجري إلى مصر ؟
هنالك بالطبع احتمالات عديدة يجوز أن يقال رداً على هذا السؤال ،
نذكر منها :

(١) أن من الجائز أن نظام التضاريس وتصريف المياه من الهضبة ، والظام
النهرى المترتب على ذلك كان يختلف فيما مضى عما هو عليه اليوم ؛ فلم تكن الأنهار
تجري فى الاتجاهات التى تتجه إليها الآن . أو أن شطراً كبيراً من مياه الهضبة
كانت له وجهة أخرى . مثل هذا الافتراض ليس من السهل قبوله أو رفضه ،
وليس هنالك أدلة تثبته أو تنقضه . ولكنه مع ذلك أمر بعيد الاحتمال لأن
الأودية الحبشية لا بد أن جرت فيها المياه زمناً طويلاً ؛ فعلى الرغم من أنها أودية
حديثة لكنها ليست مفرطة الحداثة .

(٢) ومنها أن الأنهار الحبشية كانت كما هى اليوم ، وكانت تجري حتى تصل
إلى القطر المصرى ، وبذلك لا يكون هنالك مشكلة تتطلب الحل . وهنا نواجه
اعتراضين خطيرين : أولهما مسألة سمك الرواسب النهرية فى القطر المصرى ؛ والثانية
حالة النهر فى بلاد النوبة ، التى تحمل فى مظهرها كثيراً من صفات الحداثة .

فأما مسألة الرواسب النيلية ، فقد استند إليها غير واحد من الكتاب بأنها
دليل قاطع على أن أنهار الحبشة ، التى تحمل طين النيل المعروف لم تكن تصل إلى
القطر المصرى . وحجتهم أن الرواسب الحالية لا يزيد عمقها فى « المتوسط » على
عشرة أمتار . وهذا المقدار يكفى لتراكمه مضى عشرة آلاف من السنين طبقاً
لدرجة الإرساب الحالية .

ومسألة عمق الرواسب فى مصر لا تزال تفتقر إلى المزيد من البحث . ولقد
أرسلت الجمعية الملكية الإنجليزية بعثة لتحفر فى الدقا ، لى تقدر مقدار سمك
الرواسب ، فقامت البعثة بحفر ثقب عمقه ٣٤٥ قدماً بالقرب من الزقازيق . ولم

تستطع حتى عند هذا العمق أن تبلغ القاعدة الصخرية التي تراكت فوقها الرواسب . ولم تستطع تلك الهيئة أن تحفر إلى أعظم من هذا^(١) . وقد وجدت أن رواسب النيل الحالية موجودة إلى عمق ١١٥ قدماً (نحو ٣٥ متراً) وهي أحياناً نقية وأحياناً ممزجة برمال . ولعل وجود الرمال يرجع إلى طبيعة المكان الذي كان فيه الحفر ، القريب من وادى طميلات ، والصحراء الشرقية ، وما قد تحمله الجداول أو السيول من إرسابات صحراوية .

ولا تزال المواضع التي حفرت لتحقيق مدى عمق الرواسب النيلية في مصر ، قليلة وهي في العادة تمثل قطاعاً ، أسفله رمال وحصى ، يليه رواسب نهريّة قديمة تختلف عن الرواسب الحالية ، ثم يليها رواسب هي مزيج من الرواسب القديمة والحديثة ، ثم يليها الكتلة التي تمثل الرواسب الحديثة لنهر النيل .

لقد سبق لنا أن ذكرنا أن من الخطأ القول بأن الإرساب كان بنسبة واحدة في جميع العصور . بل مما لا شك فيه أن نسبة الإرساب قد ازدادت كثيراً منذ نهاية العصر الحجري القديم ، وذلك تبعاً لارتفاع سطح البحر ، وأن الأوقات التي كان يهبط فيها سطح البحر المتوسط ، كانت تمتاز لا بقلة الإرساب فقط ، بل بزوال بعض الرواسب بواسطة التعرية النهرية .

فالقول إذن بأن عمر رواسب النيل لا يتجاوز عشرة آلاف من السنين ، قول لا يمكن التمسك به . والأرجح أن تكون رواسب النيل الأزرق بدأت تصل إلى القطر المصري قبل ذلك بزمن بعيد ، قد يكون ضعف أو عدة أضعاف تلك المدة .

ومع ذلك لا بد من التسلیم بأن مصر ظلت مدة طويلة يجري فيها نهر النيل خالياً من الرواسب الحبيشية كما نعرفها الآن . وهذه الحالة يفسرها الكتاب بأن

(١) راجع تقرير J. W. Judd في مجلة أعمال الجمعية الملكية من سنة ١٨٩٧ ص ٣٢ .

النهر كان في ذلك الوقت يستمد ماءه فقط من القطر المصرى ، وبوجه خاص من تلك الأودية التى تجرى من مرتفعات البحر الأحمر والهضبة الشرقية ، حتى تصب فى نهر النيل . وهذه الأودية معروفة كلها ، ولا شك أنها كانت يوماً ما تحمل من الماء أكثر مما تحمله اليوم ، لأن السيول النادرة التى تجرى فيها الآن لا تستطيع أن تحفر تلك الأودية فى الصورة التى نراها عليها اليوم .

ولكننا برغم هذا لا نرتاح إلى الظن بأن هذه الأودية كانت وحدها قادرة على تكوين ذلك النهر الضخم الذى تشهد ضفافه العالية بأنه كان لا يقل عن النهر الحالى قوة وغزارة ماء .

أليس من الجائز أن مياه النيل الحشوية كانت تصل إلى القطر المصرى ، ولكنها كانت خالية من الرواسب ، أو قليلتها ؟ لعل هذا هو الاحتمال الوحيد الذى لم يفكر فيه أحد ممن بحث هذا الموضوع ، ومع ذلك فإنه يساعدنا أيضاً عندما ننظر إلى تلك الظاهرة الأخرى التى سبقت الإشارة إليها ، وهى حالة نهر النيل فى بلاد النوبة فيما بين الخرطوم وأسوان ؛ فإن مظاهر الحداثة هنا : مثل وفرة الشلالات والجنادل ، واختلاف المناسيب ، كلها تشير إلى أن النهر لم يفيض عليه هنا وقت طويل ، وأعمال التعرية القليلة تدل على ذلك . ولكن إذا كانت المياه قليلة أو عديمة الرواسب ، فإن فى هذا تفسيراً كافياً لعجز النهر عن النحت والتعرية فى بلاد النوبة .

فإذا كان هنالك احتمال أن النهر كان يجرى خلوا من الرواسب ؛ فما الظروف التى أفقدته رواسبه ؟ هنالك أمر ، قد أشار إليه كثير من الكتاب . وهو وجود بحيرة عظيمة فى النصف الجنوبى من النهر ، وهذه إذا وجدت ؛ كانت كفيلة بأن تسلب الأنهار التى تصب فيها جميع ما تشتمل عليه من الرواسب . فإذا خرج منها نهر متدفقاً نحو الشمال ، كانت مياهه نظيفة خالية من كل أثر للرواسب .

وسنعود إلى ذكر هذه البحيرة وحلاصة رأى الباحثين في شأنها في ختام هذا الفصل . وحسبنا هنا أن نشير إلى أنه لو تحقق وجود مثل هذه البحيرة ، ولم تكن بحيرة مغلقة ، بل كان يجري منها نهر إلى الشمال لكان في هذا ما يفسر هاتين الظاهرتين ، وهما سمك الرواسب النيلية وحالة النهر الحديثة فيما بين الخرطوم وأسوان .

* * *

وإتماما لبحثنا في تطور النيل ، واستعراض مختلف الآراء لا بد لنا من أن نذكر باختصار رأى اثنين من العلماء الألمان الذين كان لهم نصيب ملحوظ في التفكير في هذا الأمر ، وهما الأستاذان بلانكنهورن وتيودور آرلت .

كان ماكس بلانكنهورن Max Blanckenhorn من أول الكتاب الجيولوجيين الذين درسوا جيولوجية القطر المصري ، وساقه ذلك إلى بحث النيل من الناحية الجيولوجية ، وذلك في مقالة له عن تاريخ النيل زعم فيها أن النيل نهر حديث جدا ، لا يرجع إلى أبعد من العصر الجليدي الأوسط . وقد نشر مقاله هذا في أوائل القرن الحالى^(١) . ومع أن بلانكنهورن قد عدل عن رأيه هذا فإن بعض الذين لم يطلعوا على كتاباته الأخيرة لا يزالون متمسكين برأيه القديم .


اشتهر بلانكنهورن أيضا بأنه « مكتشف » نهر النيل اللبى أو كما سماه هو Das Libische Ur-Nil . وهذا النهر القديم هو حسب رأى بلانكنهورن جد النيل الحالى . وهو نهر يرجع تاريخه إلى أواسط عصر الأيوسين . وكأنما كان يجري

(١) اسم المقالة Geschichte des Nil-Stroms ونشرت في مجلة . Z. d. Ges—F. Er.

في سنة ١٩٠٢ وهناك استشهدا له مما جاء بها ، Erst mit dem mittleren Diluvium, gleichzeitig mit dem Erscheinen des Prahistorischen Menschen trifft der das heutige Nil-tal durchstromende eigentliche Nil an Seine Stelle (٦٩٥ س)

وقد عدل عن رأيه هذا في مقالة نشرت في Z. d. deut. geo I.G. ges, سنة ١٩١٠

وفي الطبعة الأخيرة (١٩١٩) من كتابه عن جيولوجية مصر Geol Agyptens



(شكل ٢٨) النيل الليبي كما تصوره بلانكنهورن (١ - ٥) وبيدتل (٦)

في صحراء ليبيا إلى الغرب من مجرى النيل الحالي . . واستدل بلانكنهورن على وجود هذا النهر بالرواسب النهرية الكثيرة ووجود بقايا كائنات تعيش في الماء العذب . وبالأشجار المتحجرة الضخمة . وهذه الشواهد دلته على أن هذا النهر كان يجري إلى الشمال ويصب بالقرب من الطرف الغربي من بحيرة قارون ، في بحر « مقوسط » كان أعظم امتداداً إلى الجنوب من البحر الحالي . وبقي هذا النهر يجري على هذه الحال في عصر الأوليجوسين ثم في الميوسين أيضاً حيث بلغ هذا النهر أقصى نموه . وكان مصبه إذ ذاك قريباً من وادي النطرون . ثم بعد الميوسين أخذ النهر يتضاؤل ويصغر حجمه حتى انقرض تماماً في آخر البليوسين .

وفي أواخر البليوسين طغت مياه البحر الأبيض على الجزء الأدنى من وادي النيل الحالي فغمرته مدة قصيرة . وكانت في هذه الأثناء قد تكونت في هذا الوادي انكسارات وعميوب هي التي مهدت للنيل مجراه في مصر .

ولقد توجد في أعماق الثرى بوادي النيل بقايا بحرية فهذه ترجع إلى هذا العهد البليوسيني . ثم لقد وجدت بسفح المقطم رواسب نهريّة بحرية مما يدل على أن النيل قد بدأ في ذلك الوقت يجري في واديه الحالي . .

ويرى بلانكنهورن أنه في ذلك الوقت (خِتام البليوسين وأوائل البلايستوسين) الذي اتسع فيه البحر الأبيض ، امتد خليج السويس نحو الشمال . واتحد البحران مدة وجيزة نسبياً (على أن جري مجرى ينسفر هذا مستشهداً بأن أسماك البحر الأبيض والأحمر كانت مختلفة تماماً إلى أن وصلت قناة السويس ما بينهما) .

وفي أوائل العصر المطير ارتفع برزخ السويس فانكش الخليج وافترق البحران . ويرى بلانكنهورن أن قد كان للنيل في ذلك العهد فرع ينتهي إلى خليج السويس (؟) وأن الدلتا بدأت تنحسر عنها مياه البحر . ونظراً لأن رواسب الدلتا عظيمة السمك يكون الأرجح أن تكونها لا يرجع إلى أي ارتفاع في القشرة الأرضية بل إلى عامل الإرساب المستقر .

هكذا كانت الحالة في أول العصر المطير الذي يقابله في سويسرة عصر الجفنتس « Gunz » وأما في الفترة التي بين الجفنتس والمندل فكانت مصر ذات مناخ جاف . وقلت القهرية النهرية وتراجع البحر شمالا إلى أبعد من موقع القاهرة الحالى ، وفي هذه الفترة الجافة بين عصرين مطرين ظهر الإنسان للمرة الأولى (!) في مصر .

وبعد هذه الفترة الجافة جاء عصر المندل Mindel فكان أشد العصور مطراً في مصر وكان النيل يجري في مجرى أعلى من مستواه الحالى . كما تدل على هذا الضفاف العالية على جانبيه . ومن بعد هذا بدأ عهد الجفاف رويداً رويداً . وبرغم وجود الجليد في أوروبا في العصرين المسميين ريس وورم Riss and Wurm فلم يكن هنالك عصران مطيران يقلابلانهما في مصر . بل أخذ المطر يقل بالتدريج بعد عصر المندل حتى باتت الأحوال الصحراوية سائدة في هذا القطر كما هي الحال اليوم . وتم هذا منذ نحو ٢٠٠٠٠ عام . أى قبل بدء التاريخ في مصر بزمان مديد .

هذا هو ملخص آراء بلانكنهورن لا في كتاباته القديمة فقط بل بعد تعديلها بمؤلفاته الحديثة ، وهذه الآراء يقبلها كثير من الجيولوجيين . ووجود ذلك النهر الليبي القديم قد سلم به كثير من الكتاب . وإن اختلفوا عنه في تفاصيل الجرى ومنابعه وهي أشياء يفترضها بلانكنهورن افتراضاً .

والأمر الوحيد الذى سبب شيئاً من الالتباس هو تسميته لذلك النهر الليبي بالأورنيل أى (أصل النيل) أو (النيل القديم) وهو في الحقيقة ليس أصلاً للنيل ولا أباً ولا جداً ، وأن النهر الليبي نهر جيولوجي انقرض ، فهو إذن نهر حفرى ولا يمت إلى النيل بنسب . على كل حال إننا متى ذكرنا هذه الحقيقة نأمن أن يلتبس علينا الأمر من مجرد الاسم . وليس هذا بفاقص من قدر مجهودات

بلانكنهورن التي بذلها في محاولة استقراء تاريخ مصر الجيولوجي .

* * *

على أن أبحاث بلانكنهورن هذه كانت قاصرة على النيل في مصر . وهناك عالم آخر : Theodor Arldt قد حاول أن يصف لنا تطور نهر النيل كله ^(١) . ولنذكر آراءه هنا باختصار .

يرى أرلت أن النيل الحالي إنما تكون منذ عصر البليوسين . وأن تتابع الحوادث كان على الوجه الآتي :

في أواسط الأيوسين أخذ البحر يتراجع إلى الشمال واليابس يظهر تدريجياً . وهذه الحال استمرت بلا انقطاع تقريباً في طول عصر الأوليجوسين والموسين ، وفي ذلك العهد كانت سوريا جزءاً من القارة الأفريقية وجزءاً من المنطقة الحيوانية المسماة (بالاثيوية) وفي عصر البليوسين تراجع البحر عن سوريا كثيراً حتى اتصلت بقبرص وبات كثير من الجزء الشرقي للبحر الأبيض Levant أرضاً يابسة . وهذه الحقائق كلها ذات أهمية بالنسبة لما يقال من تشابه حيوانات أنهار سوريا وفلسطين بحيوانات نهر النيل .

وفي أواسط البليوسين أخذ البحر يطغى على مصر حتى غمرها إلى مغارة الواقعة في صحراء ليبيا إلى الجنوب الغربي من وادي النطرون ولم يتراجع إلا في أواخر البليوسين . وفي هذه الأثناء تكونت عيوب وانكسارات طولية (Meridional) في مصر وبعض الأقطار المجاورة لها . وبسبب هذه الانكسارات تحول (؟) النيل عن مجراه الغربي في صحراء ليبيا إلى مجراه الحالي . وهذا حدث في نهاية البليوسين .

(١) راجع مقاله Zur Palaeographie des Nillandes and c. ونشرت في مجلة Geol. Rundschau في عام ١٩١٨ ص ٤٧ و ١٠٤ .

وهنا نلاحظ أن أرلت و بلانكنهورن متفقان على أن النيل في مصر يجري في واد ، العامل الأكبر في تكوينه انكسارات اتجاهها من الشمال إلى الجنوب تقريباً . وقد قبل كل من جريجورى وليونز هذا رأى . ولكن بول نفاه بقائنا . ورأيه أن وادى النيل إنما سببه التعرية على طول واد التوائى (folded valley) وهيوم يرى في هذه المسألة رأيا وسطاً . وهو أن الوادى إذا كان في بعض المواضع التوائياً فإنه في مواضع أخرى نتيجة وجود انكسارات تكون الوادى بمقتضاها . ولعل هذا رأى هو أسلم مغيبة من سابقه^(١) .

ولنلاحظ أن أرلت يرى أن النيل الحالى هو خليفة ذلك النهر الليبى وأن هنالك حلقة اتصال بينهما مباشرة . فالنهر الليبى أعمجى لأن مياهه سلكت مجرى آخر بين الشقوق والانكسارات التى حدثت فى أواخر البليوسين والتي كونت مجرى النيل الحالى . وهذا الافتراض — وهو ليس أكثر من مجرد افتراض — له أهمية كبرى لولا أنه لا يقوم به دليل قاطع . فإن منابع النهر الليبى نفسها غير ثابتة ولا يعرف مصدرها ومجراها .

وقد حاول أرلت أن يرسم لنا صورة كاملة لتطور النيل على الوجه الآتى : إن النيل الأول (Ur-Nil) لم يكن يستمد ماءه من هضبة الحبشة ، بل من هضبة بلاد النوبة (١) وكانت نهيراته العليا هى (١) الجزء الشمالى من العظيرة (٢) والنيل الحالى من بربر إلى أبى حمد . (٣) ونهر آخر يتصل بالنيل عند أبى حمد مصدره من الجنوب الغربى ومجراه الأدنى مجرى النهر الحالى من دبه إلى أبى حمد . ولو أن جريانه كان فى اتجاه مضاد لجريانه الحالى .

وعند أبى حمد كان يجري النهر شمالا فى واد يشبه — إن لم يكن هو — وادى قبقة والعلاق . ثم يخترق الموضع الذى يجري فيه النيل الحالى ما بين

(١) راجع مقالى بول وهيوم فى Geol. Mag. فى سنة ١٩١٠ « لندن » عنوانها
Origin of the Nile Valley.

كرسكو وأسوان متبجها إلى الشمال الغربي ، جاريا وسط صحراء ليبيا حيث لا تزال توجد شواهد جريانه في المياه التي في الواحات العديدة كواحة كركور والداخلة والخارجة والفرافرة والبحرية .

وكان لهذا النهر روافد منها نهر كان يجري من قرب الخرطوم ثم يتجه إلى الشمال الشرقى حتى يتصل بالنهر القديم عند بربر . ومنها رافد آخر كان يتصل به عند كرسكو . وهو رافد كبير منابعه في كردوفان ودارفور وكان يجري في وادى ملك ثم في وادى النيل الحالى نفسه ما بين دنقلا إلى حلفا فسكرسكو .

أما أعلى العطيرة والنيل الأزرق فلم يكونا جزءاً من النيل الأول — في نظر أرت — والنيل الأبيض لم يكن موجوداً مطلقاً . وحوض بحر الغزال كان عبارة عن بحيرة هائلة ممتدة من دار فريت إلى الحبشة ، وانخفاض هذه المنطقة واستوائها دليل على وجود تلك البحيرة . وبعد أن جفت هذه البحيرة بالتدريج في عصر البليوسين تولد منها عدة مجموعات نهريّة منتشرة من الشرق إلى الغرب أهمها بحيرة رودلف ، وبحر الزراف ، وبحر الغزال ، وبحر العرب ، وبحر السلامة ، وحوض بحيرة تشاد .

وأما النيل الأزرق وأعلى العطيرة فكانت مجموعة نهريّة مستقلة تجري إلى الشمال في الإقليم الذى يحتله البحر الأحمر الحالى ، وتنصب في البحر الأبيض في إقليم شبه جزيرة سيناء . ففي أواخر البليوسين تحول مجرى النهر الليبي إلى مجرى النيل الحالى . واستطاع النهر أن يأسر العطيرة والنيل الأزرق والأبيض حتى فشودة .

هذا في نظر أرت قد حدث كله قبل تكون البحر الأحمر . وهو يقول إن البحر الأحمر لو كان موجوداً لكانت للأنهار التي تصب فيه من السرعة وشدة الانحدار ما يجعلها أقدر على التعرية والأسر من أنهار البحر الأبيض . ولتحول النيل والحالة هذه إلى البحر الأحمر . وافترضه هذا يتعارض مع رأى السائد عن

البحر الأحمر . فإن رأى الذى ارتآه مارينلى وداينلى وعضدهما فيه جري مجرى
وكثير من الكتاب يقول بأن المنخفض الذى فيه البحر الأحمر الآن قديم يرجع
على الأقل إلى عصر الأوليجوسين . ولكن لم تغمره مياه المحيط إلا فى نهاية
البليوسين^(١) . ومن الصعب والحالة هذه أن نتصور أن النيل الأزرق والعطربة
كانا يجريان فى هذا المنخفض ، ومنه إلى البحر الأبيض .

هذا ويقول تيودور أرلت إن اتصال بحر الغزال والجبل وحوض السيليكى
بالنيل حديث العهد يرجع إلى عصر الجليد Diluvium وإنه فى عهد حديث قد
تم اتصال مياه فكتوريا بالنيل بواسطة تكوين فرجة ريبون وخانق كروما
وشلالات مرتشيزون .


وأما رأيه فيما يختص بالانحناء العظيم الذى لمجرى النيل بين الخرطوم وأسوان
فإنه يرى أنه حديث العهد جداً . وأن النيل قد غادر مجراه القديم بين أبى حمد
وكرسكو ؛ وعند أبى حمد تحول وبات يجرى إلى الجنوب الغربى فى عكس
اتجاهه الأول .

وهو يرى أن سبب هذا التغيير حركات فى القشرة الأرضية سببت ارتفاعاً فى
الجزء الشرقى من القطر المصرى (والنوبى) بحيث أصبح المجرى الحالى أسهل .
وحقيقة هنالك شواهد أخرى تدل على أنه قد حدث ارتفاع فى النصف الشرقى
من القطر المصرى فى وقت قريب جداً ، ومن هذه الشواهد مثلاً اختفاء مصبات
النيل الشرقية — كما سنرى — والنقص فى حجم مصب دمياط . ثم التحول فى
مجرى النيل عند أسوان وخلفها . وهذه الظاهرة وإن كانت واضحة فى مصر فقد
تكون آثارها ممتدة إلى بلاد النوبة .

هذه خلاصة آراء أرلت فى تطور النيل وبعضها يصعب التسليم به ، وعلى

(١) كتاب جريجورى ص ٣٤٧ Gregory : Rift. Valleys and Geol. of E. Afrika

الأخص دعواه بأن أنهار الحبشة لم تكن متصلة بالنهر الليبي Ur-Nli بل كانت تجري في منخفض البحر الأحمر ثم إلى البحر الأبيض عن طريق سيناء ؛ ويظهر أنه ليس هناك دليل قاطع بأن النهر الليبي المذكور لم يكن له اتصال بالحبشة ، فإن



هذا النهر الذي يصفه بلانكنهورن مستكشفه بأنه نهر جبار Riesenstrom لا بد أن كان يستمد مائه من موارد غزيرة جداً . فهل كانت مياه بلاد النوبة ودارفور وكردوفان كافية ؟

(شكل ٢٩) تطور النيل النوبي كما صورته آرتل

سؤال يصعب الإجابة عليه . ولكن لنذكر شيئاً واحداً وهو أن ظهور النيل الليبي المذكور في أواسط الأيوسين كان على أثر ارتفاع هضبة الحبشة وبدء تكونها . أليس من الممكن أن يكون هنالك علاقة بين الحادثين ؟ فإن قيل إن رواسب النهر الليبي غير رواسب النيل الحالي ، فالحبشة لم تكن تكسوها دائماً طبقات البازلت التي تكسوها اليوم .

هذا ما عنّ لنا ذكره من آراء الجيولوجيين بخصوص تطور نهر النيل ، ومنها كما يرى القاري شطر كبير بنى على الافتراض بحيث لا يمكن مع حالة علمنا — أوجهلنا — الراهنة أن نقطع فيها بالنفي أو الإثبات .

(٢)

والآن فلننتقل إلى الشطر الثاني من الأبحاث الخاصة بتطور النيل : وهي الأبحاث المبنية على مقارنة السكانات الحية في أنهار أفريقية وبحيراتها وفي أنهار سوريا .

رأى الدكتور بولنجر الخبير بالمتحف البريطاني تشابها عظيما بين بعض أسماك النيل ونهر السنغال والنيجر وبحيرة تشاد والكنغو بل والزميرى وبحيرة رودلف . فافترض أنه لا بد أن كان هنالك اتصال حديث العهد بين كل هذه الأحواض المختلفة ، التي ليس بينها الآن أى اتصال ، اللهم إلا الاتصال القليل بين النيجر وبحيرة تشاد — ومثل هذا الاتصال كان بواسطة بحيرة كبرى ، أو سلسلة بحيرات كبرى ، متصلة بعضها ببعض ، وأن بحيرة تشاد هى البقية الباقية من بحيرة عظيمة كانت تعم هذه المنطقة ^(١) .

وقد حاول كثير من الكتاب اعتماداً على قوة هذه الحجة أن يجعلوا للنيل مجرى قديماً غير مجراه الحالى . وقد سبق لنا أن وصفنا حوض الغزال كما صورته تيودور آرت . ولكن ما وصفه آرت مقبول جداً بالنسبة لما رآه الكاتبان الإنكليزيان هولمز واستيجاند ^(٢) . هذان الكاتبان نظراً إلى مسألة تطور النيل من وجهتين :

- (١) أولاً : إن النيل فى إقليم نمولى — غندكرو حديث العهد جداً فإين كانت تذهب مياه البحيرات قبل وجود هذا الخناق الذى تنصرف منه مياه النيل ؟
- (٢) ثانياً : إن أسماك النيل مشابهة لأسماك بحيرة تشاد الخ ، فكيف كان الاتصال بينهما ؟ .

وإجابة على هاتين المسألتين معا رأى هذان الكاتبان أن النيل كان يجرى من غربى بحيرة ألبرت ثم ينحدر فى اتجاه شمالى بغرب ، جارياً بين وادى ودارفور حتى يصل إلى النهر المسمى بحر الغزال الذى يصب فى بحيرة تشاد . ومن بعد هذا كان النهر يجرى شمالاً فى واد اسمه الآن الوادى الفاضى . ثم بعد إقليم تبستى

(١) راجع مقالة Distribution of African Fresh water fishes فى مجلة Nature (١٩٠٥) ص ٤١٣ .

(٢) راجع مقالهما فى مجلة G. Journal مجلد ٤٨ ص ١٤٥ — ١٥٩ . ثم كتاب

. Equatoria المسمى Stigand

Tibesti ينحدر النهر شمالا بشرق إلى البحر الأبيض . وقد رأى أستيجاند أنه باقتراحه هذا قد فسر وجود ذلك الوادى الفاضى الذى حير وجوده السائحين والمستكشفين . والحقيقة أن الأودية الحالية — أو أودية بلا ماء كما يسميها الأعراب أحيانا ، سواء فى صحراء ليبيا ، أو فى الصحراء الكبرى — عددها كبير جدا وانتشارها كثير بحيث لو حاولنا أن نجد نهراً كبيراً كالنيل لـكى يجرى فى كل منها يوما ما لطلال بنا الأمر . وأغرب ما فى اقتراح هذين الكاتبين أن نهريهما هذا مستحيل وجوده فى أى عصر نظرا لاعتراض جبال تبستى فى طريقه بحيث لا يمكن أن يجتاز النهر هذه الجبال وليس فيها فجوة تسمح بمروره .

على أن موضوع اتصال النيل ببحيرة تشاد قد اهتمت له البعثة الفرنسية التى قادها الكولونيل تيلهو (١٩٠٢ — ١٩١٧) فى إقليم بحيرة تشاد وتبستى وأردى وإنيدى .

وقد رأت تلك البعثة أن الحاجز الجبلى المحيط تماما ببحيرة تشاد من الجهة الشمالية الشرقية وبعد أن اختبرت الإقليم بكل عناية وصلت إلى النتيجة الآتية : « إن حوض بحيرة تشاد يمثل فى وسط أفريقية حوضاً مغلقاً لم يكن له يوما ما أى اتصال بحوض النيل » (١) .

على أن جريان النيل يوما ما على هذا الشكل ليس بضرورى لتفسير التشابه بين أسمائه وأسماء بحيرة تشاد ونهر النيجر ، فاقترح أرلت الذى سبق لنا وصفه كاف لتفسير هذه الظاهرة . بل يكفى أيضا ما هو أقل من اقتراح أرلت . إذ يسهل تعليل ذلك التشابه بأن نذكر أن أنهار الأوبانجى والشارى ، والأوبانجى وبحر

(١) "The Basin of Lake Chad constitutes a closed basin, which has never been connected with the basin of the Nile."

راجع مقالة الكولونيل تيلهو Tilho فى مجلة G.J. سنة ١٩٢٠ .

الغزال ، ثم السوبات والأومو (بحيرة رودلف) كلها لا يفصل الواحد عن الآخر سوى مسافات هي في بعض الأماكن صغيرة جدا لدرجة أنه في زمن الفيضان ربما كان هنالك اتصال فعلي بين مياه النهرين . وقد ذكر هذا الدكتور بولنجر Boulenger في مقاله المذكور . ثم إن انتقال أحد الروافد من نهر إلى نهر آخر ظاهرة معروفة وكثيرة الحدوث . وقد يساعد جدا على حدوثها أن يكون هنالك حركات في القشرة الأرضية تسبب انتقال بعض الأنهار من مجموعة إلى مجموعة أخرى .

إذن فمن السهل تعليل تشابه أسماك تلك الأحواض من غير حاجة لأن نجعل للنيل مجرى في الصحراء الكبرى أو صحراء ليبيا . ولكن ليس من السهل تعليل مسألة « حيوانية » أخرى . وهي مسألة وجود حيوانات في نهر الأردن وأنهار فلسطين تشابه حيوانات الأقاليم الاستوائية ، وعلى الأخص وجود التمساح في بعض روافد الأنهار . وقد ذكر الأستاذ جريجورى أسماء عدة أنواع توجد في النيل الأعلى وفي أنهار فلسطين مع أنها كلها أو جلها قد انقرضت أو لم توجد في النيل الأدنى .

أن أول ما يتبادر إلى الذهن في تعليل تلك الظاهرة أن نفترض أن النيل الأدنى كان له اتصال ما بأنهار فلسطين ، إما بواسطة روافد من فلسطين تصب في النيل الأدنى في عصر قديم ، أو أن أحد مصبات النيل كان على مقربة من فلسطين أو غير هذا من الافتراضات . على أن الأستاذ جريجورى لم يرقه هذا التعليل ، والتمس وسيلة بها يتسنى للنيل الأعلى وأنهار فلسطين أن تكون ذات اتصال مباشر ، فافترض أنه قبل تكون البحر الأحمر — أي قبل أن تدخله مياه المحيط الهندي بانفتاح باب المندب — كان يجري من فلسطين نهر نحو الجنوب إلى خليج العقبة

فالبحر الأحمر ، وكان وادياً جافاً ، ثم ينحدر هذا النهر العظيم جنوباً حتى يصب في المحيط الهندي قريباً من موضع بلدة عدن الآن . وقبل بلوغ هذا النهر إلى المحيط كان يصب فيه عن اليمين رافد كبير ، مصدره الأول بحيرة (فكتوريا) والبحيرات الاستوائية ، ويشمل أيضاً نهر تركول وبحيرة رودلف ونهر أومو ثم نهر هواش وهكذا حتى يتصل بذلك النهر الكبير الذي سماه جريجورى بالنهر الارترى Erythrean River .

ثم جاءت حركات أرضية ، يصحبها تكون براكين مثل الغون ، وفي الوقت نفسه انشق الأخدود بين نمولى وغندكرو فمرت منه مياه البحيرات ، وتجزأ هذا الرافد إلى أجزاء منفصل بعضها عن بعض كما هي الحال الآن .

وهذا النهر وتلك الروافد مجرد افتراضات لتعليل تشابه حيوانات النيل الأعلى وأنهار فلسطين ، على أنها افتراضات بعيدة ، وقد ظهر أنها غير محتملة لأن نهر التركويل Turkweel قد ثبت أنه نهر حديث التكوين جدا وفيه كل مظاهر الحداثة . فيستبعد جدا أن يكون مجرى لذلك النهر الكبير في عصر سابق لعصر تكوين البحر الأحمر .

ولهذا يظهر أن الأسلم — على العموم — أن نفترض أن علاقة النيل بأنهار فلسطين — إن كانت هنالك علاقة — كانت عن طريق النيل الأدنى لا النيل الأعلى — وإن لم نكن واثقين من تفاصيل أو كيفية هذا الاتصال .

(٣)

تبدو لنا مسألة تطور النيل في شكل آخر حينما ننظر إليها كوسيلة لتعليل ظاهرات النهر الغربية الشاذة التي يختلف بها عن سائر الأنهار . فالنيل ليس نهراً عادياً أو نهراً يتخذ مثلاً typical ، كما يتخذ الرون مثلاً أو الدجلة أو الأمازون أمثلة

للأنهار وظاهراتها العامة ، وقد ألفنا أن نقسم كل نهر عادة إلى ثلاثة أجزاء كل جزء مندمج بالتدريج في الجزء الذي يليه ؛ فالجزء الأعلى يكون كثير الشلالات والجنادل والخوانق ، والنهر فيه كثير النحت والتحطيم والحفر والنقل . والجزء الأوسط يكون فيه النهر أكثر اتساعاً وجنادله وشلالاته قليلة جداً أو منعدمة تماماً ، وانحداره متوسط ؛ وفي الجزء الأدنى يكون النهر بطيء الجريان متسعا كثير الالتواء ينساب وسط سهل منخفض مكون من رواسب النهر نفسه . والنيل خارج تماماً على هذا النظام غير خاضع له في أى جزء من مجراه اللهم إلا فيما بين أسوان والبحر . وقد رأينا في الفصول الأولى من هذا الكتاب من الشواهد على صحة هذه الدعوى ما لا يجعل هناك داعياً إلى العودة إلى هذا الموضوع أو ضرب أمثلة تشرح هذه الحقيقة . فالنيل من منابعه الاستوائية إلى أسوان يبدو عليه مظاهر النضوج والشيخوخة في بعض أجزائه ومظاهر الشباب والفتوة في أجزاء أخرى ؛ وهذه الظواهر ليست دائماً حيث ينتظر وجودها ، بل هي موجودة على غير نظام خاص . فالجرى الناضج يتلو الأخدود الحديث ثم يتلو هذا واد في حالة شيخوخة وهرم ، يعقبه سيل جارف لا بد أن يكون حديث التكوين جداً . فالبحث في تطور نهر النيل يصبح ذا أهمية جغرافية كبرى إذا نظرنا إليه كوسيلة لتعليل هذه الظواهر ، ولماذا شذ نهر النيل هذا الشذوذ . يظهر أنه لا بد لنا من أن نقرر أن النيل لم تكن نشأته وتطوره كنهر واحد من مجراه إلى مصبه — فتكون أجزاؤه المختلفة ذات علاقة مطابقة للمألوف — بل إن أجزاء منه تكون كل منها على حدة ، وكل منها مستقل عن الأجزاء الأخرى ، إلى أن حدثت أمور أدت إلى اتصالها فكونت نهراً واحداً . فالأجزاء الحديثة التكوين في نهر النيل هي التي أوصلت المسيلات القديمة بعضها ببعض ، وهذه كانت بالطبع تامة النضوج قبل أن تتصل وتكون حوضاً واحداً . إذن فأجزاء النيل التي تكثر فيها الجنادل والخوانق والشلالات هي الحلقات

الحديثة التكوين التي وصلت بين الأحواض القديمة ذات الأنهار الناضجة الحالية من الجنادل ومن الخوانق . وهذه الأحواض كانت أحيانا عبارة عن أحواض مستقلة « مغلقة » . وهذه الأحواض المستقلة كان أكثرها يتكون من بحيرة هي منه بمثابة المركز وتنصب فيها الروافد . فكل من بحيرة فكتوريا وكيوجا والبرت وإدورد والبحيرة الكبرى التي كانت تحتل حوض الغزال هذه كلها كانت أحواضاً مستقلة بعضها عن بعض إلى أن وصلت بينها الحركات التكتونية ، من جهة ، والتعرية النهرية من جهة أخرى .

والآن فلنبسط الأسباب التي تدعونا إلى القول بهذا الرأي :

بحيرة فكتوريا كانت يوماً ما حوضاً مستقلاً لأن فجوة شلالات ريبيون حديثة التكوين ولأن مستوى هذه البحيرة كان يوماً ما أعلى من مستواها الحالي . وقد بحث فيلـكس أوزوالـد هذا الموضوع وقرر أن بحيرة فكتوريا كانت في عصر الميوسين أكبر حجماً مما هي اليوم وأن هذه الحال قد دامت إلى البليوسين . وقد وجدت بقية سواحلها القديمة على ارتفاع ٣٠٠ قدم فوق سطحها الحالي في الجهة الشرقية والشمالية الشرقية للبحيرة^(١) .

وقد رأى غارستن أثناء رحلة في أعلى النيل أنه توجد في الجهة الغربية بقايا سواحل مرتفعة مثل التي اهتدى إليها أوزوالد^(٢) وقد وجد سكوت اليوت بقايا سواحل قديمة ارتفاعها ١٠٠ قدم فقط عن مستوى البحيرة^(٣) .

وغريب جداً أنه رغم وجود هذه السواحل القديمة العالية التي تدل على أن مياه البحيرة كانت أكثر مما هي اليوم ، ورغم أن هذا دليل واضح يجعلنا نرجح

(١) مقالة F. Oswald في مجلة Journal, E. African Nat. Hist. Soc. 1918 وكذلك في Q. J. G. S. ١٩٢٤ ص ١٢٨ و ١٨٨ .

(٢) كتابه عن أعلى النيل ، النسخة الإنكليزية ص ٣٢ — ٣٩ .

(٣) Scot Elliot في كتابه A Naturalist in Mid. Africa ص ٣٩ .

أن البحيرة لم يكن لها منفذ ، نرى كثيراً من الكتب قد حاولوا البحث عن مخارج شتى لبحيرة فكتوريا ، حين لم يكن لمياهها مخرج .

الأرجح إذن أن البحيرة كانت مستقلة « مغلقة » في عصر البليوسين ثم تكونت فتحة في شمالها ، حيث شلالات ريبيون الآن ، فاتصلت ببحيرة كيوجا ووجدت مياه فكتوريا مخرجا فنقص مستوى البحيرة ، وسواء أكان تكوين ذلك المخرج نتيجة انكسار « تكتوني » أحدث تلك الفجوة في شمال البحيرة أو نتيجة تعرية نهر فسكيوريا الذي استطاع بالنحت والخفر أن يصل إلى مستوى البحيرة أو كان نتيجة هذين العاملين معاً . فعلى كل حال إن بحيرة فكتوريا كانت حوضاً مغلقاً إلى أن اتصل ببحيرة كيوجا وأن مستواها انخفض لهذا السبب . ويظهر أن بحيرة فكتوريا انخفض مستواها على دفتين بدليل وجود رواسب ساحلية على ارتفاع ٣٠٠ قدم ثم على ارتفاع ١٠٠ قدم . فالانخفاض الأول كان نتيجة اتصالها ببحيرة كيوجا عن طريق فتحة ريبيون والانخفاض الثاني كان نتيجة اتصالها ببحيرة البرت بعد تكوين خواقي كاروما ومرتشيرون .

* * *

لننظر بعد هذا في اتصال بحيرة البرت ببحيرة إدورد . إن بحيرة إدورد تشبه فكتوريا في أن هنالك ما يثبت أن مستواها كان يوما ما أعلى مما هو اليوم .

وتوجد بقايا ساحلية على ارتفاع ٣٠٠ قدم وارتفاع ٣٠ قدما فوق سطح البحيرة الحالي .

إذن فهذه البحيرة أيضا قد انخفض مستواها على دفتين : الأولى عندما اتصلت ببحيرة البرت ، والثانية عندما انفصلت عن بحيرة كينو حين حالت بينهما براكين ويرنجا .

أما أن كينو وإدورد كانتا متصلتين فأمر يسلم به كل من كتب في هذا

الموصوع^(١) . وأما أن البرت وإدورد كانتا منفصلتين ثم اتصلتا فيقوم بصحة هذا دليل آخر غير الانخفاض في مستوى البحيرة . وهذا الدليل هو نهر السمليكى نفسه وخصائص مجراه .

يخرج السمليكى من بحيرة إدورد نهراً واسعاً ناعجاً بطيء الجريان . وينتهى إلى بحيرة البرت نهراً واسعاً بطيء الجريان تام النضوج . ولكنه في مجراه الأوسط نهر ضيق الجرى (٤٠ متراً) شديد الانحدار كثير الجنادل ، أو بعبارة أخرى نهر حديث فتى سبيل . فلا مفر والحال هذه من أن نحكم بأن هذا الجزء الأوسط حديث جداً وأن تكوينه هو الذى أدى إلى اتصال السمليكى الأعلى والأدنى واتصال البحيرتين إدورد والبرت . ولقد جاء فى كتاب غارستن عن أعلى النيل فى وصف بحيرة إدورد والسمليكى العبارة الآتية :

« إن سبب انخفاض مستوى البحيرة (أى بحيرة إدورد) أمر يصعب فهمه ، ولكن يظهر أنه مما لا شك فيه أن الجرى إلى شمال البحيرة كان يوماً ما منسداً والماء محجوزاً »^(٢) .

وإزالة هذا الحاجز كانت بأحد أمرين إما بواسطة انكسارات أو بواسطة حفر ونحت كل من النهرين — السمليكى الأعلى والأدنى — إلى أن تم اتصالهما ، أو باتحاد هذين العاملين معاً .

هكذا وصلت إلى بحيرة البرت مياه فكتوريا وكيوجا من جهة ومياه إدورد وجورج من جهة أخرى ، وكان مستوى البرت فى ذلك الوقت من غير شك مرتفعاً أكثر مما هو اليوم . وبقى كذلك إلى أن جان الحيف وتكون ذلك الخانق الأكبر ، بأن تصدعت جبال لا توكا فيما بين نمولى وغندكرو . من قبل

(١) راجع كتاب E. J. Moore المسمى (1901) To the Mountains of the Moon

ص ٢٢٢ وبعبارة .

(٢) الطبعة الإنكليزية ص ٩ .

ذلك كانت مياه البحيرات محبوسة وكان النهر فيما بين البرت ونمولى أحد أمرين : إما رافداً واسعاً ينحدر ببطء إلى البحيرة أى عكس اتجاه جريانه الآن ، وإما أنه كان عبارة عن ذراع ممدود لبحيرة البرت نحو الشمال الشرقى ، وتياره — إن كان له تيار — كان نحو البحيرة ؛ أى عكس الاتجاه الحالى . وقد يؤيد هذا رأى أن هنالك بعض الروافد فى شمالى بحيرة البرت مثل نهر أنشوا وأومى (Achwa and Ome) يجرى إلى الآن من الشمال الشرقى إلى الجنوب الغربى ، أى بعكس اتجاه النهر الأصلي فى الوقت الحاضر ، مما يدل على أن انحدار الأرض هو نحو بحيرة ألبرت . وعلى كل حال يظهر أن احتباس مياه بحيرة ألبرت لم يدم طويلاً ، لأن أخدود نمولى غندكرو ، مهما كان حديث العهد ، لا يمكن أن يكون أحدث بكثير من أخدود كروما وشلالات مرتشيزون . إذن فمن المرجح أنه بعد اتصال البحيرات الاستوائية بعضها ببعض تكون ذلك الأخدود ، فوجد مخرج تنفذ منه هذه المياه المختزنة ، وتسنى لها أن تنصل بمحوض بحر الجبل والغزال .

هذه البحيرات كلها بحيرات لا شك فى وجودها ، لأنها لا تزال باقية إلى اليوم ، ولكن هنالك بحيرة أخرى ليس لها وجود اليوم وإنما يُستدل عليها بآثارها ، وهذه الآثار نفسها موضع للشك وللقال والقيـل ؛ ألا وهى تلك البحيرة الجنوبية التى كانت تحتل منخفض الغزال على الأقل ، ومساحة أخرى إلى الشمال حسب أحدث الآراء . سلم بوجود هذه البحيرة كثير من الكتاب ، ولكن ليونز رفض التسليم بوجودها ؛ وكذلك جراهام نفى وجودها ، محتجاً بأن التربة الواسعة الانتشار ، ذات اللون الأغبر ، ذات الذرات الصلصالية الدقيقة ، ليست فى نظره مما ترسبه البحيرات ، لأنها يعوزها النظام الطباقى . وهو يرجع التربة المنتشرة فى جنوب ووسط السودان إلى الإرسابات الهوائية^(١) فى ظروف مناخية تختلف عن الظروف السائدة اليوم .

(١) يراجع رأى جراهام فى كتاب The Anglo-Egyptian Suddan from within

الذى أشرف عليه Hamilton .

إن طبيعة التربة الصلصالية الدقيقة تجعلنا نستبعد أن تكون إرساباً هوائياً ،
ولذلك فإن احتمال تكونها في قاع ماء راكد أمر لا ينبغي أن يستبعد بكل هذه
السهولة . وخصوصاً إذا كان نظام تطور النهر يؤيد وجود مثل هذه البحيرة .
وقد كان الكتاب القدماء يرون أن هذه البحيرة لاتعدو في حدودها منخفض
بحر الغزال كما نعرفه الآن ، وكما سبق لنا وصفه . ولذلك أطلقوا عليها اسم « بحيرة
السد » ، وكان ويلسكوكس يرى أن هذه البحيرة كانت تتسلم مياه الجبل والغزال
والسوبات . وفوق كل ذلك كان النيل الأزرق نفسه ، بعد أن يصل إلى مكان
الخرطوم يدور نحو الجنوب ، ويمر في مجرى النيل الأبيض الحالى حتى يصب
في تلك البحيرة . ولم يجد المستر ويلسكوكس حرجاً في أن يسلك النيل الأزرق
هذا المسلك المعوج لكي يوصله إلى بحيرة السد .

وقد تغلب جون بول^(١) على هذه الصعوبة بأن جعل امتداد بحيرة السد إلى
شمال الخرطوم ، وبذلك جعل النيل الأزرق يصب فيها . ولعل وصفه لهذه
البحيرة هو خير وصف لدينا الآن ، وهو يرى أنها كانت تمتد في حدود خط
الارتفاع (كنتور) ٤٠٠ متر فوق سطح البحر ، وكان امتدادها من شامى جنوباً
إلى حيث يوجد خانق سبلوقة اليوم في الشمال (شكل ٣٠) . وبذلك يكون
أكبر طول لها ١٠٥٠ كيلومتراً ، وأكبر عرض لها ٥٣٠ كيلومتراً ، ومساحتها نحو
٢٣٠.٠٠٠ كيلومتراً مربعاً . والشكل الذى رسمه المؤلف لهذه البحيرة هو بالطبع
تقريبى ، وكذلك هذه الأبعاد والمساحات تقريبية ، بل افتراضية في كثير
من المواضع .

ويرى المؤلف أن بحيرة السد كانت بحيرة مغلقة ، وأن مساحتها العظيمة
كفيلة بأن تبخر منها جميع الأمطار التى تتساقط عليها ، ومياه الأنهار التى تنصب
إليها في كل عام . ولذلك كانت مياه النيل كلها محتبسة وراء خانق سبلوقة من جهة

(١) في كتاب دراسات في جغرافية مصر السابق الإشارة إليه ابتداء من صفحة (٧٥)



(شكل ٣٠) بحيرة السد كما صورها جون بول .

(١) مراجع رأى جبراهام في كتاب *The Anglo-Egyptian Suddan* from within

(٥٧) فيسند منون والتميزي في كتابه *البحيرة السد* في السودان

الجنوب ، وذلك فيما عدا مياه العطبرة ، التي كانت في نظر المؤلف المورد الجنوبي الوحيد لنهر النيل . وصور المؤلف زوال بحيرة السد ، بأن امتلاء البحيرة بالرواسب رفع من سطحها ففاضت نحو الشمال من فوق خانق سبلوقة ، وأن ضغط مياهها قد زعزع من جوانب الصخور ، وأن من الجائز أن أحد الروافد التي تصب في العطبرة ، قد استطاع نحت جدار الخانق ، وبذلك انسابت مياه البحيرة . وتكون خانق سبلوقة الذي سبق لنا وصفه .

هذه صورة بحيرة السد كما وصفها المرحوم الدكتور جون بول ، ولم يحاول أن يقطع بأن هذا الوصف يمثل حقيقة لا يتطرق إليها الشك ، ولكنه افترض لتطور النيل في هذا الإقليم . وهناك بحوث عديدة لا بد من إجرائها لتحقيق تلك النظرية ، وإثبات وجود تلك البحيرة بما لا يحتمل أقل شك .

على أن هذه هي أكمل صورة لدينا عن بحيرة السد ، وليس في وصفه هذا ما يجعل من الحتم أن تلك البحيرة كانت بحيرة مغلقة ، بل من الجائز أن كانت تتسرب منها المياه إلى الشمال ، وبذلك تزداد موارد نهر النيل ، دون أن يصل إلى مصر من تربة الحبشة شيء اللهم إلا ما قد حمله العطبرة ، فيصل إلى مصر مخلوطا بتربة بلاد النوبة ، ومن هذا الخليط تألفت التربة السفلى لوادي النيل . ودامت هذه الحال زمناً طويلاً ، حتى تفجرت الصخور التي تحيط بسبلوقة ، وقاضت المياه المحتبسة .

ويرى جون بول أن خانق سبلوقة قد تكون بالتعرية « من غير شك » وهذا القول لا يتمشى مع الحقائق الأخرى التي سردها . فإن كل الأدلة تشير إلى أن المياه المحتبسة وصلت إلى القطر المصري فجأة . وظل النيل يفيض زمناً طويلاً في بلاد النوبة وجنوب القطر المصري فيضانا عالياً جداً يحمل مقادير عظيمة من الغرين . وهذا التفجر المفجائي لا يتفق مع افتراض أن التعرية وحدها هي التي

فتحت الطريق لخروج هذه المياه المحتبسة ، بل لابد أن عجل بذلك تصدع في الصخور المعترضة في منطقة سبلوقة .

وصفوة القول فيما يتعلق بتطور النيل ، أن البحث في هذا الموضوع قد تكشف عن بعض الحقائق وبعض الافتراضات ، نلخصها فيما يلي :

(١) إن نهر النيل الشمالى نهر قديم يرجع على الأقل إلى أواسط عصر البليوسين ، والأرجح أنه كان — حتى في ذلك الزمن القديم — نهرا غزير المياه واسع المجرى .

(٢) كانت الصلة بين هذا النيل الشمالى وبين المياه الجنوبية ، بما في ذلك النيل الأزرق ، قليلة أو مقطوعة إلى درجة ما ودامت هذه الحال فترة من الزمن في عصر البليستوسين .

(٣) يرجح كثير من الكتاب أن العطبرة كان يمد النيل بالماء في ذلك العصر ، وأنه كان المنبع الحبشى الوحيد للنيل القديم . ومن الجائز أيضاً أن بحيرة السد — على فرض وجودها — كان يفيض منها مقدار من الماء يجرى إلى الشمال ^(١) .

(٤) أما الاتصال الكامل بين المياه الجنوبية والشمالية فلم يحدث إلا في عصر متأخر ، ولكن الزعم بأن هذا الاتصال يرجع فقط إلى ١٢٠٠٠ عام لا يزال مفتقراً إلى أدلة أقوى مما لدينا .

(٥) إن مناخ العصر المطير ، بمطره الغزير ، كان عاملاً في حوض النيل كله ، جنوبية وشمالية . والزعم بأن هضبة الحبشة كانت إقليمياً قليل المطر ، لا أساس له من الصحة .


(٦) يرى بعض الكتاب أن مياه هضبة الحبشة — كلها أو جلها — كانت على وفرتها تنصرف شرقاً إلى البحر الأحمر ، إلى أن ارتفعت الحافة الشرقية

(١) ازداد أخيراً عدد المعترضين على وجود بحيرة السد ، وانضم إليهم طائفة الباحثين عن الآثار القديمة للإنسان . فقد رأى بعضهم أدوات حجرية في جهات كان المفروض فيها أن تكون مغمورة بمياه تلك البحيرة . (راجع مقالة أركل صفحة ١٠) في الفصل الثانى من كتاب .

للهضبة فتغير اتجاهها . وهو رأى لا يعدو مرتبة الافتراض . إن الدنيا قال بالهضبة
(٧) إن اتصال مياه البحيرات الاستوائية بعضها ببعض حديث ، وكذلك
اتصالها جميعا ببحر الجبل . وقبل ذلك كان كل منها مستقلا عن الأخرى .

نظور الدلتا :

لم تكن دلتا النيل على حال واحدة في سائر العصور . وهى على كل حال



(شكل ٣١) خريطة الدلتا مبينا بها خطوط الارتفاع

قديمة العهد وكانت صالحة للسكنى والعمران لا في العصور التاريخية فقط
بل وقبل التاريخ بألاف السنين . فليس بصحيح إذن ما يزعم بعض الكتاب
من أن الدلتا في العصر الفرعوني كانت عبارة عن مستنقعات لا تصلح للعمران
وأن الحضارة إنما نشأت في صعيد مصر ثم انتقلت إلى الدلتا ... حقيقة لقد كان
زمان لم يتكون فيه الدلتا تمام التكوين . وكان الحوض الأدنى للنيل مشتملا
على كثير من الغدران والمستنقعات . ولكن قد كان هذا في زمن قديم جداً من
قبل أن يأخذ الإنسان بأسباب الحضارة والعمران .
كانت الدلتا ، حتى تمام تكوينها ، في تطور وتغير بطيء ولكنه مستمر .

والأخبار التي لدينا عن الجغرافيين القدماء أمثال اصطرابون و بطليموس تدل على أن أفرع الدلتا في ذلك العهد كانت غير ما نعرفه الآن . فقد ذكر اصطرابون ما لا يقل عن سبعة مصبات مختلفة (شكل ٣٢) وذكر أسماءها وهي من الشرق إلى الغرب :

(١) البيلوزى Pelusiatic نسبة إلى بلدة بيلزيوم (الفرما) : ومجره قد يكون مطابقاً قليلاً لبعض مجرى ترعة الشرقاوية وأبى الأخضر وفاقوس .

(٢) التنيسى Tanitic نسبة إلى بلدة تنيس التي كانت فيما مضى بلدة عامرة في الطرف الشرقى لبحيرة المنزلة . وبعض هذا المصب مطابق لبعض مجرى بحر مويس .

(٣) المنديزى Mendesian : ولعل المجرى الأدنى للبحر الصغير مطابق لجزء من مجرى هذا الفرع .

(٤) المصب المسمى Phatemic : وهو مطابق لمصب دمياط .

(٥) المصب السبنتى Sebennetic : (نسبة إلى البلدة التي ندعوها اليوم سمبود) : ولعل مجراه كمجرى بحر تيره .

(٦) المصب المسمى بلبى Bolbitic : وهو مطابق لمصب رشيد .

(٧) المصب الكانوبى Canopic : وقد يكون بعض مجراه قريباً لجزء من مجرى بحر دياب .

تلك هي المصبات القديمة كما ذكرها اصطرابون . وقد زاد عليها بطليموس فرعاً آخر فيما بين دمياط والبرلس .

وقد تغيرت الحال بعد ذلك فزال الكثير من تلك المصبات ؛ وكانت الحال في عصر العرب وما بعده غير ما كانت عليه في عصر البطالسة . فقد زالت المصبات الشرقية كلها أوجها . ويعلاون هذا الزوال بحركات في القشرة الأرضية سببت ارتفاعاً قليلاً في شرق القطر المصرى ؛ ولهذا السبب نفسه يعزى صغر حجم فرع



(شكل ٣٤) خريطة الدلتا مبينا فيها المصببات القديمة ذكرها اصطرابون

دمياط بالنسبة لفرع رشيد . ولقد رأينا من قبل أن هنالك أقوالاً أخرى تشير بأن الأراضي الواقعة شرق النيل سواء في مصر أو بلاد النوبة قد ارتفعت قليلاً ، وأن هذا الارتفاع هو عامل مهم في إعطاء مجرى النيل في بلاد النوبة شكله المعروف وهو أيضاً السبب أو بعض السبب في تحويل مجرى النيل عند الشلال الأول والثاني على أن ارتفاع القشرة الأرضية بهذا الشكل — إذا صح — فليس هو الظاهرة الوحيدة بل لا بد أن قد تلاه رد فعل ، فانخفض جزء من الأرض في الشمال الشرقي لمصر ، كانهبوط قاع بحيرة المنزلة وسواحلها ؛ مما أدى إلى اتساع مساحتها وزوال بلاد عامرة مثل بلدة تقيس . وقد يكون هذا راجعاً إلى ارتفاع يسير في سطح البحر ، ويرى كثير من الكتاب أن هذا الارتفاع كان عاماً ، بحيث تأثرت به سواحل البحر المتوسط كلها ، وهذه ظاهرة مستقلة عن الارتفاع اليسير في الجانب الشرقي من الدلتا ، الذي كان من آثاره تضائل المصببات الشرقية ، واتساع مصب رشيد .

ومن الجائز ألا يكون تفوق فرع رشيد في الحجم راجعاً إلى أي ارتفاع

في الجانب الشرقى من الدلتا ، بل لأنه أقصر نوعاً من فرع دمياط ، بل لعله أقصر الفروع جميعاً ، حتى القديمة منها ، ولذلك كان انحداره أسرع .

وليس من السهل أن نرسم صورة كاملة لتطور جغرافية الدلتا ، على مدى العصور ، لأن الفروع العديدة ، ذات الجريان البطيء ، لا بد أن كانت تطراً عليها تغيرات مختلفة من آن لآن . والذي يدرس خريطة الترع المصرية في الوقت الحاضر يرى أن كثيراً منها كثير الالتواء والانحناء ، مما يدل على أنه في الأصل مجرى قديم لأحد الفروع العديدة ، التي ليس من السهل الآن تتبع تاريخها وتحقيق أطوارها .

* * *

تطور بحر يوسف :

من المفيد أن نذكر تاريخ بحر يوسف على حدة ، لأن ظروف تكوينه وتطوره من طراز خاص لا يشبه ما ذكرناه عن تطور الأجزاء الأخرى من نهر النيل . ولقد ألفنا أن نرى بحر يوسف يحتل مكانه الحالي ، ويجرى في مجراه الملتوى حتى ينتهى إلى منخفض الفيوم . واعتدنا وجوده على هذه الصورة ، حتى أصبحنا لا نرى في ذلك وجها للاستغراب ، أو أمراً يتطلب التفسير والتأويل . ومع هذا فإن قليلاً من التفكير لا بد أن يحملنا على أن نتبين أن بحر يوسف يمثل ظاهرة شاذة في جغرافية السهل الرسوبي للنيل ، ويوشك ألا يكون لها نظير في جغرافية أى نهر آخر . ولذلك ليس من العبث أن نحاول إيضاحها .

ليس بحر يوسف فرعاً من فروع النيل بالمعنى المألوف ، فإنه يخرج من النيل في منطقة تبعد عن القاهرة بنحو ٤٠٠ كيلو متر ، وتبعد أكثر من ذلك عن نقطة تفرع النيل الحقيقية شمال القاهرة ، حيث ينقسم النهر إلى الأفرع المختلفة التي تتألف منها الدلتا ، فليس هنالك ما يدعو لأن تبدأ ظاهرة التفرع بالقرب من

ديروط أو منفلوط ، ثم تختفي بعد ذلك تماماً ؛ حتى تظهر في صورتها المعروفة شمالى القاهرة . وحالة الجرى ما بين منفلوط وديروط لا شكاد تختلف عن حالته إلى الشمال والجنوب من هذين الموضعين . فلماذا يتعجل بحر يوسف فيخرج من النهر قبل إقليم التفرع الحقيقى بنحو أربعمائة كيلو متر ؟ .

وفى وصفنا لبحر يوسف بأنه فرع للنيل شئ من الغلو ، خصوصاً إذا قارنا بينه وبين الفروع المعروفة للدلتا . فما هو فى الحقيقة إلا مجرى ضئيل ، ولا وجه للمقارنة بينه وبين فروع الدلتا المعروفة . فما الذى يدعو إلى خروج جزء يسير من ماء النهر سالكاً طريقه الخاصة التى تصل به إلى منخفض الفيوم ؟ .

وهذه الطريق الخاصة التى يسلكها بحر يوسف طريق شاذة ، فإننا نراه لا يلبث — إذ يخرج من النهر — أن يبتعد عنه ، ملتزماً الجانب الغربى من الوادى ، بينما النهر نفسه يلتزم الجانب الشرقى ، وعلى الرغم من ضيق الوادى فإن المسافة بينهما تبلغ فى كثير من الجهات بضعة عشر كيلو متراً .

ليس فى انحدار نهر النيل فى مديرية أسيوط ما يبرر خروج جزء من ماء النهر ليكون فرعاً أو مجرى مستقلاً ، ولو كان هنالك ضعف فى الجسور أو بطء شديد فى الجريان دعا إلى هذا التفرع ، لكان الفرع أكبر وأظهر مما نراه عليه الآن .

إن وجه الصواب فى شرح هذه الظاهرة وتعليلها أن نصل بينها وبين منخفض الفيوم ، فتكوين هذا المنخفض كان هو الباعث الأكبر على تكوين بحر يوسف وهو الذى جعل مجراه يتخذ فى النهاية الصورة التى نراه عليها فى الوقت الحاضر . وقد عالج الباحثون موضوع منخفض الفيوم معالجة واسعة دقيقة ، ولكن لم يظفر بحر يوسف من هذه الأبحاث إلا بإشارات مبعثرة غير وافية بالغرض .

وقد تكون منخفض الفيوم في الجزء الأول من الزمن الرابع ، في أثناء فترة جفاف اشيدت فيها التعرية الهوائية ، حتى حفرت المنخفض تماماً ، وظل محفوراً فترة من الزمن قبل أن تصل إليه المياه .

ثم أخذت مياه النيل في العصر الحجري القديم الأول ، تصل إلى المنخفض حتى امتلاً وتكونت فيه بحيرة ارتفاعها يبلغ الأربعين متراً فوق سطح البحر في ذلك الوقت . وكان مستوى النهر نفسه في مثل هذا الارتفاع أو أعلا منه .

في ذلك العصر كان بين وادى النيل وبين البحيرة اتصال مباشر ، فإذا ارتفع ماء النهر كان التيار نحو البحيرة ، وإذا انخفض النهر كان التيار آتياً من البحيرة نحو النهر . في ذلك العصر المتقدم لم ينشأ بحر يوسف ولم يكن في الظروف الجغرافية ما يبعث على تكوينه .

ولكن جاءت بعد ذلك عصور أخرى ، وطرات على البحيرة أطوار وأحوال تختلف عما كانت عليه في ذلك الطور الأول . وفي بعض هذه العصور انقطعت الصلة المباشرة بين النيل وبين المنخفض ، وذلك بسبب هبوط مستوى النيل نفسه ، فانقطع عن المنخفض ذلك المورد العظيم من المياه . فلم يرد إلى المنخفض منه ما يعوض الفاقد بالتبخر .

غير أن هبوط مستوى البحيرة وسط منخفض الفيوم قد خلق حالة تضاريسية جديدة ، وإذا وجد قليل من الماء حول البحيرة ، فإنه لا يلبث أن يحفر وادياً ينصب بانحدار شديد نحو البحيرة . ومن الجائز لمثل هذا الوادى أن يتكون نتيجة السيول والأمطار ، ولكنه بعد تكوينه يغدو جديراً بأن يعمق مجراه حتى يجتذب مقداراً من الماء المتخلف من الفيضان في وادى النيل .

هذه الحالة كانت سائدة منذ أول العصر الفرعونى ، وإلى هذا العصر يرجع على الأرجح تكوين بحر يوسف . كان النيل يفيض في كل عام ، والأراضى

تروى على طريقة الحياض ؛ أى تغمر بالماء تماماً . غير أن الغرين كان يغطى
الوادي بمقادير متفاوتة ، فكما ابتعدنا عن مجرى النيل غربا وجدنا مقدار
الرواسب أقل فأقل . ولذلك كان الجانب الغربى من الوادى أكثر انخفاضا عن
سائرته ، وبذلك يتخلف فيه مياه الفيضان ، بعد أن تكون قد صرفت عن
الأراضي الأخرى .

هذه المياه المتخلفة فى الجانب الغربى من مياه النيل لم تكن تكون مجرى
متصلا ، بل أقاليم مستنقعية ، منفصلة أحيانا ، متصلة أحيانا .

ومن السهل أن نتصور أن أحد الأودية التى تنحدر إلى منخفض الفيوم
وبركتها ، استطاع أن يعمق مجراه حتى بلغ بعض هذه المستنقعات ، فأنحدرت
مياهاها إليه ، ثم لم تلبث التى تليها من جهة الجنوب أن انضمت إليها ، وهكذا
تكون مجرى نهري ينحدر نحو منخفض الفيوم ، وكان تكوينه من الشمال إلى
الجنوب ، أى تكون الجزء الأسفل أولا ثم الذى يليه جنوبا وهكذا . هذا المجرى
النهرى هو بحر يوسف . وكان يطغى عليه الفيضان فى عهده الأول فيخفي معالمه
تقريبا ، ثم لا يلبث أن يظهر كمجرى واضح بعد هبوط مياه الفيضان . وعلى
مضى الزمن استطاع أن يكون لنفسه جسورا تحفظ ماءه من التسرب وتمكنه
من أن يحتفظ بكيانه مهما علا الفيضان .

بقيت مسألة لا بد لنا أن نواجهها ؛ وهى إذا كانت هذه سيرة بحر يوسف ،
وأن مجراه يتبع خط المنخفضات الغربية التى تمتد فى الوادى من الشمال للجنوب ،
فيحق لنا أن نتساءل لماذا يبدأ هذا النهر إلى الشمال من منفلوط ، وكان من
الجاز أن يمتد إلى أبعد من هذا جنوبا ؟

الرد على هذه المسألة يسهل علينا إذا تأملنا خريطة وادى النيل . ورأينا
أن النهر الذى يلزم الجانب الشرقى من الوادى فى كل مكان تقريبا ، يقترب فى

مكان واحد من الحافة الغربية ٠٠٠ في مكان واحد فقط في كل المسافة بين نجع حمادى والقاهرة يقترب النهر من الحافة الغربية للوادى ، فيسهل للفرع اليوسفى المتدفق إلى الشمال أن يحفر مجرى يوصله إلى النهر .

هذا الموضع الذى يقترب فيه النهر من الحافة الغربية هو إلى الشمال من مدينة أسيوط ، وهذا على الأرجح المكان الذى اتصل به بحر يوسف بالنيل أول مرة ؛ ولا يزال هنالك مجرى طبيعى يمتد شمال أسيوط غرب الوادى ويستخدم هذا المجرى ليكون الطرف الشمالى لترعة السوهاجية .

أما السبب فى أن بحر يوسف لا يخرج من النيل اليوم فى ذلك الموقع شمال أسيوط الذى يحق لنا أن نتوقع أن يبدأ منه ، فأمر لا نستطيع أن نقطع فيه برأى ؛ ولكننا نعلم أن القدماء كانوا يشكون من أن بحر يوسف لا يحمل الماء اللازم لرى أراضي الفيوم . فهل كان من الوسائل التى لجأوا إليها لعلاج هذه المشكلة أن حفروا له مخرجا بالقرب من ديروط ، بعد أن اختنق المخرج الأول بالرواسب ؟ هذا أمر قريب الاحتمال ، وإذا تأملنا مجرى بحر يوسف ، وجدناه نهراً شديداً التعرج ، أكثر التواء حتى من النيل نفسه ، ما عدا فى جزء واحد من مجراه وهو الجزء الذى يخرج فيه من النيل فيما مضى ، أو من ترعة الإبراهيمية كما يفعل الآن . فالمجرى فى مسافة تبلغ ثمانية كيلومترات يرينا خطاً مستقيماً ، يبعد جداً أن يكون مجرى طبيعياً .

الراجح إذن أن الجزء الأول من بحر يوسف ، وهو الذى يصله بالنيل ، هو الجزء الوحيد الذى صنفته يد الإنسان سواء أ كان هذا الإنسان يوسف بن يعقوب ، أو أحد ملوك الأسرة الثانية عشرة أو غيرها .

على أننا نعرف أن توفير المياه لمنخفض الفيوم كان أمراً يقلق بال الحكام حتى فى العهد العربى . فإن بحر يوسف سريع الجريان حين يدنو من منخفض

الفيوم ، ولكنه بطيء في سائر مجراه ، وعرضة لتراكم الرواسب ، والتواءاته الكثيرة تساعد على هذا .

ونجد في كتاب أبي عثمان النابلسي عن تاريخ الفيوم وصفاً لما يتعرض له من نقص الماء . وهو يسمى بحر يوسف (المُنْهَى) ، ويقول إنه كان يجف أربعة أشهر ويجري ثمانية ، ثم انعكست الآية فأصبح يجري أربعة ويجف ثمانية . وذلك لإهمال حفر أعلى النهر .

ثم يعود فيذكر لنا أن أحد ولاة الفيوم المتحمسين قد حاول أن يعالج مشكلة الماء ببعض الوسائل . ويقول النابلسي — ساخراً من هذا الوالى — إنه بحث عن أسباب عمارة الفيوم فقبل له نظف بحره ! فقطع ما على حافته من سنط وصفصاف ، وهو يظن أن ذلك يزيد في مائه . . فلم يؤثر .

ثم أشير عليه أن يزيد في ارتفاع البناء اليوسفي (يعنى قنطرة اللاهون) ليزيد ذلك في مقدار الماء ؛ ولكن هذا أيضاً لم يجد نفعا .

وأخيراً أشاروا على الوالى المذكور أن يذهب إلى رأس المنهى (أى أعلى بحر يوسف) ومعه العمال والمهندسون ، وأن يفتح للبحر فوهة تحت فوهته القديمة المتصلة بالنيل بما يناهز مائة قصبة^(١) .

وهذا الإجراء أيضاً لم يأت بفائدة لأسباب ذكرها الطرابلسي ... وإنما الذى يهمنا أن العهد العربى نفسه لم يخل من محاولات لفتح مخرج جديد لبحر يوسف ، ونظراً لدقة هذا المؤلف فى كل ما يرويه ، فإننا نستطيع أن نسلم بصحة ما رواه .

ولئن كان هذا هو النص الوحيد الذى فى متناولنا عن فتح مخرج لبحر يوسف بطريقة صناعية ، فإن هذه الرواية تدعونا لأن نرجح أن هذه لم تكن

(١) راجع كتاب الطرابلسي (طبع المطبعة الأهلية ١٨٩٨) صفحة ١٦ .

المحاولة الأولى من نوعها . وأن من المعلوم أن تكون فوهة بحر يوسف قد غيرت من عصر لآخر ، حتى أصبحت حيث هي اليوم .

وقد ذكر غير واحد من جغرافيي العرب بحر يوسف ، ووصفوه بما لاحظوه من غرابة في نظام جريانه ، فقال عنه القلقشندي إنه من غرائب أنهار الدنيا ، تجف فوهته في أيام نقص النيل ، وباقيه يجري . وقال ابن فضل الله العمري عنه « ومن العجب — وهو ما رأيته بعيني — أنه ينقطع ماؤه من فوهته ، أو أن انقطاع المياه من خلجان الديار المصرية ، ويندى دون فوهته ، ثم يكون له بلل دون المكان المندى ، ثم يجري جريانا ضعيفا دون مكان البلل ، ثم يستقل نهرا جاريا ، لا يقطع إلا بالسفن » (١) .

وهكذا نرى أن ما عجب له هذا الكاتب وغيره هو أن الماء يجري في بحر يوسف دون إمداد ظاهر من النيل . فيتجف أعاليه وتندى أسفله ، وهذه الحالة تحكي لنا صورة تطور النهر ، فقد يتكون أسفله قبل أن يتكون أعلاه . وقد أصبح إمداد بحر يوسف بالماء أكثر انتظاما بعد أن شيدت قناطر أسبوط ، ورفع مستوى النهر لتغذية ترعة الإبراهيمية وبحر يوسف .

(١) ضريح الأعشى ج ٣ ص ٣٠١ ومسالك الأبصار ص ٦٨ (طبع دار الكتب)

الفصل التاسع

٦٢

مناخ حوض النيل

مسألة الظاهرات المناخية لحوض نهر النيل ليست ذات أهمية علمية فقط ؛ فنتهم بتقريرها وتوضيحها من أجل البحث الجغرافى البحث ، بل هى مرتبطة كذلك بموضوع ذى أهمية كبرى ، وهو بالطبع موضوع مصدر مياه فيضان النيل : موضوع يهم المهندس والمزارع والاقتصادى . وعلى الأخص أنه إذا أمكن الوصول إلى نتيجة حاسمة فى تقرير مصدر فيضان النيل فقد يسهل هذا أمر التنبؤ بما سيكون عليه الفيضان قبل حلوله ولو بقليل من الزمن . إن مسألة مصدر مياه النيل شغلت المفكرين عهداً ليس بالقصير ؛ ففى العصور القديمة كان الاهتمام بالاهتداء إلى المنابع التى يصدر عنها النيل . واليوم — وقد أحطنا علماً بتلك المنابع — انصرف المفكرون إلى البحث عن المصدر الأول — المتيورولوجى — لمياه النيل : أهو رياح المحيط الأطلسى ، أم رياح المحيط الهندى ، أم كلاهما ، أم سواها ؟

وبعد ، فحوض النيل ، كما رأى القارئ ، أرض شاسعة مترامية الأطراف تحتل نحو خمس وثلاثين درجة من درجات العرض ما بين المنابع والمصببات . فمثل هذا البعد الكبير بين مبدأ النهر ومنتهاه يقضى ولا ريب بأن يكون هنالك اختلاف كبير بين مناخ حوض النيل الأعلى والأوسط والأدنى . وقل أن يوجد فى العالم نهر قد اختلفت أقاليمه المناخية كما هى الحال فى نهر النيل . فالأمازون مثلاً ، الذى يضارع النيل طولاً ويفوقه مساحة ، واقع كله تقريباً فى المنطقة الاستوائية . أما النيل فلو حاولنا أن نذكر بوجه الإجمال ضروب المناخ المختلفة الموزعة فى حوضه فإننا نذكر على الأقل خمسة أنواع : (١) مناخ استوائى ، وهو

مناخ المناخ الاستوائية إلى العرض الخامس شمال خط الاستواء . (٢) مناخ مدارى ، وهو يشمل أكثر حوض بحر الجبل والنيل الأبيض . (٣) مناخ موسى فى إقليم الحبشة الذى يتأثر برغم مصاقبته للمنطقة المدارية بأحوال جغرافية خاصة تجعل له مناخا ممتازا . (٤) مناخ صحراوى يشمل جزءا كبيرا من السودان ومصر . (٥) ثم مناخ البحر المتوسط ذى المطر الشتوى ، وهو قاصر على الدلتا ، وعلى الأخص حاقها الشمالية .

هذه المناطق كلها ليست ذات حدود دقيقة بحيث يمكن أن نرسم خطوطا تفصلها الواحدة عن الأخرى . بل إن كلا منها تقدر ببطء إلى التليها . ومن جهة أخرى فإنه من الممكن تقسيم كل من هذه المناطق الأولية إلى أخرى ثانوية بناء على الاختلافات الموضعية لـكل إقليم .

* * *

إن وادى النيل كله ، برغم تباعد أطرافه ، واتساع مداه من الجنوب إلى الشمال ، واقع إما فى المنطقة الحارة أو المدارية أو المعتدلة الدافئة . ولكى ندرك وجه الاختلاف الرئيسى بين تلك الأقاليم المناخية التى ذكرناها من قبل ، يجب أن نذكر أن العناصر المناخية الثلاثة : الحرارة ، والضغط (والرياح) ، والمطر ، ليست بذات أهمية واحدة فى مختلف الأقاليم . ففى الأقطار الاستوائية والمدارية بل والمعتدلة الدفينة ليست الحرارة هى الفارق الأعظم الذى يتميز به المناخ ؛ وكذلك الحال فى حوض النيل . فمتوسط الحرارة طول العام فى بلدة منجو Mengo بأوغنده شمال بحيرة فيكتوريا مباشرة : هو ٢١٫٩° (١) ومتوسط الحرارة طول العام فى دمياط ٢٠٫٢° . أى أنه فى المتوسط لا يكاد يكون هنالك فارق من حيث الحرارة ما بين

(١) درجات حرارة مذكورة هنا دائما بالقياس المئى . وأهم مرجع للإحصائيات المناخية لحوض النيل هو ما طبعت مصلحة الطبيعيات سنة ١٩٣٨ باسم : Climatological Normals وتوجد لإحصائيات أخرى هامة فى نشرة لوزارة الهواء بانكلترا اسمها : Reseau Mondial وكذلك فى كتاب هان : Hahn : Lehrb. d. Meteorologie

الإقليم الذى ينبع فيه النيل والإقليم الذى يصب فيه . حقيقة إن هنالك اختلافاً موسمياً فى دمياط من حيث الحرارة ؛ فالفرق ما بين الصيف والشتاء أكثر ظهوراً فيها منه فى منجمو ، ولكن هذا الاختلاف ليس كبيراً . (٦ ° تقريباً) وهنالك أقطار فى حوض النيل تزيد حرارتها فى المتوسط عن هذا . ولكننا يمكننا أن نقرر أن الحرارة فى حوض النيل كله مهما اختلفت من قطر إلى قطر فإنها ليست هى الفارق الأكبر والعامل المناخى الأول . وإنما أهم فارق يمتاز به إقليم عن آخر هو المطر . والمطر دائماً هو الفارق الأكبر فيما بين الأقاليم ذات المناخ الحار . سواء فى حوض النيل أو غيره . أما فى الأقطار الشمالية ، فإن الحرارة تصبح الفارق الأهم .

فى حوض النيل إذن يجب أن نعى بوجه خاص بتوزيع المطر كثرة وقلة وبنظام سقوطه فى أشهر السنة ، ونزول المطر مرتبط الارتباط كله بالرياح وهبوبها ، وهبوب الرياح مرتبط تماماً بحالة الضغط الجوى لا فى حوض النيل وحده بل وفى الأقطار المتاخمة له . إذن فلنتدبر هذا الأمر : حالة الضغط الجوى أولاً كتمهيد لفهم الظاهرات المناخية لحوض النيل .

فإذا نظرنا إلى خرائط توزيع الضغط الجوى^(١) فى جميع شهور السنة اتضح لنا أن حوض النيل لا بد أن يتأثر بتفاعل ثلاث ظاهرات مقيورولوجية هامة ، ليست كلها ذات قوة واحدة طول السنة بل إن أحدها قد يضعف فيتأثر وادى النيل بالعاملين الآخرين . وفى بعض الأحيان تتساوى هذه الظاهرات قوة وتأثيراً (كما قد يحدث فى أبريل وأكتوبر) فتكون حالة المناخ فى حوض النيل مزعزعة غير ثابتة ، وقد يكون أحد هذه العوامل ذا تأثير أكبر فى جزء من حوض النيل منه فى إقليم آخر . أما هذه الظاهرات الثلاث فهى :

أولاً : منطقة الضغط العالى فيما وراء مدار السرطان (وقد تدعى أحياناً منطقة الضغط العالى على جزر الأزور) .

(١) يحمل بالفارى أن يراجع الخرائط المنشورة فى كتاب مصلحة الطبيعيات المشار إليه .

ثانياً : منطقة الضغط المنخفض الاستوائية .

ثالثاً : حالة الضغط الجوى فوق القارة الآسيوية (وعلى الأخص نصفها الغربى الجنوبى) ويكون بالطبع عاليا شتاء منخفضاً صيفاً .

وقد نضيف إلى هذه العوامل ظاهرة رابعة وهى منطقة الضغط العالى فى جنوب المحيط الهندى والأطلسى . وهذه تأثيرها قاصر على النصف الجنوبى . لا على حوض النيل كله . ولهذا نذكرها على حدة .

والآن فلنتناول كلا من هذه الظاهرات الأربع بشئ من الإيضاح :

(١) فأما منطقة الضغط فيما وراء مدار السرطان التى كثيراً ما يكون مركزها قريباً من جزر (أزور) فى المحيط الأطلسى الشمالى حتى غلبت تسميتها باسم تلك الجزر . فإن تأثيرها فى حوض النيل هو أنها تسبب هبوب الرياح الشمالية التى نعرفها فى مصر خير معرفة والتى لها علينا أياذ معلومة . والمهم هنا أن نقرر مدى انتشار هذه الرياح فى حوض النيل : هل هى قاصرة على مصر وشمال السودان أم على حوض النيل كله ؟ وهل تأثيرها واحد فى طول السنة أم يختلف من فصل إلى آخر ؟

والحقيقة أن حوض النيل لا يخلو من تأثير هذه الظاهرة الجوىة ومن هبوب الرياح الشمالية فى أى شهر من شهور العام ولكن جميع حوض النيل لا يتأثر بها بدرجة واحدة ؛ فبلاد الصعيد كلها تقريباً إلى وادى حلفا تتأثر بهذه الرياح كل العام على وجه التقريب . وأما الأقطار الجنوبية لحوض النيل فيتأثر بها فى وقت الشتاء إذ تكون منطقة الضغط العالى قد انحدرت قليلاً إلى الجنوب وازدادت قرباً من مدار السرطان ، وأما فى فصل الصيف فيتراجع الضغط العالى إلى الشمال ويكون تأثيره فى هذه الحال قاصراً على القطر المصرى وعلى الطرف الشمالى من السودان . إذن فالرياح الشمالية قد تصل إلى أعلى النيل ولكن هذا لا يكون واضحاً إلا فى نوفمبر وديسمبر ويناير وفبراير . وفى هذه الأشهر يقل نفوذ هذه الرياح

في إقليم الدلتا حيث تتعرض مصر السفلى لتأثير ظواهر جوية أخرى . أما في أشهر الصيف فإن أعلى النيل لا تهب عليها رياح الشمال . ولا تتأثر بمنطقة ضغط الأزور ، لبعدها عن أواسط أفريقية في تلك المدة .

وإذا أردنا أن نتصور نسبة هبوب الرياح الشمالية في الأقاليم المختلفة لحوض النيل . فلعله مما يساعدنا أن نذكر بلداً نعتبره النهاية الكبرى للتأثر بتلك الرياح طول العام وكما ابتعدنا عنه قلت مدة هبوب هذه الرياح بالتدريج . ولعل خير بلد نتخذه مركزاً لتأثير تلك الرياح — ولو أن في هذا شيئاً من المجازفة — هو بلدة أسوان نفسها ، التي لا تسكاد تهب عليها طول السنة سوى ريح الشمال . وكما ابتعدنا عنها شمالاً أو جنوباً نقصت بالتدريج نسبة هبوب هذه الرياح .


ورياح الشمال هذه بالطبع جافة لا أثر لها في الفيضان . وفضلها أنها ساعدت على الملاحة في نهر النيل من الشمال إلى الجنوب — ضد التيار — ولأنها تهب من إقليم معتدل الحرارة إلى إقليم حار فيكون لها تأثير ملطف يعرفه كل سكان القطر المصري .

فهذا ما يختص بمنطقة الضغط العالي فيما وراء مدار السرطان .

(٢) وأما منطقة الضغط المنخفض الاستوائية : فليس معنى ذلك أن مركزها خط الاستواء الجغرافي المعروف ، وإنما مركزها خط الاستواء الشمسي ؛ فهي تكون إلى جنوب خط الاستواء في فصل الشتاء . وهي التي بوجودها هنالك تجعل تأثير ريح الشمال بعيد المدى جداً بحيث يصل إلى أعلى النيل . ولكنها في الصيف تنحدر مع الشمس شمالاً حتى تقرب من مدار السرطان . ويكون مركزها في أواخر مايو وفي يونيو ما بين العظيمة والنيل الذي يصبح إقليماً إعصارياً Cyclonic تهب عليه الرياح من كل صوب . وبنوع خاص تهب الرياح من الجنوب حيث يوجد في المحيطات الجنوبية مناطق ضغط مرتفعة ، يزداد ضغطها

ارتفاعاً في فصل الصيف . فتصبح أعلى النيل والحال هذه عرضة لهبوب رياح جنوبية أو جنوبية شرقية أو جنوبية غربية .

وهذه الظاهرة هي عامل مهم جداً في فيضان النيل لأن تلك الرياح الجنوبية ، أياً كان المحيط الذي تصدر عنه ، فإنها تهب منه متشعبة بالرطوبة التي تنساقط مطراً في أعلى النيل .



شكل (٣٣) توزيع الضغط على نهر النيل في شهري يناير ويوليو


(٣) أما الظاهرة الثالثة ذات الأهمية الكبرى فهي حالة الضغط فوق القارة الآسيوية وعلى الأخص في النصف الجنوبي الغربي ، ومعلوم أن القارة الآسيوية نظراً لضخامة حجمها واتساع مداها ، تسيطر على الأحوال المناخية التي حولها ، خارقة لنظام المناطق المناخية الذي يجعل بعض المناطق ذا ضغط مرتفع دائماً

والأخرى ضغطها منخفض دائماً . إن هذه الكتلة الهائلة من اليابس هي قانون نفسها وظاهرة مستقلة . ففي أشهر الشتاء يشهد بردها فيرتفع الضغط عليها ، بحيث تصبح مركزاً هائلاً للضغط العالى . وينتشر نفوذها غرباً إلى إقليم البحر الأحمر وقد يتفق هذا وامتداد منطقة ضغط (الأزور) فيتحدا الاثنان في تأثيرهما في اتجاه الرياح من الشمال إلى الجنوب ، على وادى النيل .

وأما في الصيف فترتفع حرارة القارة الكبرى وينخفض الضغط فوقها بدرجة عظيمة . فبعد أن كانت مصدراً تهب منه رياح جافة باردة إلى الأقطار المجاورة ، وإلى المحيطات تصبح في الصيف مركزاً إعصارياً هائلاً تندفع إليه الرياح من جميع المحيطات المجاورة . وفي فصل الصيف ينخفض ضغط الهواء على أعلى النيل أيضاً فتتحد الظاهرتان الإعصاريتان في آسيا وشرق أفريقيا . ويشهد هبوب الرياح الحملة بالأمطار من المحيطات الجنوبية .

(٤) بقى أن نقول كلمة عن حالة الضغط في المحيطات الجنوبية : وعلى الأخص المحيطين الهندي والأطلسي الجنوبي اللذين يهمننا أمرهما فيما يتعلق بأمطار حوض النيل . فنحن نعلم أن هناك منطقة ضغط عال وراء مدار الجدى كما هنالك مثلها وراء مدار السرطان ، والأولى أكثر انتظاماً بل هي موجودة طول العام تقريباً . وإنما تشتد في وقت الصيف حيث يزداد ارتفاع الضغط الجوى سواء في المحيط الهندي أم الأطلسي الجنوبي . وازدياد الضغط على هذا الوجه ذو أهمية كبرى لأنه يجعل هبوب الرياح أقوى .

وبازدياد قوة الرياح تزداد قدرتها على نقل الرطوبة من المحيطات إلى القارات . ومعقول والحالة هذه أن تكون هنالك علاقة بين درجة أمطار النيل وفيضانه وبين الاختلاف ما بين الضغط الجوى في المحيط الهندي والأطلسي الجنوبي من جهة وأواسط آسيا من جهة أخرى . فإذا كان الاختلاف كبيراً جداً كانت الرياح شديدة جداً والأمطار غزيرة وفيضان النيل عالياً . وسنعرض فيما بعد لذكر



(شكل ٣٤) توزيع الحرارة في حوض النيل في شهرى يناير ويوليو

الرأيين اللذين يبحثان فيما إذا كان المحيط الهندي أو الأطلسى ذا الشأن الأكبر في فيضان النيل .

مما تقدم يظهر لنا جلياً أن مناخ حوض النيل والاختلافات الإقليمية الموسمية هي نتيجة تفاعل الظواهرات المتيورولوجية التي ذكرناها : الضغط العالى فيما وراء المدارين والانخفاض الاستوائى ثم حالة الضغط فوق آسيا . هذه هي العناصر الهامة وقد لا تكون الوحيدة — لكن فهمها يساعدنا أن نعرف الأحوال المناخية في حوض النيل بوجه عام ويمكننا بعد ذلك أن نذكر حالة الأقاليم المختلفة على وجه التخصيص .

مناخ منابع النيل وأهاليه :

مناخ النيل في أواسط أفريقية واقعة كلها في المنطقة الاستوائية . فجميع البحيرات الكبرى مثلاً لا تخرج عن هذه المنطقة . ومناخها من النوع الذي نسميه الاستوائى equatorial ولهذا الضرب من المناخ مميزات نذكر هنا أهمها :

لو نظرنا إلى متوسط حرارة كل يوم لوجدنا الاختلاف قليلاً جداً بين كل يوم وآخر . وبين الشهر والشهر . ولنذكر هنا على سبيل التمثيل متوسط الحرارة في عنتبة في الأشهر الاثني عشر :

يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيه	يوليه
٢٢٫٢	٢٢٫٣	٢٢٫١	٢١٫٤	٢١٫٤	٢١٫١	٢٠٫٤
أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	متوسط السنة ^(١)	
٢٠٫٧	٢١٫٤	٢١٫٨	٢١٫٧	٢١٫٧	٢١٫٥	٢١٫٥

فأكثر ما يزيد متوسط الحرارة هو في شهر فبراير إذ تصل إلى ٢٢٫٣° ثم هي أخفض ما تكون في يوليو حيث تنزل إلى ٢٠٫٤° ، فالاختلاف الموسمي إذن ضئيل جداً حيث الحرارة . حقيقة أن الأرقام السابقة إنما هي تمثل متوسط الحرارة في كل شهر . فقد تكون هنالك أيام في كل شهر ، يبلغ المتوسط أكثر أو ينقص إلى أقل من تلك الأرقام . ففي عنتبة ربما كانت هنالك أيام في شهر يناير وفبراير ينخفض فيها متوسط الحرارة إلى درجة ١٨ مئيتية . وقد تزيد في أيام أخرى فتبلغ ٢٦° أو ٢٧° ، ولكنها قلما تخرج عن هذين الرقين . فالأيام إذن شديدة التشابه من حيث الحرارة . وهذه هي الخاصية الأولى المهمة لمناخ الأقطار

(١) راجع الإحصاءات المناخية في آخر كتاب أوغندا — ١٩٢٠ طبع الحكومة البريطانية . Handbook of the Uganda. Prot.

الاستوائية في حوض النيل . والحرارة بوجه عام هنا أكثر انخفاضاً عن معظم الجهات الاستوائية بسبب ارتفاع تلك الأفطار عن سطح البحر .

ولكن إذا كانت الحرارة لا تختلف في المتوسط يوماً عن يوم فإن الاختلاف بين الليل والنهار أكثر ظهوراً . وهذا الاختلاف قد يصل في غنتبة إلى نحو ١١ درجة . حين تنخفض حرارة الليل في المتوسط إلى نحو ١٥° م وتزيد حرارة النهار إلى ٢٥° م . وهذا الاختلاف ما بين حرارة الليل والنهار هو من خصائص الأقاليم الحارة وهو أكثر ظهوراً في الأقاليم الصحراوية الجافة منه من الأقاليم الاستوائية والمدارية . فسكان خط الاستواء والمدارين يتعرضون في اليوم والليلة لتقلبات كبيرة في حرارة الجو . وإن تكن هذه التغيرات من طبعها أن تجعل المساء بارداً لطيفاً بعد حرارة النهار المجهدة .

هذا والتغير المناخي الأهم في الأقاليم الاستوائية من شهر لآخر ، والعامل الأكبر الذي تتميز به الفصول هو المطر . فهذا يزداد في مارس وإبريل ثم يقل نوعاً ما في يوليه وأغسطس ، ويزيد مرة أخرى في نوفمبر . وموسم المطر يتبع بالطبع مسامتة الشمس لخط الاستواء . وليس هناك شهر يخلو من المطر ومتوسط عدد الأيام الماطرة في العام نحو ١٣٨ يوماً في غنتبة . وهو أكثر في شهر إبريل (١٨٣) وأقل ما يكون في يوليه (٧٧) :

سقوط المطر في غنتبة

يناير	فبراير	مارس	إبريل	مايو	يونيه
٧٦	٨٦	١٨٣	٢٢١	١٧٠	١٤٧
٨	٨٥	١٥٣	١٨٣	١٧٥	١٠٩
مطر بالمليمتر					
الأيام الممطرة					


يوليه	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	السنة
٧١	٦٨½	٨٤	٨٩	١٧٠	١٥٠	١٥٢٤
٧٧	٨٢	٧٨	١١١	١٣٦	١١٤	١٣٨

ومنطقة منابع النيل الاستوائية وإن تشابهت تشابهاً قوياً من حيث المناخ — حرارة ومطراً — غير أن هنالك اختلافات موضعية يطول سردها بالتفصيل . ولكن نذكر بوجه الإجمال أن الأقاليم المرتفعة تكون بالطبع أقل حرارة من المنخفضات . والجبال العالية كجبل الغون ورونزورى قد يشهد فيها البرد ويتساقط الجليد بكثرة . والإقليم الذى بين بحيرة فكتوريا والبحيرات الغربية أطف حرارة من إقليم بحيرة كيوجا وسواحل فكتوريا .

والمطر — وإن اتفق فى النوع — فإنه يختلف فى الكمية اختلافاً قد يكون كبيراً ما بين بعض جهات الهضبة الاستوائية ، وهذه بعض أرقام لأهم المحطات المتيورولوجية :

بوصة	مليمتر	بوصة	مليمتر
نمولى ٤٢٣٢	(١٠٧٦) بوطيايا	٣٣٥٣	(٨٥٢)
وادلاى ٤٣١٠	(١٠٩٦) فورت بورتال	٥٥٤٠	(١٤٠٠)
جولو ٦٠	(١٥٢٤) موبندى	٤٧٣٠	(١٢٠٠)
ماسندى ٥١	(١٢٩٥)		

بحيرة فكتوريا	بوصة	مليمتر
جنجا	٤٨٥٤	(١٢٢٣)
كبالا (منجو)	٥٠٤٢	(١٢٨٠)
عنقبة	٥٨٩٦	(١٥٠٠)
بوكوبا	٧٥٣١	(١٩٠٥)



(شكل ٣٥) يبين توزيع سقوط المطر : (١) من صفر لغاية ١٠٠ ملليمتر
(٢) من ١٠٠ إلى ٤٠٠ (٣) من ٤٠٠ إلى ٨٠٠ (٤) من ٨٠٠ إلى ١٢٠٠
(٥) من ١٢٠٠ إلى ١٨٠٠ (٦) أكثر من ١٨٠٠ ملليمتر

نلاحظ أن المطر أقل قليلاً في الشمال (وادلای ونغولی) منه في الجنوب كما هو منتظر ، وكذلك نجد سواحل بحيرة فكتوريا كلها غزيرة المطر . ولكن الساحل الغربي بنوع خاص أغزر مطراً . ففي بوكوبا يسقط من المطر ما لا يقل عن ٧٥ بوصة (١٩٠٥ ملليمتر) أو قريب من مترين من المطر . ولا علة لهذا فيما يظهر إلا تعرض بوكوبا للرياح الجنوبية الشرقية والشرقية ووجودها على حافة البحيرة ومن خلفها الهضبة مرتفعة ارتفاعاً فجائياً . وهذه هي الحال التي تساعد على كثرة المطر كثرة موضعية .

وهناك إقليم آخر غزير المطر جداً (متوسطه نحو ١٨٠٠ م م) ونراه واضحاً لجرد إلقاء نظرة على خريطة المطر في إقليم البحيرات (مثلاً الخريطة المنشورة في كتاب مصلحة الطبيعيات) أو أطلس مصر الجديد (وشكل ٣٥) . وهذه المنطقة واقعة في الشمال الشرقي لبحيرة فكتوريا حول خليج كافرندو . ولا سبب لهذه الظاهرة فيما يبدو إلا أن تكون كتلة جبل الغون تؤثر تأثيراً إضافياً بحيث تساعد صعود التيارات الهوائية ، فيتكاثف بخارها ويتساقط مطراً .

وإذا كان لنا أن نختار رقماً نجعله المقدار المتوسط لما يتساقط فوق الهضبة الاستوائية من الأمطار فلا نكون بعيدين عن الصواب إذا جعلنا هذا الرقم نحو ١٢٠٠ م م . هذا وفي أوغنده كثيراً ما يصحب المطر عواصف مرعدة . ولعل هذا أسوأ ما في الظواهر الجوية في تلك الأقطار . وقد يبلغ عدد هذه العواصف في العام نحو مائة . وعلى وجه العموم لا تعد بلاد أوغنده من الجهات الصالحة لسكنى الشعوب الأوروبية بصفة دائمة اللهم إلا الأجزاء الأكثر ارتفاعاً .

شمال أوغنده وجنوب السودان :

كلما انحدروا نحو الشمال بعدنا عن المنطقة الاستوائية ذات المطر الدائم طول


(١) ولو كانت الرياح آتية من الجنوب الغربي لما سهل تعليل كثرة الأمطار في بوكوبا .

العام ودخلنا إقليماً بعد إقليم ، حيث يبدأ ظهور فصل جاف في السنة ، لا يسقط فيه من المطر شيء يذكر . ففي المنطقة الاستوائية تسامت الشمس خط الاستواء مرتين : في مارس وسبتمبر ، ويعقب مرورها فصلان ماطران ؛ أي أكثر مطراً من بقية العام . أما شمال خط الاستواء فتكون المدة بين انحدار الشمس شمالاً ورجوعها جنوباً أقصر . مثلاً ، تسامت الشمس العرض الخامس عشر في أوائل مايو ثم في أوائل أغسطس ، فلا يكون بين المسامطة الأولى والثانية غير مدة تقل عن ثلاثة أشهر . ففي هذه الحال لا يكون هنالك سوى فصل ماطر واحد وفصل جفاف طويل .

إذن فكلما اتجهنا شمالاً — مبتدئين من خط الاستواء — اقترب الفصلان الماطران تدريجاً إلى أن يتحدا ويندجا ويكونا فصلاً واحداً بالقرب من الدائرة السادسة من دوائر العرض . وهذا الفصل الماطر — للسبب نفسه — يكون أقصر فأقصر كلما اتجهنا شمالاً إلى أن يختفي تماماً في شمال السودان .

فإذا وضعنا بالرسم البياني — بواسطة منحنيات — توزيع المطر بين شهور السنة في عدة محطات لرأينا خط عنتبة قرب خط الاستواء — وله قمتان واضحتان تمثلان الفصلين الماطرين في الربيع وفي الخريف . ثم نرى الخط الذي يمثل المطر في وادلاي (٢٣٨°) وقد اقتربت قمتاه — وإن لم تندجا تماماً ، مما يدل على أنه لم يزل هنا أيضاً فصلان ماطران ؛ وخط نمولي (٣٣٨°) يرينا أن المطر يكاد يكون متساوياً في كل أشهر الصيف (أبريل — نوفمبر) وإن كانت هنالك كثرة نوعاً ما في كل من مايو وأغسطس وأكتوبر . وهذه الكثرة هي هنا في مايو لا في مارس أو أبريل نظراً لموضع الشمس بالنسبة لهذا الإقليم .

ثم في منجلا (١١٥°) يتم اندماج الفصل الماطر ، فلا يكاد يكون هنالك قمتان بل قمة واحدة ، وتقع غالباً في أغسطس ، (حيث يسقط من المطر نحو ١٤٨ مم)



وهذه الظاهرة (أي وجود فصل ماطر واحد في الصيف) يتم تكونها حين نصل إلى غابة شامي (٧٧ °) حيث يكون الفصل الماطر في أشهر الصيف و يبلغ أقصاه في أغسطس (٢٠٢ م م) ومده من يونيه إلى أكتوبر . فيصبح أغسطس هو أكثر الشهور مطراً مع أنه عند خط الاستواء من أقلها مطراً .

ومتي وصلنا إلى غابة شامي (٧٧ °) فقد دخلنا في صميم المنطقة المدارية ، التي تمتاز عن المناخ الاستوائي بأن لها فصلاً واحداً غزير المطر مجتمعاً حول شهر أغسطس .

وما قلنا عن الفصل الماطر له ما يقابله تماماً فيما يختص

← (شكل ٣٦) منحنيات بيانية المطر توضح كيف يتقارب فصلاً المطر كلما اتجهنا شمالاً ، حتى يندمج في فصل واحد . وكيف يقل المطر تدريجياً من الجنوب إلى الشمال

بالجناف . فعند خط الاستواء لا يوجد فصل جاف بالمعنى الصحيح . وإنما يبدأ تكوين هذا الفصل (في أشهر الشتاء طبعاً) كلما ذهبنا شمالاً . وتكونه تدريجياً جداً . فلنأخذ شهر يناير مثلاً لنا : نجد أن المطر في كيبالا

٧٧ م

» ٢٤

وفي وادلاي

» ٤

» نمولى

» ٢

» منجلا

» ٠

» شامبي

وهكذا يتكون بالتدريج فصل جناف ظاهر جداً يمتد من نوفمبر إلى مارس ومركزه شهر يناير في نفس الوقت الذى يتكون فيه موسم ماطر ممرکز حول شهر أغسطس .

هذا فيما يختص بنظام سقوط المطر وتوزيعه في أشهر السنة . وأما فيما يختص بمقدار هذا المطر فإن هنالك تناقصاً مطرداً تقريباً في مجموع مقدار المطر السنوى كلما ذهبنا شمالاً . فهو في الجنوب أكثر منه في الشمال ، وهو في الوسط (وادى النيل) أقل منه عن الجانبين نظراً لتأثير المضبات عن الشمال وعن اليمين .

فالمطر عند خط الاستواء نحو ١٥٠٠ م ويتناقص إلى ١١١٨ عند نمولى ، إلى ٩٨٧ عند منجلا و ٨٧٣ عند غابة شامبي .

وحوض الغزال بوجه عام أكثر مطراً من وادى بحر الجبل . وهذا ظاهر من مقارنة أمطار المحطات التى على خط عرض واحد فالمطر في نمولى كما قدمنا نحو ١١١٨ م ولسكنه في ياي Yei (٤٧°) ١٣٠٠ م . وفي كاجوكاجي (٣٥٤°) ١٣٠٨ م . وهذه الحال تظهر بجلاء أكثر لو قارنا أمطار بحر الجبل بأمطار الحبشة كما سنرى .


* * *

بما تقدم يتضح لنا جلياً أن الانتقال من المنطقة الاستوائية إلى المدارية

تدريجى جداً . وأن هنالك منطقة انتقالية تشبه الاستوائية من بعض الوجوه أكثر مما تشبه المدارية . ومثل هذه المنطقة يحسن أن نسميها المنطقة وراء الاستوائية Subequatorial وفي هذه المنطقة تقع أعلى بحر الجبل وأعلى الغزال .

ونظراً لأن الانتقال تدريجى فليس من السهل أن نجعل حداً فاصلاً بين هذه المنطقة أو تلك . على أننا بعد خط عرض ٦° ندخل تماماً في المنطقة المدارية ذات الفصل الماطر حول شهر أغسطس والفصل الجاف في يناير . وهذه المنطقة تشمل وادى النيل من العرض السابع إلى السابع عشر شمالاً ، أى إلى شمال العظيرة بقليل . وبالطبع يقل مجموع المطر السنوى من الجنوب إلى الشمال على النحو الآتى :

غابة شامبي	حلة دليب	رنك	كوسى	الخرطوم	العظيرة
٨٣٢	٨١٢	٥١٨	٤٠٠	١٥٧	٧٢



(شكل ٣٧) رسم بياني يوضح ظاهرة تدهور النظام المدارى شمال خط عرض ١٠

لكنه بالرغم من اختلاف مقادير المطر وتناقصها كلما اتجهنا شمالاً ، فإن هذه الأمطار جميعها من نوع واحد (أمطار صيفية) وتتركز عادة حول شهر واحد (أغسطس) الذى يسقط فيه دائماً أكبر مقدار من المطر . وسنرى فيما بعد أن مصدر هذه الأمطار واحد فى الغالب .

ويهمنا أن نشير إلى أن المطر — وإن تناقص كلما اتجهنا شمالاً — فإن هذا

التناقص ليس مطرداً ، بل يبدأ بطيئاً جداً ما بين عرض ١٠° ٢٠' ، ثم يتناقص بسرعة كلما اتجهنا شمال خط عرض ١٠° ؛ لذلك كان مقدار المطر في ملـكـال قريباً من مطر جوبا ؛ ثم يتدهور النظام المدارى شمال ملـكـال ويزداد تدهوره كلما اتجهنا شمالاً ، كما هو واضح في شكل (٣٧) .

ولا بد لنا أن نلاحظ أن إقليم البحر الأحمر هو فيما يظهر أكثر مطراً من إقليم وادى النيل نفسه في المواضع الواقعة على نفس خطوط العرض . ففي سواكن الواقعة على عرض ١٩° ١٧' ، أى أكثر شمالية من العطبرة مطرها السنوى يبلغ ١٩٦ مم . وليس ما نعلل به هذه الظاهرة سوى تأثير الإقليم الجبلى الواقعة فيه سواكن من جهة ، ولأنها في الحقيقة في نهاية المنطقة المدارية وتسكاد تكون خارجة عنها وأكثر ما يكون سقوط أمطارها في نوفمبر وديسمبر ويناير . تحملها إليها رياح شمالية غربية^(١) .

والأمطار في الجهات القريبة من النيل الأبيض وبحر الجبل ، هى في العادة أقل من الجهات التى تليها شرقاً وغرباً على نفس خطوط العرض ، ولو أن هنالك حالات تشذ عن هذه القاعدة لأسباب موضعية . وجهات السودان غرب الهضبة الحبشية مطرها أغزر كثيراً من الجهات إلى تقابلها على وادى النيل الأبيض .

المخروط وم شمال السودان :

متى أدرك القارىء نظام المطر والأشهر التى يسقط فيها في أقطار السودان واختلاف المقادير من مكان إلى مكان واختلاف موسم المطر . متى أدرك القارىء

(١) في دراسة الظواهر المناخية لحوض النيل يجب دائماً مقارنة هبوب الرياح بمقدار المطر فتبدو لنا بوضوح العلاقة ما بين الأمطار والرياح التى تحملها . وفي جميع الأحوال الخاصة بحوض النيل نرى بجلاء أن الفصل الماطر يبدأ حين تنتهى ريح الشمال وتبدأ الرياح الجنوبية . والتبدل كثيراً ما يكون فجائياً . فلا يكون هنالك فترة انتقال محسوسة . وإقليم البحر الأحمر في السودان نظامه الخاص ، فهو على حافة المنطقة التى تتأثر بالرياح الجنوبية ، ولا يصيبه من مطرها إلا القليل النادر ، لأن المرتفعات تحول دون وصول الأمطار إلى الساحل ، ولذلك كان أكثر أمطار البلاد الساحلية مثل سواكن وبورسودان واقعاً في الشتاء ، بتأثير الرياح الشمالية .

كل هذا فقد أدرك من غير شك أهم الظواهر المناخية لحوض النيل في هذه المنطقة . ولا نريد أن نطيل الشرح في سرد تفاصيل دقيقة عن اختلاف الحرارة في أقاليم السودان المختلفة مكثفين بأن نوجه نظر القارئ إلى الجداول المنشورة في الكتب المشار إليها . على أنه قد يحسن أن نذكر شيئاً عن مناخ الخرطوم بنوع خاص لا لأنها العاصمة فقط بل لأن ظواهرها المناخية درست دراسة أحسن من غيرها من مدن السودان . وقد أقيم بها مرصد جوى من المرتبة الأولى . فهي جديرة والحالة هذه أن نرى فيها مثالا للأقليم الذى هى قلبه ومركزه .

تقع الخرطوم على دائرة العرض الخامسة عشرة والدقيقة السابعة والثلاثين وهى مرتفعة بنحو ٣٧٠ متراً عن سطح البحر الأبيض ، وهى فى الطرف الشمالى لتلك المنطقة المدارية الكبرى التى تتأثر بالأمطار التى مصدرها المحيطات الجنوبية . وهى فى الطرف الجنوبى لإقليم يعد من أشد أقاليم العالم حرارة ، وحرارته شديدة لا يُلطف من شدتها هواء يهب من إقليم منخفض الحرارة أو أمطار يساعد تبخرها على التقليل من شدة الحر . فإن كل ما يسقط فيها من المطر لا يتجاوز فى المتوسط ١٥٧ ملليمتر فى العام ، واقعة معظمها فى أشهر القيظ يوليه وأغسطس وسبتمبر ؛ وهذه الأشهر هى وحدها التى يُلطف سقوط المطر من حرها .

والإقليم الذى تقع الخرطوم فى جنوبه وأسوان فى شماله هو كما ذكرنا من قبل من أكثر أقاليم العالم حرارة ، ومناخه « قارى » بالمعنى المشهور ، أى أن الاختلاف عظيم بين حرارة الشتاء والصيف . وهو كذلك صحراوى للاختلاف الكبير بين حرارتى الليل والنهار . وفى فصل الشتاء — فى شهر يناير مثلاً — يكون هذا الإقليم منخفض الحرارة بالنسبة إلى إقليم أعالي النيل ، وإن تكن حرارته أكثر من حرارة مصر فى هذا الفصل . أما فى فصل الصيف فإنه يكون

أكثر حرارة من أى جزء آخر فى كل حوض النيل على الإطلاق . فيزيد متوسط الحرارة فى الخرطوم عن ٣٣° . وكذلك الحال فى العطيرة ومروى ودنقلة ، وهى نسبة عالية جداً لأنها متوسط حرارة الليل والنهار .

* * *

وأقل شهور السنة حرارة فى الخرطوم شهر يناير حيث يبلغ متوسط حرارة الشهر ٢٢° م^(١) . ثم ترتفع الحرارة فى فبراير ومارس إلى أن تبلغ حدها الأقصى فى شهر يونيو ، الذى متوسط الحرارة فيه ٣٣° . بعد هذا يبدأ سقوط الأمطار إلى مدة قصيرة فينقص متوسط الحرارة فى يوليه إلى ٣١° وفى أغسطس إلى ٣٠° . وأما فى سبتمبر فتزيد الحرارة زيادة طفيفة عن شهر أغسطس . فتوسط الحرارة فى سبتمبر ٣١° . ومثل هذه الزيادة غير المألوفة — إذ ليس هناك ما يبرر زيادة الحرارة فى سبتمبر عن أغسطس — لا سبب لها سوى جفاف هذا الشهر بالنسبة إلى سابقه . وبعد سبتمبر تنخفض الحرارة بالتدريج إلى المستوى الذى كانت عليه فى يناير .

الاختلاف اليومي :

على أننا إذا قلنا إن متوسط الحرارة فى يناير هو ٢٢° فيحسن أن نذكر أن هذا هو متوسط النهايات الكبرى والصغرى فى كل يوم طول الشهر .

ففى شهر يناير تنخفض الحرارة فى الليل وتبلغ حدها الأدنى حوالى الساعة السادسة صباحاً إذ تكون درجة الحرارة نحو ١٦° . وبعد ذلك تزيد الحرارة تدريجياً حتى تبلغ حدها الأقصى حوالى الساعة الرابعة بعد الظهر حيث تقرب

(١) يرجع القارئ فى كل ما يخص مناخ الخرطوم إلى كتاب مصلحة الطبيعيات فى هذا الموضوع المطبوع سنة ١٩٣٨ .

درجة الحرارة من ٢٩° . فدرجة الاختلاف بين الليل والنهار في شهر يناير نحو ١٥° .


وهذا الاختلاف ما بين الليل والنهار هو أكثر ما يكون في شهر إبريل إذ يبلغ أكثر من ١٥ درجة ، وهو أقل ما يكون في سبتمبر إذ يبلغ ١٠° . والسبب في هذا أن إبريل آخر أشهر الجفاف وسبتمبر آخر أشهر المطر .

وإذا كان متوسط الحرارة في يونيه هو ٣٣٫١ فإن الحرارة تنقص في الساعة السادسة صباحاً إلى نحو ٢٧ ثم تزيد بعد الظهر حتى تبلغ الأربعين درجة ، أي أنه عادي جداً أن حرارة النهار في الخرطوم في شهر يونيو وفي يوليو أيضاً كثيراً ما تبلغ الأربعين ، بل وكثيراً ما تزيد على هذا الرقم في عدة أيام في كل من أشهر الصيف وهي درجة حرارة عالية جداً قل أن تمارس مثلها في القاهرة اللهم إلا وقت هبوب رياح خماسينية مصحوبة بموجات حرارة شديدة كما حدث مثلاً في أوائل مايو (سنة ١٩٢٦) . وعلى كل حال لا يكون هذا إلا لمدة قصيرة . وفي الرسم البياني الآتي مقارنة للحرارة في القاهرة والخرطوم .

الهبوب :

لسنا بحاجة لأن نقدم بحثاً خاصاً نصف فيه هبوب الرياح في الخرطوم أو في أي إقليم آخر من أقاليم نهر النيل ، فإن المقدمة التي مهدنا بها لهذا الفصل فيها غناء عن الإطالة في شرح هذا الموضوع . ومما ذكرناه فيها يبدو لنا جلياً أن الخرطوم عرضة لهبوب رياح الشمال الجافة في أشهر الشتاء ولرياح الجنوب الرطبة في فصل الصيف . ونظراً لأن الخرطوم أدنى إلى مدار السرطان منها إلى خط الاستواء فإن نفوذ الريح الشمالية والشمالية الشرقية أقوى من نفوذ الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية .

على أن هناك ظاهرة جوية يُتحدث عنها كثيراً وعلى الأخص عند ذكر



(شكل ٣٨) رسم بيان للنهاية الكبرى والصغرى ومتوسط الحرارة في كل من القاهرة والحرطوم

الخرطوم ومناخها . هذه الظاهرة هي المعروفة عند أهل السودان بالهبوب ، وهو عبارة عن زوبعة إعصارية تحمل مقادير هائلة من التراب والرمل . وتهب بقوة عظيمة وقد تكون أحيانا من الشدة بحيث تقتلع الأشجار وتقلب مركبات الترام الخفيفة والزوارق البخارية في النهر ، وتهدم سقوف المنازل^(١) . هذه حال الهبوب حين يبلغ أقصى شدته ، ولكن عادة تكون الحال أخف وطأة من هذه ...

وإقليم الخرطوم هو الذي اشتهر بحدوث الهبوب . على أن المنطقة المعرضة لحدوثه واسعة جداً وممتدة من طوكر وكسلا شرقاً إلى الفاشر والأبيض غرباً . فقد لوحظ أنه في سنة ١٩١٨ حدث في الفاشر ثلاثة عشر هبوباً ... وكذلك لوحظ ثلاثة زوابع من هذا النوع في أسوان في مايو ويونيه ويوليه سنة ١٩١٦ . وزوبعة أخرى في شمال ادفو . وقد تنور هذه الزوابع في الإقليم الواقع جنوب الخرطوم إلى بلدة الدويم وواد مدني .

هذا فيما يختص بالمكان أما من حيث الزمان فإن (الهبوب) يكون عادة في أشهر المطر التي هي أيضاً أشهر الصيف ... وأكثر حدوثه في شهرى يونيو ويوليو . ففي يونيو مثلاً لا يخلو كل أسبوع من هبوبين اثنين . وقد تنور زوبعتان أو أكثر في يوم واحد ، ففي سنة ١٩٢١ هبت على كسلا زوابع في اليوم الثامن من شهر مايو . وقد لوحظ في يوم ٨ يوليو سنة ١٩٢٢ زوبعتان قادمتان على الخرطوم من جهتين متضادتين : غرب الجنوب الغربى وقد مرت بالمدينة الساعة الثالثة بعد الظهر ، والأخرى من شرق الشمال الشرقى وقد هبت على المدينة بعد هبوب الأولى بزمان قليل .

وقد يدوم (الهبوب) مدة من الزمن تتراوح بين نصف الساعة وعدة ساعات وقد أمكن إحصاء مدة هبوب ٤٣ من هذه الزوابع فوجد أن متوسط زمن هبوبها هو ثلاث ساعات ونصف .

(١) راجع كتاب مصلحة الطبيعيات عن مناخ الخرطوم ص ٤٥ وما بعدها . والمعلومات المذكورة هنا مأخوذة جلها من هذا الكتاب .

أما من حيث الجهة التي هي مصدر هذا (الهبوب) فتختلف بحسب فصول السنة ؛ ففي الفصل الجاف الذي تقل فيه هذه الزوايا يكون اتجاهها عادة من الشمال أو الشمال الشرقى . وأما في فصل الصيف الذي تكثر فيه الزوايا فإن أكثر هبوبها يكون من الجنوب أو الجنوب الشرقى .

وليس من الصفات الأساسية للهبوب أن يكون محملاً بالتراب . فإن كثرة ما يحمله من التراب إنما هو نتيجة هبوب الزوابع في إقليم رمله وترابه منسكك مخلخل . ويقول المسترجع جرابهام إن (الهبوب) كثيراً ما يمر من غير أن يلاحظه أحد إذ يكون مروره فوق منطقة ذات نبات وشجر . فإذا كان مروره فوق إقليم ذي تراب ورمل فإن الزوابع تحمل الغبار والتراب وقطعاً من الهشيم إلى ارتفاع يقرب من الألف متر . وذلك بفضل ما لهذه الزوايا من القوة الهائلة . وهي ربما اكتسحت التراب والرمال في مكان ثم ألقت بها في مكان آخر . فقد لوحظ في الخرطوم أن سحباً من التراب قد سقطت على المدينة دون أن يصحبها رياح أو زوايا . كأنما الزوابع قد فقدت قوتها قبيل الخرطوم ، فلم يشعر (بالهبوب) أحد . وكل ما نال المدينة منه هو هذه الرواسب الهوائية من رمل وتراب وهشيم .

ولعل خير تعريف نصف به (الهبوب) هو أن نقول إنه زوابع إعصارية محدودة المدى ، موضعية برغم شدتها . فالضغط في وسطها منخفض جداً بالنسبة للضغط في أطرافها والهواء في وسطها صاعد بشدة ، حاملاً معه التراب والرمال . ومن أطرافها تهب الرياح إلى الوسط بشكل حلزوني . والحركة متجهة من الأرض إلى السماء . . وعادة يكون كل هبوب مكوناً من مجموعات عديدة جداً يتحرك كل منها بهذا الشكل . وكلها متجاورة ومتلاصقة . ولكل واحدة حركة حلزونية مستقلة ولكل حمولتها من التراب والرمال . ولكنها جميعاً — نظراً لتلاصقها — تبدو بالطبع كأنها كتلة واحدة .

(والهبوب) نتيجة تسخين الهواء في مساحة عظيمة محدودة لمدة أربعة أو خمسة أيام . فينشأ عن هذا التسخين تخفيف عظيم للضغط — تخفيفاً موضعياً — وهذا يسبب هذه الأعاصير المحدودة المدى ، الشديدة القوة ، الحلزونية الحركة التي يندفع فيها تيار الهواء من الأرض إلى السماء حاملاً أضعافاً من التراب والأعشاب اليابسة .

أما حركة (الهبوب) من الشمال في فصل الشتاء أو من الجنوب في الصيف فهناك يكون الاتجاه متأثراً من غير شك بحالة الرياح السائدة في كل من الموسمين ؛ هذه الرياح السائدة لا تستطيع وحدها أن تكون (الهبوب) ، ولكن متى تكون الهبوب بتأثير العوامل السابق ذكرها . فإن الرياح السائدة تساعد على توجيه هذه الزوايا إلى جهات خاصة تبعاً لاتجاه تلك الرياح نفسها .

ويصحب مرور (الهبوب) عادة انخفاض في الضغط الجوي وكثيراً ما يكون معه برق ورعد ومطر . وبعد حدوثه تنخفض درجة الحرارة نوعاً ما .

وشبيه (بالهبوب) في شكله وتركيبه تلك الأعاصير التي تهب في بلاد الصين (التيفون) وخليج بنغالة وعلى جزر الأنتيل والولايات الجنوبية من الولايات المتحدة .

وهذه الأعاصير تختلف عن (الهبوب) في أن حجمها أعظم منه بكثير ، وأن لها مسببات أخرى ولكنها تشبهه في أنها هي أيضاً زوايا إعصارية مدمرة موضعية التأثير .

مناخ هضبة الحبشة :

لم يزل علمنا بمناخ هضبة الحبشة دون علمنا بمناخ بقية حوض النيل بكثير . وليس لدينا إحصائيات وافية عن أي بلدة اللهم إلا عن غمبيل وهي تكاد

تكون خارجة عن الهضبة . وكذلك نعلم بعض الشيء عن مناخ أديس أبابا وهرر ومواقع قليلة أخرى ، على أن الإحصائيات الدقيقة المنتظمة قليلة جدا .

والحبشة كما نعلم إقليم فذ في حوض النيل . فذ من جميع الوجوه ولكنه بنوع خاص فذ من حيث المناخ . فهناك نرى تأثير الارتفاع واضحا كل الوضوح في تلطيف الحرارة . وهنا نجد المطر الغزير غزارة ليس لها نظير في سائر حوض النيل . ولئن كان المطر في بعض نواحي الهضبة الاستوائية يعادل أو يفوق المطر في هضبة الحبشة في المقدار السنوي ؛ لكن المطر في الهضبة الاستوائية موزع مفرق على طول السنة . أما في الحبشة فغزير يسقط كله في موسم واحد محدود . فيكون عند نزوله هطالا مدراراً ، بدرجة لا يماثلها إلا المطر الموسمي في الأقاليم التي تؤثر فيها الرياح الموسمية .

على أن لمناخ هضبة الحبشة خاصية أخرى امتاز بها . وهي تعدد الأحوال المناخية في مساحة محدودة ففي الهضبة أودية عميقة ومنخفضات تشد فيها الحرارة ويقل فيها جريان الرياح . فيكون مناخها مداريا قاسيا ، في حرارته ورطوبته . ولا شيء أقسى على الحياة البشرية من اجتماع الحرارة والرطوبة . إذ يخلد الجسد إلى الراحة وتموت روح النشاط ، وفي مثل هذه الحال لا يكون تقدم ولا تنمو حضارة . فالأودية المنخفضة في هضبة الحبشة أقطار لا يرتاح الناس إلى سكنها . والحبش يدعونها القلا (Qolla) كما رأينا من قبل .

وعلى النقيض من هذا توجد أقطار مرتفعة شاهقة حيث تعلو قمم الجبال إلى أكثر من ٤٥٠٠ متر . وهذه القمم يكسو بعضها الجليد على الدوام . فمناخها قطبي ، وبردتها شديد . وهذه هي الأصقاع التي يدعوها أهل البلاد ديجا (Dega) .

لكن أكثر هضبة الحبشة ليس من هذا النوع ولا من ذاك . وإنما هو من نوع وسط بين الاثنين ... يتراوح ارتفاعه بين ١٧٠٠ و ٢٤٠٠ متر . والأهالي

يسمونه ويناديها Woina Dega : أو إقليم الكرم : أى الأراضى الصالحة لزراع الكروم . والجزء العامر من هضبة الحبشة واقع كله فى هذه الأقاليم . ولو أن الهضبة كلها تعتبر مجما لعدة أنواع ، إن لم نقل لجميع أنواع المناخ ، على أن الذى يهمنا بنوع خاص هو هذا النوع الأخير الذى تعيش فى كنفه الكثرة للعظمى من سكان البلاد .

الحرارة :

تعد هضبة الحبشة من أكثر الأقاليم اعتدالا ، فوقعها فى المنطقة المدارية باعث على ازدياد الحرارة بفضل قوة أشعة الشمس التى تكون عمودية أو قريبة من العمودية على البلاد فى جزء عظيم من السنة ، ولكن ارتفاعها العظيم عن سطح البحر عامل كبير فى تلطيف هذه الحرارة دون أن يخفضها إلى درجة يصبح معها البرد قارسا لا يحتمل . فاتفق هذين العاملين : الحرارة المدارية والارتفاع الكبير عن سطح البحر ، ساعد على جعل مناخ الحبشة معتدلا جداً صالحا حتى للأوروبيين الذين لا يجدون فى حرارته أكثر مما يستطيعون احتماله .

وهناك عامل آخر فى تلطيف الحرارة فى هضبة الحبشة وهو أن فصل المطر الغزير فى يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر متفق مع الزمن الذى تكون فيه أشعة الشمس عمودية أو قريبة من أن تكون عمودية . فازدياد الحرارة الذى ينتظر من تعامد أشعة الشمس يلطفه كثيراً سقوط الأمطار الغزيرة فى فصل الصيف . وأما فى الشتاء ، حين تقل الأمطار إلى درجة الانعدام ، فى شهر ديسمبر ويناير وفبراير ، فإن الحرارة تكون أحيانا أعلى منها فى أشهر الصيف . ففى مناخ الحبشة إذن ظاهرة غريبة ، وهى أن شتاءها يعادل صيفها من حيث الحرارة وقد يزيد عليه . هذه هى الحقيقة التى لا بد لنا من تقريرها استنباجا من الأرقام القليلة التى بين أيدينا فمتوسط الحرارة فى هرر مثلا كما يلي :

يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيه
٢٥,١	٢٥,٦	٢٦,٥	٢٦,٧	٢٦,٤	٢٥,٧
١٢,٥	١٣,٩	١٤,٧	١٤,٩	١٥,١	١٤,٦
١٨,٨	١٩,٨	٢٠,٦	٢٠,٨	٢٠,٨	٢٠,٢
النهاية الكبرى					
النهاية الصغرى					
المتوسط					

يوليه	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	متوسط السنة
٢٣,٨	٢٣,٢	٢٤,٤	٢٥,٦	٢٥,٨	٢٥,٨	٢٥,٤
١٤,١	١٣,٨	١٤,٥	١٤,٤	١٣,٢	١٣,٣	١٤,١
١٩,٠	١٨,٥	١٩,٤	٢٠,٠	١٩,٥	١٩,٦	١٩,٨
النهاية الكبرى						
النهاية الصغرى						
المتوسط						

فترى من هذا الجدول أن النهاية الكبرى للحرارة هي أعلى ما تكون في أبريل ومايو، وأقل ما تكون في يوليو وأغسطس وسبتمبر. أما النهاية الصغرى فلاختلاف فيها يسير جداً طول السنة. وكل ما نلاحظه أن الفرق بين النهايتين في الفصل الماطر أقل منه في فصل الجفاف. وهذه هي الحالة التي نتوقعها لأن الرطوبة تحول دون فقدان الحرارة، فلا يكون الاختلاف بين الليل والنهار كبيراً بمقدار الاختلاف في فصل الجفاف. وإذا نظرنا إلى متوسط الحرارة نرى أن أبريل ومايو أكثر الشهور حرارة، وأقلها يوليو وأغسطس.

على أن حرارة الشتاء والربيع النسبية يصحبها شيء من الجفاف، بينما حرارة الصيف المنخفضة نسبياً تصحبها رطوبة. فالأولى أيسر احتمالاً من الثانية. ولو أن الحرارة في الأقاليم الجبسية العالية قلما تكون مرهقة في أى وقت من الأوقات. على أننا قد نتساءل: هل مجرد سقوط المطر الغزير في فصل الصيف كاف لتعليل هذه الظاهرة الغريبة: ظاهرة الحرارة المرتفعة نسبياً في فصل الشتاء والربيع؟

ألا يمكن أن يكون هنالك عامل آخر موجود في الشتاء معدوم في الصيف ساعد على زيادة هذه الحرارة ؟

لننظر إلى درجة الحرارة في بلدة أخرى في هضبة الحبشة ، فهرر واقعة في الطرف الشرقي وغمبيلا في الطرف الغربي للهضبة ، ودرجات الحرارة في غمبيلا طول العام هي :

يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيه	
٣٦,٦	٣٧,٧	٣٨,٥	٣٦,٨	٣٣,٧	٣١,٩	نهاية كبرى
١٨,٠	١٩,٥	٢١,٣	٢١,٨	٢١,٤	٢٠,٧	نهاية صغرى
٢٧,٣	٢٨,٦	٢٩,٩	٢٩,٣	٢٧,٦	٢١,٤	متوسط

يوليه	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	العام
٣٠,٧	٣٠,٨	٣١,٨	٣٣,٤	٣٤,٧	٣٥,٦	٣٤,٤
٢٠,٤	٢٠,٢	٢٠,٠	١٩,٥	١٨,٨	١٨,١	٢٠,٠
٢٥,٦	٢٥,٥	٢٥,٩	٢٦,٤	٢٦,٨	٢٦,٨	٢٧,٢

في هذه الأرقام التي هي أصح أرقام في متناولنا الآن عن مناخ الحبشة نجد كل تأكيد لما قلناه من قبل عند استظهارنا لأرقام هرر ... ولو أن الحرارة هنا أعلى كثيراً سواء في نهاياتها الكبرى أو الصغرى أو في المتوسط لأن غمبيلا تمثل إقليم القلا : أي الجزء الأكثر انخفاضاً من هضبة الحبشة .

فلاحظ هنا أن متوسط الحرارة في يناير ٢٧,٣ وفي أغسطس ٢٥,٥ ، فنعود ونسأل مرة أخرى : هل مجرد سقوط المطر في الصيف كاف لأن يغير الأحوال المناخية إلى هذه الدرجة ويقلبها رأساً على عقب ؟ إن جميع من كتبوا في تحليل

هذه الظاهرة اكتشفوا بأن يعللوها بالمطر الغزير ... لكن لا بد لمن يفكر في الأمر طويلاً أن يترىث قبل أن يقبل هذا التعليل .

ومما يزيد في شكنا هذا أن نقارن بين حرارة الشتاء في هضبة الحبشة وحرارة الشتاء في البلاد التي تقابلها في سائر حوض النيل في نفس خطوط العرض . ففي بلدة واو نرى متوسط الحرارة في يناير ٢٥٤° مقابل ٢٧٣° في غمبيلا . هذا مع العلم بأن واو واقعة في سهل بحر الغزال ، وغمبيلا على سفح هضبة الحبشة . وكلاهما على ارتفاع متقارب فوق سطح البحر . ومع ذلك فإن غمبيلا أكثر حرارة من واو في شهر يناير وكلاهما في درجتى عرض متقاربتين (غمبيلا ١٥°٨ — واو ٢٤°٧) . نعود إلى هرر وارتفاعها فوق سطح البحر ١٨٥٦ متراً ، ولنقارنها ببلدة كافيا كنجى الواقعة في حوض بحر الغزال والتي لا يزيد ارتفاعها فوق سطح البحر عن ٦٠٠ متراً نجد أن درجات الحرارة لشهرى ديسمبر ويناير هي :

	درجة العرض		نهاية كبرى		نهاية صغرى		متوسط	
هرر	(٩,٤٢° شمالاً)		٢٥,٨		١٣,٣		١٩,٦	
			٢٥,١		١٢,٥		١٨,٨	
كافيا كنجى	(٩,١٧° شمالاً)		٢٣,٢		١٤,٦		١٨,٩	
			٢٢,٢		١٥,٥		١٨,٦	

هذه الأرقام المأخوذة عن مصلحة الطبيعيات المصرية هي أصدق أرقام في متناولنا اليوم . وإذا تعارضت مع أرقام أخرى فيجب أن نتمسك بها وننبذ ماعداها فهذه الأرقام تدل دلالة واضحة على أن هرر رغم ارتفاعها الكبير فوق سطح البحر وما يستدعيه هذا الارتفاع من تلطيف في درجة الحرارة هي مع هذا ذات حرارة أعلى في فصل الشتاء من حرارة كافيا كنجى الواقعة في حوض بحر الغزال ، وهي أقل ارتفاعاً بألف متر عن هرر .

لا بد لنا إذن أن نقرر بأن ظاهرة ارتفاع الحرارة في هضبة الحبشة في فصل الشتاء ظاهرة غير عادية ... لا يكفي في تحليلها جفاف هذا الفصل بالنسبة لرطوبة

فصل الصيف ، لأن هذا إذا كان يعلل لنا ارتفاع حرارة الشتاء عن حرارة الصيف في هضبة الحبشة ، فإنه لا يفيدنا شيئاً في تعليل تلك الظاهرة الأخرى ، وهي أن حرارة الحبشة ، لو حكمنا بالأرقام التي في متناولنا ، هي في فصل الشتاء أعلا من الحرارة في إقليم وادي النيل الواقع على نفس درجة العرض . والذي هو منخفض عنها انخفاضاً عظيماً ... وكان المنتظر أن تكون حرارته أعلا .

نخلص إذن إلى نتيجة لامندوحة لنا عنها ، وهي أن ارتفاع حرارة الحبشة النسبي في الشتاء له سبب خاص لم يوضحه لنا المتيورولوجيون بعد ، وقد لا نستطيع تقريره بصفة قاطعة إلا بعد أن نمسئ ولدينا أرقام لإحصاءات مناخية عن سائر الهضبة يمكن الركون إليها ركوناً تاماً . وإلى أن نصل إلى هذه النتيجة القاطعة يجوز لنا أن نقسائل : ألا يمكن أن تكون الرياح التي تهب على الحبشة في الشتاء أدفاً نوعاً من الرياح التي تهب على سائر وادي النيل ؟ لم تنشر مصلحة الطبيعيات المصرية أرقاماً عن الرياح في هرر أوفي أديس أبابا . ولكنها نشرت إحصائيات عن هبوب الرياح في غمبيلا . ونحن إذا أردنا أن نصل إلى نتيجة صحيحة فيجب أن ننبيها على أرقام يمكن الاعتماد عليها . ويجب أن ننبد الأرقام المنشورة في بعض الكتب القديمة عن حوض النيل والتي هي نتيجة مشاهدات وقتية مبشرة مفرقة غير مطردة ... إذن فنحن مضطرون لأن نعتمد على أرقام غمبيلا . والنتيجة التي سنصل إليها هي بالطبع غير مرضية ؛ إذ تعتمد على أرقام نقطة واحدة ولكنها هي كل ما يمكن أن نصل إليه الآن وإلى أن تنظم الملاحظات الجوية في هضبة الحبشة . ونحن نورد للقارئ في جدول خاص الأرقام الدالة على النسبة المئوية لهبوب الرياح في كل من بلدتي واو وغمبيلا :

غُمَيِّلَا	شمال	شمال شرقى	شرقى	جنوب شرقى	جنوب	جنوب غربى	غرب	شمال غربى	سكون
يناير	١٠,٤	٢,٤	١٦,٣	٣٣,٩	٥,٠	٦,٢	١٦,٥	٢,٤	١٥,٧
فبراير	٠,٩	٠,٩	٧,٥	٣٧,٨	٥,٣	٧,٥	١٥,٩	٤,٠	٢٠,٤
مارس	٠,٨	٥,٢	٨,٣	٢٧,٦	٦,٠	١٣,٥	١٨,٧	٣,٢	١٦,٥
أبريل	١,٣	٢,٥	٥,٤	٢١,٠	٤,٨	١٥,٠	٢٢,٩	٥,٤	٢١,٧
مايو	٠,٨	٥,٦	١٢,٥	٢٦,٣	٦,٢	٦,٠	٢٥,٠	٧,٣	١٠,٥
يونيه	٢,٩	٤,٦	٨,٣	٢٦,٠	٣,٥	٧,٥	١٦,٤	٦,٣	٢٤,٦
يوليه	٣,٠	٥,٦	١٠,٧	٢٠,٤	٦,٥	٥,٦	١٦,٣	٧,٣	٢٤,٦
أغسطس	٣,٦	٥,٨	٦,٠	٢٨,٢	٤,٤	٨,٣	٨,٧	٨,١	٢٧,٨
سبتمبر	٠,٨	٥,٨	١٠,٦	٣٥,٦	٧,٩	٩,٠	٦,٧	٨,٥	١٥,٠
أكتوبر	١,٦	٣,٠	٩,٧	٤٦,٢	١٥,٧	٤,٨	٤,٤	٥,٦	٨,٩
نوفمبر	١,٧	٤,٦	١٤,٠	٣٣,١	٥,٨	١٠,٦	١٢,١	٥,٢	١٢,٩
ديسمبر	٢,٠	٥,١	٨,١	٣٩,١	٥,٦	٧,٣	١٢,٧	٤,٨	١٥,٤
المتوسط	١,٧	٤,٢	٩,٨	٣١,٢	٦,٤	٨,٤	١٤,٦	٥,٧	١٧,٨
واو									
يناير	٢٦,٩	١٨,٥	١٦,٣	١٦,٧	١٢,٢	١,٨	٢,٢	٥,٤	٠,٠
فبراير	٢٠,٩	١٩,٢	١٤,٧	١٤,٨	١٠,٥	٥,٦	٧,٠	٧,٣	٠,٠
مارس	١١,٦	٨,٨	١٢,١	١٤,٥	١٨,٤	١٣,٨	١٥,٢	٥,٦	٠,٠
أبريل	٥,٤	٤,٣	٨,٢	١٤,١	٢٩,٦	١٧,٦	١٦,٦	٤,٠	٠,٢
مايو	٣,٥	٢,١	٨,١	١٣,٧	٣٧,٨	١٦,٣	١٤,١	٤,٣	٠,١
يونيه	٣,٥	٢,٧	٥,٧	١٥,٦	٣٤,٤	١٦,٦	١٧,٢	٤,٣	٠,٠
يوليه	٢,٨	١,٠	٣,٠	٨,٢	٢٩,٠	١٨,٢	٣٠,٠	٧,٧	٠,٠
أغسطس	٥,٤	٣,٥	٦,٥	١٠,٥	٢٣,٣	١٧,٣	٢٤,٨	٩,٦	١,٠
سبتمبر	٨,٦	٤,٦	١١,٣	١١,٤	٣٣,٨	١١,٤	٢١,١	٧,٨	٠,٠
أكتوبر	٧,٣	٦,٠	١٢,٥	١٣,١	٢٤,٧	٨,٧	١٠,٨	٦,٩	٠,٠
نوفمبر	١٥,٦	١٧,١	١٨,٦	١٧,٠	١٨,٧	٣,٨	٣,٠	٦,٢	٠,٠
ديسمبر	٢٠,٦	٢٠,٤	٢٠,٢	١٤,٦	١٥,٣	١,١	٣,٠	٥,٧	٠,٠
المتوسط	١١,٠	٩,٠	١١,٤	١٤,٥	٢٣,١	١١,٠	١٣,٧	٦,٣	٠,٠

وفي هذا الجدول يتبين لنا أن الفرق الأعظم بين البلدين هو أنه في فصل الشتاء تهب على وادي رايح الشمال أكثر من كل رايح أخرى ، وفي غمبيلا لا أثر مطلقاً لرياح الشمال . وإنما أكثر هبوب الرياح على غمبيلا في هذا الوقت من الجنوب الشرقي .

في فصل الشتاء تكون أشعة الشمس مسامتة للأقاليم التي جنوب خط الاستواء مباشرة ، فالرياح التي تهب من الجنوب أو الجنوب الشرقي رياح دافئة آتية من أقطار حارة ، بينما رايح الشمال تكون آتية من أقل جهات الأرض تأثراً بأشعة الشمس ، فتهب من أقاليم باردة نسبياً على وادي النيل . فمقول جداً والحالة هذه أن تكون الحرارة أعلا في غمبيلا التي لا تمسها رايح الشمال عنها في وادي المعرضة لهذه الرياح .

لقد سبق لنا أن ذكرنا رايح الشمال وهبوبها على حوض النيل . والآن لابد لنا من أن نقرر بأن هذه الرياح لا تؤثر كثيراً في إقليم غمبيلا كما هو ظاهر من الأرقام . وقد لا يمكننا بعد أن نقول إن سائر هضبة الحبشة لا يتأثر بهذه الرياح ، نظراً لجهلنا بالأحوال المناخية الدقيقة عن سائر الهضبة . ولكننا إذا قلنا إن ازدياد الحرارة في الشتاء في غمبيلا سببه هبوب رياح جنوبية شرقية ، وأن ازدياد الحرارة في ههر قد يكون للسبب عينه . فتكون الهضبة من شرقها إلى غربها بعيدة في فصل الشتاء عن تأثير رياح الشمال الباردة ، وأن هذا هو السر في ارتفاع حرارة الشتاء في الهضبة ، أو على الأقل في النصف الجنوبي منها .

* * *

وعاصمة الحبشة أديس أبابا مثال حسن لاعتدال الحرارة في الهضبة في الإقليم المسمى ويناديجا . والعاصمة مرتفعة عن سطح البحر بمقدار ٢٤٤٠ متراً وواقعة على درجة العرض ٩°٢ . ومتوسط الحرارة في شهر السنة هي :

يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو
١٦,٦	١٥,٢	١٧,٨	١٦,٢	١٧,٣	١٥,١
يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٣,٧	١٤,٩	١٤,٤	١٥,٦	١٦,٣	١٥,٦

هذا هو متوسط الحرارة ولم يزل علمنا بنهاياتها الكبرى والصغرى قليلا . على أن تلك النهايات قد زادت مرة حتى بلغت ٢٩,٦ ونقصت مرة حتى كانت ١,٥ وهذه بالطبع أحوال شاذة . فمناخ أديس أبابا إذن معتدل جداً طول السنة ، وإن يكن الهواء قبل شروق الشمس بارداً في العادة .

المطر :

أما عن المطر في هضبة الحبشة فإن نظرة يلقها القارئ على الجدول التالي تبين له الحالة العامة لسقوط الأمطار هناك . ولقد جمعت معلومات كثيرة عن المطر في الحبشة أكثر من المعلومات التي جمعت عن الظواهر المناخية الأخرى . ويرى القارئ هنا إحصائيات عن جهات كثيرة موزعة في نواحي الحبشة المختلفة : في الشمال وفي الجنوب . وفي الشرق والغرب .

ومن الأرقام المنشورة نستخلص أن المطر غزير في أكثر هضبة الحبشة ولكن أكثر سقوطه في الأربعة أشهر الصيفية : يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر . وأكثر الأشهر مطراً هو أغسطس في أكثر جهات الحبشة . ولكن في البلاد الواقعة إلى الجنوب ربما كان المطر أغزر نوعاً في يوليو أو يونيو . ونسبة ما يسقط من المطر في أشهر الصيف إلى ما يسقط منه في العام كله ٨٠ ٪ .

المطر في هضبة الجبشة

مجموع السنة	١٢٣٩	٢٠٠٦	١٢٥١	٣٢٨١	٨١٦	٦٥٥	٣٨٨١	٨٦٧
ديسمبر	٨١	٣٤	٦	١١	٢	٥٨	٢٠	١٠
نوفمبر	٤٠	٨٧	٣١	٣١	٣	٦١	٤٣	٥١
أكتوبر	٦٧	١٦١	٢٠	٣٨	١٨	٣٥	٣٧	٣٥
سبتمبر	٦٧١	٣٠٠	١٥١	١٥١	٣٧	٦٨	٦٥١	٩٥
أغسطس	٨٨١	٣٠٠	٨٠٣	٧٨٣	٣٠١	٨٥٥	٧٥١	٦٠٦١
يوليه	٥٠٥	٣٨٨	٦٨٨	٣١٨	٣١١	٦٧١	٣٨١	٦٥١
يونيه	١٧١	٣٦٥	٤٣١	٠٧	٧٦	٨١	١٧١	٩٠
مايو	٥٢	١٦١	٥٨	٥٧	٦٦	٧٨	٦٧١	٦٥١
أبريل	٧٩	٨٨١	٨٧	٣٨	٧٦	٦٧	٦٥١	٦١١
مارس	٣٦	٨٧	٧٠	٧٨	٤٣	٨٧	١٦	٧٨
فبراير	١٠	٤٩	٤٦	٨١	٧١	٤٣	٥١	٣٢
يناير	٧	٢٧	٥١	٥	٦١	١٨	١١	٩
الشهر	غيميل	جورى	أديس أبابا	ديبيه	ادامافو	قوارم	صايو	هرر
١٩١٥ - ٣٤,٣٥	١٩١٠ - ٣٥,٣٨	١٩٣٠ - ٣٩,٤٥	١٩٣٠ - ٣٩,٤٥	٧ - ٣٩	١٩١٠ - ٣٩,٤٥	٧,٥٥ - ٣٦,٣٦	٩,٤٨ - ٤٢,٣٠	

تقريباً : فإننا نجد في أديس أبابا العاصمة أن مقدار ما يسقط من المطر في السنة هو ١٢٥٩ ملميمترا وما يسقط في أشهر الصيف الأربعة نحو ٩٢٤ ملميمترا .

وفي البلاد الجنوبية نرى المطر موزعا طول العام بحيث يكون موسم المطر أطول نوعا ما منه في البلاد الشمالية : أى أن فصل المطر يبدأ مبكراً (في أبريل ومايو) ويبقى إلى أواسط أو نهاية أكتوبر . بينما في البلاد الأخرى ينحصر موسم المطر الغزير بين منتصف يونيو ومنتصف سبتمبر .

وأشهر الشتاء عادة أشهر جفاف نسبي . ولو أن قليلا من المطر قد يسقط بنوع خاص في شهر فبراير ويزيد هذا المقدار في شهر مارس زيادة محسوسة . ولكن هذه الزيادة لا تبرر ما يذهب إليه بعض الكتاب من أن لبعض أقاليم الحبشة وعلى الخصوص إقليم أديس أبابا موسمين للمطر : الأول مركز حول شهر مارس والثاني حول شهر أغسطس . وهذه الدعوى يجدها القارىء في كتاب من أشهر الكتب عن المناخ وهو كتاب هان Hahn. Pandbuch der Klimatologie في الجزء الثاني (ص ١٦٣) . وقد نقل هان هذا عن كتاب ليونز في نهر النيل . وهو الكتاب الذى كان مرجعاً لأكثر الكتاب عن كل ما يتعلق بالجغرافية الطبيعية لحوض النيل . وقد أوردوا استدلالاً على دعواهم هذه أرقاماً تختلف اختلافاً جوهرياً عن الأرقام التى أوردناها . فقالوا إن سقوط المطر في أديس أبابا هو كما يأتي :

(١)

يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو
٩	٤٨	١٠٥	٨٥	٧٨	١٤٦
يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
٣٠٥	٢٩٢	١٦١	١٤	١٣	٣

ويظهر هذا الاختلاف بوجه خاص في أمطار شهر مارس ، التي لا يزيد متوسطها في الواقع عن ٧٠ ملليمترا ، بينما هو في الجدول السابق يزيد على ١٠٠ ملليمترا ولا سبب لهذا الاختلاف سوى أن أرقام ليونز وهان كانت نتيجة إحصاء ثماني سنوات (١٩٠٠ — ١٩٠٧) بينما أرقامنا نتيجة إحصاء ٣٧ سنة . وقيمة الأرقام الدالة على مناخ أى بلد متوقعة تماما على كثرة عدد السنين التي يؤخذ متوسطها . فقد أدت تلك الأرقام المأخوذة عن مشاهدات محدودة إلى الوقوع في خطأ علمي في كتب ذات مقام معروف بين المؤلفات العلمية .

إذن فالإحصاءات المناخية الطويلة لا تبرر ما ذهب إليه هان وليونز من أن هنالك نهاية كبرى Maximum للمطر في مارس وأخرى في أغسطس .

على أننا لا نريد أن ننفي أن هنالك فترة جفاف ما بين أمطار الشتاء والربيع القليلة وأمطار الصيف الغزيرة ، في بعض بلاد الحبشة . وكذلك يحسن بنا أن نذكر أن أمطار الشتاء وأوائل الربيع هي أكثر ظهوراً في شرق الحبشة منها في غربها . وذلك لأن فصل المطر في سواحل البحر الأحمر الغربية هو فصل الشتاء وللأقطار الشرقية لهضبة الحبشة من هذه الحال نصيب وهذه الحالة تبدو بوضوح في هرر . ولهذا الأمطار حيث تسقط أهمية نسبية ، وكثيراً ما تساعد على التبيكير بزراعة الذرة في بعض نواحي الحبشة .

فهذه الاعتبارات تحملنا حقيقة على أن نميز بين مطر الربيع ومطر الصيف . وقد يتساهل بعض الكتاب فيقول بوجود موسمين للمطر في الحبشة . ولكن الزعم بأن في مارس نهاية كبرى للمطر أمر لا تثبته المشاهدات المتيورولوجية الطويلة المدى .

أما من حيث فترة الجفاف التي تفصل بين مطر الربيع القليل ومطر الصيف الغزير فهذه ليست ظاهرة في كل مكان وإن تكن ظاهرة في أديس أبابا نفسها فقد جاء في تقرير بعثة بحيرة طانا (ص ١٨) أنه في ١٥ مايو لم يكن في أديس

أبابا ما يدل على سقوط مطر حديث . فقد كانت الأرض جافة قاحلة . ثم أخذ الهواء يتغير في أواخر مايو . وبدأ قليل من المطر في السقوط . وأما بعد منتصف يونيو فقد كان المطر يهطل كل يوم تقريباً . وكان المألوف أن يكون الصباح صحواً والجو صافياً ، وعند الظهر تلوح السحب وتكفهر السماء . ثم يسقط المطر غزيراً بين الساعة الثانية والرابعة . وبعد هذا تنقشع السحب ويصفو الجو إلى آخر النهار . وقد يسقط المطر مرة أخرى أثناء الشطر الأول من الليل . ويصحب سقوط المطر نهاراً رعد وبرق ، دون أن يشهد هبوب الرياح .

ومن هذا يتضح لنا أن فترة الجفاف بين مطري الربيع والصيف قصيرة وتقع عادة في أواخر مايو وأوائل يونيو .

في شهر أكتوبر يقل المطر فجأة ، فمن ١٩٠ مليمتراً في سبتمبر إلى ٢٠ مم في أكتوبر (في أديس أبابا) . وهكذا ينتهي فصل المطر الغزير فجأة في أواخر سبتمبر كما ابتداء فجأة في منتصف مايو . اللهم إلا تلك البلاد التي يطول فيها موسم المطر للأسباب التي ذكرناها من قبل .

هذا ما يختص بالتوزيع الزماني للمطر . أما التوزيع من حيث المسكان فإننا نلاحظ أن المطر هو بوجه عام أغزر في الجنوب من الشمال وفي الغرب منه في الشرق ، وأغزر الأقاليم مطراً هو تلك الناحية الجنوبية الغربية المركزة حول بلدة جوري وتشمل أعلى السوبات وأعلى نهر ديديسا . فهناك المطر غزير جداً حتى يتجاوز المترين في أكثر السنين .

والمنطقة الغزيرة المطر في الحبشة تمتد على شكل نصف دائرة من أديس أبابا شرقاً إلى جوري وغمبيلا وأعلى نهر بارو غرباً . ثم تنحني جنوباً إلى أعلى نهر أكوبو في الشمال الغربي من بحيرة رودلف ، فمقدار المطر في هذه المنطقة يزيد زيادة محسوسة عنه في بقية هضبة الحبشة ، فالمطر فيها يزيد على ١٢٠٠ ميلليمتراً ثم يقل مقداره تدريجياً في الأقاليم المجاورة ، وهناك إقليم آخر صغير إلى الشرق من بحيرة طانا

مطره غزير . وسبب هذه الزيادة من غير شك هو تلك الجبال العالية الواقعة في شرق البحيرة وفي شمالها .

وبلدة أدامتللو ذات المطر القليل في الجدول السابق ، واقعة في الوادى الأخدودى ، إلى الشرق من بحيرة زواى ، تحيط بها المرتفعات في الجنوب والشمال ، ولذلك قل مطرها كثيراً عن سائر الهضبة .

ويمكننا أن نقول : إن مجموع ما يسقط من المطر في هضبة الحبشة كلها يزيد في المتوسط على الألف مليمتر ، وأن الأقطار التى يسقط فيها دون هذا القدر أقل من الأقطار التى يسقط فيها ما هو أكثر من هذا .

* * *

وقبل أن ننقل من مناخ الحبشة إلى موضوع آخر لا بد لنا هنا من أن نشير إلى تلك المحاورة ، التى لم تحف حدثها تماماً بعد ، عن منشأ أمطار الحبشة . وعما إذا كان مصدرها المحيط الهندى أو المحيط الأطلسى . وبنوع خاص فيما يتعلق بأمطار شهر أغسطس التى تسبب ازدياد الفيضان إلى أعلا مستواه ... والسؤال المهم الذى يجب أن نجيب عنه هو : بأى الظواهر المناخية العالمية يمكننا أن نربط الأحوال المناخية السائدة في أواسط إفريقية وشرقها ، وبنوع خاص في هضبة الحبشة ؟ إن أمطار الحبشة تحملها بالطبع رياح ، وهذه الرياح لا بد أن تهب من منطقة ضغط مرتفع إلى قلب القارة الإفريقية حيث الضغط منخفض في فصل الصيف ، ... ومنطقة الضغط المرتفع التى يدور حولها البحث تمتد على طول المنطقة وراء المدارية في نصف الكرة الجنوبي : أى أن المحيط الهندى والأطلسى الجنوبي كلاهما مركز لضغط مرتفع في فصل الصيف ، فإذا كان هذان العاملان وحدهما ، عامل الضغط المنخفض في إفريقية والضغط المرتفع في المحيطين المجاورين ، هما المسببان للرياح وللأمطار التى تحملها الرياح ، وجب أن تكون الزيادة والنقص في مقدار المطر ، نتيجة تغيير في حالة هذين العاملين قوة وضعفاً ، فإذا كان الضغط

مرتفعاً جداً في المحيطين ومنخفضاً جداً على القارة الأفريقية ، كان هبوب الرياح أشد ومقدرتها على حمل الرطوبة والمطر أكبر . فيكون المطر هطالاً وفيضان النيل عالياً ؛ أما إذا كان الضغط في المحيطين مرتفعاً باعتدال والضغط في القارة الأفريقية منخفضاً باعتدال ، كان هبوب الرياح أيضاً معتدلاً ، والمطر والفيضان عاديين ، أو أقل من المعدل .

لكن هل هذا كل ما هنالك من المؤثرات في مطر الهضبة ؟ بالطبع هنالك مؤثر آخر في غاية الأهمية وهو تضاريس الهضبة نفسها ، الأمر الذي قد يتناساه الباحثون . حقيقة إن تضاريس الهضبة شيء ثابت لا يتغير . ومع ذلك فإن هذه التضاريس تلعب دوراً هاماً سنحاول إيضاحه فيما بعد .

كان أول ما انصرف إليه بحث الباحثين هو أن ينظروا إلى مطر الحبشة كأنه صورة أخرى من مطر الهند : مطر الرياح الموسمية ، التي هي نتيجة الضغط المرتفع على المحيط الهندي ، والضغط المنخفض جداً على أواسط آسيا . فكان همهم أن يربطوا الظاهرتين إحداهما بالأخرى . حتى لقد قرروا بأن سنى المطر الغزير في الهند وسنى الفيضان العالي لنهر النيل متفقات . وكانت هذه النظرية البسيطة السهلة هي السائدة إلى أن جاءت سنة ١٩١٠ ، فأنار المستر كريج عاصفة جدل ، بأن اقترح بأن أمطار الفيضان لا تحملها رياح المحيط الهندي بل رياح المحيط الأطلسي ، وحاول أن يثبت أن اتجاه الرياح الهابة على هضبة الحبشة هو من الجنوب الغربي لا من الجنوب الشرقي . وأن هذا الاتجاه متفق تماماً مع الرياح الهابة على غرب أفريقية وبلاد الكامرون . . . ثم ذهب إلى أبعد من هذا بأن زعم بأن هنالك اتصالاً وثيقاً بين الضغط في جزيرة سنت هيلانة وبين أمطار الفيضان : ووجد أن عامل الاتصال بين الظاهرتين هو + ٦٠.٥^(١)

(١) راجع مقالة E. W. Bliss التي نشرتها الجمعية المتورولوجية البريطانية في سنة ١٩٢٨ والتي عنوانها The Nile Flood and World Weather .

كان ذلك في سنة ١٩١٠ حين لم تكن لدينا معلومات عن الظواهر الجوية
لسنت هلانة إلا لمدة ١٦ سنة . . . مدة غير كافية لتكوين عامل الاتصال : أما
الآن ولدينا من الإحصائيات المناخية لتلك الجزيرة ما تناول عدداً عظيماً من
السنين ، فإن عامل الاتصال بين مناخها وأمطار الحبشة قد سقط إلى ٦ وهو اتصال
حقير لا يعتمد به . وبهذا قد تقوض الركن الأعظم من نظرية المستر كريج :
والحقيقة أنه لم يعد هنالك سبب وجيه لأن يتمسك أحد بهذه النظرية التي تنفيها
مشاهدات عديدة .

ومن أقوى الأسباب التي تدعونا إلى رفض هذه النظرية حالة الرياح التي
تهب على هضبة الحبشة نفسها . فإن هذه الرياح التي تهب على غمبيلا في شهر
أغسطس معظمها من الجنوب الشرقي ولا أثر فيها لرياح جنوبية كالتي قال
بهبوبها المستر كريج ، والتي أرسلت أكثر من بعثة للتحقق من أمرها .

نعود فنتساءل : إذا لم تكن هنالك علاقة بين الضغط الجوي في سنت
هلانة وبين فيضان النيل ، ولم يكن هنالك علاقة ظاهرة بين رياح المحيط الأطلسي
 وأمطار الحبشة ، فما الحال إذن فيما يختص بعلاقة الفيضان بأمطار الهند ؟ إن
نظرية المستر كريج قد طرحت على مسألة علاقة أمطار النيل بأمطار الهند غطاء
من النسيان ولو إلى حين . على أننا يمكننا أن نقول إنه بقدر ما تقوضت نظرية
كريج فقد قويت النظرية القديمة نوعاً : ففي البحث الذي نشره المستر بلس
E. W. Bliss عن فيضان النيل والمناخ العالمي والذي أشرنا إليه ، قد بين لنا بكل
جلاء ووضوح عوامل الاتصال بين الظواهر المناخية المختلفة لعدة بلاد وعدة أقاليم
من جهة وبين فيضان النيل من جهة أخرى . وليست بنا حاجة لأن نثبت هنا كل
ما جاء في بحثه . وحسبنا أن نذكر هنا الأشياء التي تستلقت النظر بنوع خاص :
مثلاً : إن هنالك علاقة بين انخفاض الضغط الجوي في القاهرة في زمن
الصيف وبين فيضان النيل . فالفيضان العالي يصحبه ضغط منخفض في القاهرة :

وعامل الاتصال هو — ٦٤^(١) وهذه النتيجة مبنية على متوسط أرقام ٥٤ سنة . وكذلك هنالك اتصال ما بين الضغط في القاهرة قبل الفيضان مباشرة وبين الفيضان التالى ولكن عامل الاتصال هنا لا يزيد عن — ٤٤ .

كذلك يلفت نظرنا المستر بلس إلى العلاقة العكسية بين فيضان النيل وبين الضغط الجوى في شمال استراليا (بورت دارون) فإذا كان الضغط في بورت دارون منخفضا في الأشهر السابقة للفيضان (مارس — مايو) كان ذلك دليلا على فيضان عال . وعامل الاتصال هنا — ٥٤ والنتيجة مبنية على ملاحظات ٤٤ عاما .

على أن المستر بلس لم يذكر سر هذه العلاقة بين ظاهرة الضغط الجوى في شمال استراليا وبين فيضان النيل .

أما فيما يتعلق بالهند فإن الحالة غريبة في بابها : فنجد أولا أنه من حيث الضغط الجوى عامل الاتصال ضعيف جدا بين فيضان النيل والضغط الجوى في الهند . (كراتشى ولاهور) وهذه العلاقة ضعيفة بنوع خاص في موسم المطر . لكن هنالك مسألة أخرى لعلها أهم من مسألة الضغط الجوى في الهند . وهذه هي الأمطار نفسها التى تسقط في الهند . فهل هناك علاقة بين غزارة أمطار الهند وبين فيضان النيل ؟ . يظهر من أرقام المستر بلس أن هنالك علاقة واضحة وعامل الاتصال هو ٥٤ بناء على مشاهدات خمسين عاما . فهو إذن رقم يمكن الركون إليه قليلا . أى أنه فى ٥٤ ٪ من الحالات يتفق المطر الغزير (أو القليل) فى الهند بالفيضان العالى (أو المنخفض) لنهر النيل . وهذه الحقيقة لا يمكن للأسف الانتفاع بها فى التنبؤ عن الفيضان قبل حدوثه لاتفاق الظاهرتين فى الزمن .

(١) يكون الاتصال كاملا إذا كان العامل ١٠٠ وكلما قرب من هذا الرقم كان الارتباط بين الظاهرتين أقوى ، وإذا كان الرقم سالباً فعنى ذلك أنه إذا نقص الضغط فى القاهرة زاد الفيضان أى أن العلاقة عكسية .

إذن فلم نزل من حيث مقدرتنا على التنبؤ بالفيضان في حالة أولية اجتهادية .
ولا سبيل بعد إلى القطع بشيء في هذا الحادث العظيم قبل حلوله ولو بأشهر قليلة .

* * *

سبق لنا أن أشرنا إلى أن تضاريس هضبة الحبشة قد تلعب دوراً في مسألة
اختلاف المطر من عام لعام . . . وقولنا هذا مستند إلى حقيقة معروفة وهي أنه من
أكبر العوامل التي تسبب غزارة الأمطار هبوب الرياح على المناطق الجبلية بحيث
يكون اتجاهها عمودياً على اتجاه سلسلة الجبال . فإذا كانت هناك جبال متجهة من
الشمال إلى الجنوب فإن الرياح التي تهب من البحار الشرقية أو الغربية وتصطدم
بالجبال باتجاه عمودي ، هذه تكون أغزر مطراً من التي تهب عليها منحرفة ، وكلما
زاد الانحراف كان سقوط الأمطار أقل غزارة .

يتضح لنا من هذا أن مجرد اختلاف يسير في اتجاه الرياح — أيا كان سبب
هذا الاختلاف ولا يعلم بعد أن الرياح يمكن أن تهب في اتجاه هندسى لا يتغير
من سنة إلى أخرى — اختلاف يسير في الاتجاه قد ينجم عنه اختلاف كبير في
سقوط المطر كثرة أو قلة .

وهناك اعتبار آخر : وهو أن الجبال المرتفعة ارتفاعاً رأسياً تسبب سقوط
المطر بغزارة أكثر من الجبال المرتفعة تدريجياً ، إذا تساوت جميع الأحوال الأخرى .
وهضبة الحبشة ، وإن كانت معلوماتنا عن تضاريسها ليست دقيقة الدقة الكافية ،
فإنها لا يمكن أن تكون ارتفاعاتها متشابهة من جميع النواحي . . . إذن فلقد
تسلق الرياح طريقاً في عام وقد تسلك طريقاً آخر في عام آخر ، وأحد الطرفين
ارتفاعاته رأسية باعثة على غزارة المطر والثاني طريقه معبدة وأمطاره أقل غزارة .
وقد أوردنا هذين الاعتبارين لا لنعلق عليهما أهمية كبيرة أو لنجعل منهما
أساساً لنظرية جديدة ، وإنما أردنا أن نبين أن مسألة الأمطار مرتبطة باعتبارات
كثيرة جداً قد لا يكون من الممكن حصرها . أو إدخالها جميعاً تحت حساب

دقيق . ونحن لا ندعى أننا ذكرنا هنا جميع الاعتبارات والاحتمالات ... فقد تكون هنالك أشياء أخرى لم نزل رهن الكشف والاستنباط .

ولا يفوتنا في ختام هذا الحديث أن نذكر نظرية أخرى أدلى بها المتيورولوجي المصرى الأستاذ محمود حامد محمد ، في بحث له عنوانه (فيضان النيل وعلاقته بالظواهر الجوية العالمية) ؛ ونحن نرجو أن يكون كل جغرافى مصرى قد اطلع عليه ودرسه دراسة وافية .. فلا حاجة بنا أن نذكر هذه النظرية إلا بالاختصار . وخلاصتها أن المطر في أعلى النيل إنما يحدث بسبب تصادم « وتلاحم » تيارين . الأول ساخن مصدره المحيط الهندى والثانى بارد نسبياً ومصدره المحيط الأطلسى الجنوبى ، وسقوط الأمطار في أعلى النيل هو نتيجة تفاعل هذين التيارين ^(١) . وأن المطر إذا اختلف من عام لعام فذلك لأن هذا التصادم يقل أو يكثر في عام دون آخر .

* * *

بقى أن نذكر شيئاً عما قد يقال عن العلاقة بين فيضان النيل والبقع الشمسية . وبقع الشمس تزداد بحيث تصل إلى نهايتها الكبرى مرة في كل إحدى عشرة سنة تقريباً وكثير من الباحثين في مواضيع شتى قد لجأوا إلى البقع الشمسية يعللون بها ظاهرة قد أعياهم تعليلها .

وكل ما وصل إليه الباحثون فيما يختص بنهر النيل هو أن هنالك علاقة ما بين ازدياد البقع الشمسية وبين ازدياد مستوى البحيرات الكبرى (بحيرة فكتوريا والبرت الخ) .

وقد أثبت الأستاذ الألمانى كوپن Koppen أن ازدياد البقع الشمسية يصحبه نقص في درجة الحرارة في المناطق الاستوائية بمقدار ١٠° (درجة وعشر درجة) بمقياس فارنهایت ونقص الحرارة معناه نقص في التبخر الذى يفقد البحيرات جزءاً

من مائها . ولهذا يبقى مستواها عالياً . وبالعكس إذا نقصت البقع الشمسية ازدادت الحرارة في الأقطار الاستوائية عن المعدل بدرجة وعشر درجة . فيزداد التبخر ويقل مستوى البحيرات عن المتوسط ، ولهذا قال بروكس بوجود علاقة إيجابية بين كثرة البقع الشمسية وبين ازدياد مستوى البحيرات ^(١) .

ولكن مستوى البحيرات لا يؤثر تأثيراً يستحق الذكر في فيضان النيل . فلا معنى إذن لعليق أهمية على العلاقة بين بقع الشمس وبين الفيضان . خصوصاً أن عامل التبخر هو ذو الخطر الأكبر في مسألة مستوى البحيرات . بينما سقوط الأمطار هو العامل المهم في الفيضان .

* * *

وإذا كان لنا أن نقول شيئاً عند ختم حديثنا عن مناخ الحبشة فهو أننا نأمل أن يزداد علمنا في المستقبل بالأرقام الصحيحة التي لا يشك في صحتها أحد — سواء عن الضغط أو الرياح أو الحرارة أو الأمطار في عدة نقاط في تلك الهضبة ... وستبقى نظرياتنا كلها ضعيفة الاستناد ما دامت الإحصائيات والأرقام ناقصة أو مشكوكاً فيها .

* * *

مناخ القطر المصري :

إذا غادرنا السودان ، وأخذنا ندخل الديار المصرية ، تركنا من خلفنا المنطقة المدارية وأخذنا طريقنا وسط المنطقة الصحراوية : منطقة الجفاف التي يعد سقوط الأمطار فيها من الأعاجيب . منطقة الحر الشديد في النهار والبرودة في الليل مع اختلاف واضح بين الفصول : ندخل منطقة لا تصل إليها رياح الجنوب . منطقة

(١) C. E. P. Brooks : Variations In the Levels of the Central African Lakes.

خارجة عن نفوذ المحيط الهندي والرياح الموسمية التي تحمل الأمطار . منطقة لولا النيل لكانت من أفقر وأجذب أقطار العالم .

علمنا بمناخ القطر المصري أكثر بطبيعة الحال من علمنا بمناخ أى جزء آخر من حوض النيل . وقد نشرت مصلحة الطبيعيات نشرات ورسائل قيمة عن مناخ القطر المصري ، وعن بعض المحطات المتيورولوجية الهامة كحلوان (المسترسقون L. G. Sutton) ، والإسكندرية (لمحمود حامد محمد) وكذلك قد نشر الأستاذ حامد كتاباً عن الظواهر الجوية فى القطر المصري ، يجب أن يكون فى حوزة كل من يدرس جغرافية مصر .

على أن هنالك وجهة لدراسة مناخ القطر المصري يجب أن يتجه إليها نظر الباحثين ، وبأبأ لم يطرقه أحد بعد على أهميته . ذلك أن المهم فى دراسة مناخ مصر ليس مجرد الإلمام بالإحصاءات الدقيقة للحرارة والضغط والرياح والرطوبة والمطر لمحطات عديدة مبعثرة فى أنحاء البلاد ؛ هذا وأمثاله ضرورى هام . . . ولكن الأهم أن نستعين بهذه الإحصاءات على إظهار الفروق بين مختلف نواحي البلاد . وتعيين الأقاليم المناخية الرئيسية للقطر المصري . . . فهذه الطريقة وحدها يتسنى لنا أن نمثل لأعيننا صورة واضحة لحالة القطر المناخية .

لقد ذكرنا فى مقدمة هذا الفصل المؤثرات المناخية العالمية التى تنتاب حوض النيل . . . ورأينا كيف يتأثر النصف الشمالى بالانخفاضات الآتية من جهة المحيط الأطلسى (أى من جهة الغرب) وأن هذه الانخفاضات قل أن يصل تأثيرها إلى النصف الجنوبى من أرض مصر .

إذن يكون من أهم ما نعى به الآن أن نبين الأقاليم المصرية التى تتأثر بانخفاضات البحر الأبيض ، والأقاليم التى لا تتأثر بها . ويكون هذا بمثابة التقسيم الأول للقطر المصري من الوجهة المناخية .

الانخفاضات التي تؤثر في القطر المصري تأتي من غرب البحر الأبيض وتسير متجهة إلى الشرق . وفي اقترابها من القطر المصري لا تسلك دائماً سبيلاً واحدة ولا سبلاً متشابهة فقد يكون مركز الانخفاض إلى الشمال الغربي : على البحر الأدرياتي وشبه جزيرة البلقان . وقد يكون الانخفاض مرابطاً فوق الأناضول وجزيرة قبرص ، أو فوق أرمينيا وسورية ، أو يكون فوق واحة سيموه ثم يقترب حتى يربط على الدلتا . وقد يكون مركزه فوق شبه جزيرة سيناء^(١) .

وهذه الانخفاضات تؤثر بالطبع في اتجاه الرياح . وتكون هذه الرياح حارة أو باردة ، جافة أو ماطرة حسب منشأها والأقاليم التي مرت بها . فإذا كان الانخفاض واقعاً فوق شبه جزيرة سيناء ، كانت الرياح بالطبع أقرب إلى الغربية وإذا كان الانخفاض بعيد الغور فإن هذه الرياح الغربية تكون شديدة وتحمل مطراً غزيراً .

وإذا كان الانخفاض واقعاً على واحة سيموه كانت الرياح الهابة على الوجه البحري شرقية ، أو جنوبية شرقية ، فإذا كان هذا في الربيع تكون هذه الرياح حارة جافة كما سنبينه عند كلامنا على رياح الخماسين .

وبالطبع ليس معنى ذكرنا لمواقع الانخفاضات بالنسبة إلى القطر المصري أن هذه الانخفاضات مطردة منتظمة تسير في طرق مألوفة لا تعدوها ، بل إنها ربما رابطة في مواضع متوسطة بين المواضع التي ذكرناها أو مختلفة عنها . . وما على القارئ الذي يطالع الخريطة الجوية اليومية للقطر المصري إلا أن يتأكد من أشياء ثلاثة لكي يتضح له تأثير الانخفاض .

(١) عمق الانخفاض : فإن الانخفاضات الضحلة قد تمر بالقطر المصري دون أن يشعر بها أحد .

(١) راجع كتاب الظواهر الجوية ص ٢٣ وما بعدها . وبنوع خاص الحرائط المرسومة في ص ٢٤ وما بعدها .

(٢) اتجاه الرياح التى يسببها هذا الانخفاض . وبالتالى الأقاليم التى تهب منها الرياح .
(٣) حالة هذه الأقاليم من حيث الحرارة والبرودة ، ومن حيث الرطوبة والجفاف ؛ فالرياح الجنوبية الشرقية تسبب ازدياداً عظيماً فى الحرارة والجفاف فى شهر أبريل مثلاً . ولكنها قلما تسبب ازدياداً فى الحرارة فى يناير وفبراير .
فتى أدركنا هذه الاعتبارات الثلاثة ؛ سهل علينا أن نقبين العلاقة ما بين الأحوال الجوية السائدة ، وحالة الضغط الجوى كما هو مبين فى خرائط الطقس اليومية التى كانت تنشرها مصلحة الطبيعيات .

* * *

هذه الانخفاضات الجوية كثيرة الحدوث فى أشهر الشتاء والربيع . وهى نادرة فى شهر يونيو ، ومنعدمة تماماً فى أشهر الصيف وأوائل الخريف . وربما كان أظهر تأثير لهذه الانخفاضات هو ما تحدثه من تغيير فى اتجاه الرياح . فالقطر المصرى فى العادة عرضة لهبوب الرياح الشمالية التى تهب باطراد على سائر القطر فى أشهر الصيف . وليس هنالك شهر تنقطع فيه الرياح الشمالية انقطاعاً تاماً .
فهذا الاطراد لا يحتل إلا عند مرور هذه الأعاصير ، التى تقلب نظام الرياح فتجعلها غربية أو جنوبية أو شرقية أو بين هذه الاتجاهات .

وإذا حاولنا إذن أن نعرف الأقاليم المصرية التى تتأثر بهذه الانخفاضات والجهات التى لا تتأثر بها ، فلعل الطريقة الوحيدة التى أمامنا هى أن ندرس الأرقام التى تبين اتجاه الرياح فى مختلف بلاد هذا الوادى الطويل . . فإذا دلت الأرقام على أمرين : (١) ضعف ريح الشمال وقلة هبوبها . (٢) ظهور رياح أخرى ذات اتجاه آخر ، كان هذا وذاك دليلاً على تأثير هذا الإقليم بالأعاصير . إذن فلنبداً باستعراض هذه الأرقام ولنحصر اهتمامنا بالأشهر الثلاثة الأولى يناير وفبراير ومارس التى هى عادة أكثر تعرضاً للأعاصير من سواها .

معقول جداً أن يكون أكثر أقاليم القطر المصري تعرضاً للانخفاضات هو ساحل البحر الأبيض لاقتربه من طريق الأعاصير . فلنبداً إذن بمدن الشمال ثم نمضى نحو الجنوب . ففي الإسكندرية : نرى أن الرياح الهابة من الشمال والشمال الشرقى تقل قلة كبرى في شهر يناير ومارس بحيث لا تزيد نسبتها عن ١٥ ٪ وإلى أقل من هذا في شهر فبراير . بينما تزيد نسبة الرياح الجنوبية والغربية والجنوبية الغربية إلى نحو ٤٠ ٪ في شهر يناير و ٥٠ ٪ في شهر فبراير .

وهذه الظاهرة بعينها أكثر ظهوراً في بور سعيد حيث تقل نسبة الرياح الشمالية إلى ٥٤ ٪ والشمالية الشرقية إلى ٧٧ ٪ في شهر يناير . بينما تزيد نسبة الرياح الجنوبية إلى ١٠٣ ٪ والغربية إلى ٢٤٧ ٪ والجنوبية والجنوبية الغربية معاً إلى ٢١ ٪

ونرى الظاهرة مرة أخرى في القرشية والزقازيق ... ولكن بالطبع بشكل أخف نوعاً^(١) . وفي الجيزة نرى أن نسبة ريح الشمال تنخفض في يناير إلى ٧٤ ٪ والرياح الشمالية الشرقية إلى ٢٨٨ بينما نسبة الرياح الجنوبية ١٧٦ والجنوبية الغربية ١٥٨ ٪

فإذا ذهبنا جنوباً نحو صعيد مصر نجد أن نقص الرياح الشمالية في يناير وإن كان محسوساً إلا أنه لا يعادل ما نشاهده في الأقاليم الشمالية . ففي حلوان نسبة الرياح الشمالية ١٣٤ ٪ والجنوبية ١٤٨ .

وفي قصر الجبالى تكون نسبة الرياح الشمالية في فبراير ٣٥ ٪ والجنوبية ١٩ ٪ فنحن هنا في الإقليم الانتقالى ما بين المنطقة التى تتأثر بأعاصير البحر الأبيض . والمنطقة التى لا تتأثر بتلك الأعاصير . فإذا نحن بلغنا المنيا وصلنا ، أو اقتربنا من المفاصل الحقيقى للمنطقتين . ونظراً لأهمية هذه المنطقة نورد هنا الأرقام الدالة على النسبة المثوية لهبوب الرياح في المنيا :

(١) راجع أرقام اتجاه الرياح ص ١٦ و ١٧ كتاب مصلحة الطبيعيات Climatological Normals لعام ١٩٣٨ .

شمالية	شمالية شرقية	شرقية	جنوبية شرقية	جنوبية	
يناير	٢٦٧	٩٧	٦١	١٠٠	١٤
يوليه	٧٢٩	٣٠	٠٤	٠٧	—
جنوبية غربية	غربية	شمالية غربية	سكون		
يناير	٣٦	٣٦	٩٣	٢٩٧	
يوليه	٠٤	١٣	١٤٥	٦٨	

والذى نشاهده فى أرقام شهر يناير ثلاثة أمور : أولاً قلة الرياح الجنوبية والغربية وغيرها من الرياح المتأثرة بالأعاصير ، ثانياً زيادة نسبة الرياح الشمالية زيادة محسوسة خصوصاً إذا أضفنا إليها الرياح الشمالية الشرقية والشمالية الغربية . ثالثاً زيادة نسبة فترات السكون ، زيادة كبرى (٢٩٧ ٪) فى شهر يناير و ٣٠٨ ٪ فى شهر ديسمبر : نسبة لا نظير لها فى الشهور الأخرى .

والذى لا بد لنا أن نستنتجه من هذا هو أن أعاصير البحر الأبيض لا تنفذ إلا بدرجة محدودة إلى المنيا حتى فى أشهر الشتاء . وأن هذا الإقليم فى تلك الأشهر إما أن تهب عليه الرياح الشمالية لأن منطقة الضغط المرتفع واقعة فى شماله . وإما أن تسود فيه حالة سكون لأنه هو نفسه مركز لمنطقة ضغط مرتفع . فإقليم المنيا أو إلى شمال المنيا قليلاً يعتبر الحد الفاصل بين الإقليم المتأثر بأعاصير البحر المتوسط وبين الأقاليم الجنوبية التى لا تتأثر بهذه الأعاصير إلا نادراً .

وليس فى وسعنا أن نزيد فى تحديد الخط الذى يفصل المنطقتين لأننا ليس لدينا أرقام عن الرياح ما بين قصر الجبالى والمنيا .

ومتى تجاوزنا المنيا وذهبنا إلى أسيوط دخلنا فى المنطقة التى تسود فيها الرياح الشمالية عموماً والشمالية الغربية خصوصاً ، طول العام . ونسبتها معاً فى أسيوط تزيد على ٦٧ ٪ فى شهر يناير . وأما أسوان فقد سبق أن بينا للقارى أنها هى

أكثر بلاد وادى النيل تأثراً بالرياح الشمالية . فلا تكاد أن تهب عليها رياح أخرى في كل شهر من شهور السنة ^(١) .

هكذا إذن نصل إلى تقسيم وادى النيل (في مصر) تقسيماً مبدئياً من الوجهة المناخية إلى الإقليم الواقع جنوب المنيا وهو لا يتأثر بالأعاصير الشتوية ، والأقليم الواقع شمالها الذى يتأثر بقلك الأعاصير تأثراً مطرداً . . . ولقد يعترض علينا أن تقرير هذه الحقيقة إنما يقسم البلاد بقاء على ظاهرة مناخية واحدة . قد لا تكون ذات أهمية في نظر كثير من الناس . ولكن الحقيقة التي لا يتسنى إنكارها ، هي أن مرور الانخفاضات الشتوية والربيعية بالقطر المصرى . هو أكبر ظاهرة ، تسبب تغييراً في طقس مصر وفي مناخ مصر . ولو لم تكن هذه الانخفاضات لما حدثت بمصر أمطار شتوية ، ولا هبت بها رياح الخماسين ولا العواصف الرعدية البرقية ، ولما اختلفت مهبات الرياح . وبدونها يكون مناخ مصر عبارة عن شيء واحد مطرد على طول السنين : مناخ حار في الصيف دافئ في الشتاء ، مع اختلاف كبير بين حرارة الليل والنهار ، ورياح شمالية دائمة لا تتغير . . . لكن الأعاصير الشتوية والربيعية تغير من هذا النظام المطرد ، وتوجد تلك الاختلافات التي نعرفها .

بعد هذا ننقل إلى النظر في مناخ كل من هذين الإقليمين . فأما الإقليم الجنوبي فلا تختلف أجزاؤه من حيث المناخ اختلافاً كبيراً . لأنها كلها متأثرة بعوامل واحدة ، والأرقام الآتية ترينا معدل الحرارة في كل من أسوان وقنا وأسيوط والمنيا : والجدول التالى يدل على نفسه دلالة واضحة لا تكاد أن تحتاج إلى أى تعليق . فالحرارة متشابهة في نظامها في كل هذا الإقليم . . . وشهر يناير أقلها حرارة بينما شهر يوليو أشدها حراً . والحرارة بالطبع أكثر في الجنوب وتقل تدريجاً نحو الشمال . . . ومتوسط الحرارة في الشهر لا يكفي لأن يرينا الحالة الحقيقية للحرارة . بل لا بد

(١) سجلت الأرصاد سقوط قطرات من المطر في أسوان في بعض السنين النادرة على سبيل الشذوذ . وهذا لا ينقص صحة هذه النظرية .

البلدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	متوسط الشهور
المنيا	١٣,٢	١٤,٤	١٨,٢	٢٢,١	٢٤,٨	٢٧,٩	٢١,٨
أسيوط	١١,٦	١٣,٣	١٧,٢	٢٢,١	٢٦,٠	٢٨,٨	٢١,٦
قنا	١٤,٩	١٧,٧	٢١,٧	٢٥,٦	٢٨,٤	٣١,٦	٢٤,٧
أسوان	١٥,٠	١٧,٠	٢٠,٩	٢٥,٧	٢٩,٤	٣٢,١	٢٥,٢
البلدة	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	متوسط الشهور
المنيا	٢٨,٨	٢٨,٥	٢٥,٩	٢٤,١	١٩,٥	١٤,٤	٢١,٨
أسيوط	٢٩,٤	٢٩,١	٢٦,٣	٢٣,٥	١٨,٢	١٣,٥	٢١,٦
قنا	٣٢,٣	٣١,٧	٢٩,٤	٢٦,٢	٢١,٢	١٦,٤	٢٤,٧
أسوان	٣٢,٨	٣٢,٤	٣٠,٤	٢٧,٦	٢٢,١	١٦,٧	٢٥,٢

لنا من أن نبين النهاية الكبرى والنهاية الصغرى واختلاف حرارة الليل والنهار .
وفي الجدول الآتي بيان لهذا مكثفين بإيراد أرقام شهرى يناير ويوليو :

البلدة	يناير			يوليو		
	نهاية كبرى	نهاية صغرى	الفرق	نهاية كبرى	نهاية صغرى	الفرق
أسيوط	٢٠,١	٥,٨	١٤,٣	٣٧,١	٢٢,٦	١٤,٥
أسوان	٢٣,٧	٩,٦	١٤,١	٤١,٨	٢٥,٦	١٦,٢

فترى في هذا الجدول أن نظام الحرارة متشابه تشابهاً كثيراً في الحالين ، وإن
اختلف في المقدار فلا يوجد أى خلاف في النوع فكلها من نوع واحد . ففي
الشتاء ترتفع الحرارة نهائياً إلى ٢٣,٢٠ درجة ويكون هذا بالطبع حوالى الساعة

الثانية بعد الظهر . ثم يقل في الليل حتى يصل قبيل شروق الشمس إلى نحو ٢٦ درجة درجات . فيكون الحرارة المعتدلة في النهار ، التي تجذب السائحين إلى الأقصر وأسوان ، يصحبها برودة محسوسة أثناء الليل . بحيث يبلغ اختلاف حرارة الليل عن حرارة النهار أكثر من ١٤ درجة .

وأما في الصيف فترتفع الحرارة في أسيوط أثناء النهار إلى ٣٧° ولكنها في أسوان تصل إلى ما يقرب من ٤٢° : وهي درجة حرارة عالية جداً لولا جفاف الهواء لسكانت أكثر مما تتحملة الطاقة البشرية . ثم تنخفض الحرارة في الليل في أسيوط إلى ٢٢° وفي أسوان إلى ٢٥° فيكون الاختلاف اليومي ١٤° في الأولى ونحو ١٦° في الثانية .

فمناخ هذا الإقليم كله إذن مناخ صحراوي قارى لا ينزل فيه شيء من المطر اللهم إلا القليل الشاذ النادر ، الذي قد يحدث عاماً ثم ينقطع سنين عديدة حتى يتناساه الناس إلى أن تجد حالة شاذة أخرى فتعيد ذكرى نظيرتها التي نسيت . ومثل هذا المطر إذا نزل كان نتيجة زوبعة إعصارية قد خرجت عن طريقها المألوف ، فأنزلت ما بها من مطر غزير هطال في ساعة أو في أقل من ساعة ، يهيم فيها المطر غزيراً كأنما ينصب من أفواه القرب ، ثم ينقطع فجأة ويصحو الجو وتنقشع السحب . ولا يبقى من ذكر ذلك الواابل القصير المدى سوى سيول تجري في الأودية التي تخرق صحراء مصر على جانبي وادى النيل . هذا النوع من المطر الذي قد لا يحدث سوى مرة في عشر أو عشرين عاماً . هو النوع الصحراوي الذي يكاد يكون خاصاً بالأقاليم الصحراوية ، والذي يغذى أعشابها وأشواكها فينعشها من ذبولها وجفافها الطويل .

هذا النوع من المطر قد يحدث في بلاد أخرى غير الإقليم الواقع جنوب المنيا بل هو كثير الحدوث شمال تلك المدينة وفي إقليم القاهرة . . . ولكن لهذه

الأقاليم الشمالية حظ أوفر من المطر . ولهذا لزم التفريق بينهما .

* * *

إذا جاز لنا أن نعتبر المنطقة الجنوبية إقليماً واحداً — وقد أقننا الأدلة الكافية على تشابه نواحيها من الوجهة المناخية — فإنه لا يجوز لنا أن نعتبر الجزء الممتد بين النيا والبحر المتوسط إقليماً واحداً ، حقيقة أنه يتأثر كله بتلك الأعاصير التي تنحدر من غربي البحر الأبيض المتوسط إلى شرقيه . ولكن ليس تأثر هذه المنطقة كلها واحداً .. ولهذا يحسن أن نميز بين أجزائها المختلفة وأن نقسمها إلى أقاليم ثانوية .
والعامل البديهي الذي يمكننا أن نتخذه أساساً لهذا التقسيم هو المطر ؛ فإنه وحده يجعل هنالك فرقاً محسوساً بين سواحل البحر المتوسط مثلاً وبين إقليم القاهرة وحلوان .

وإن نظرة نلقينها على خريطة توزيع المطر في مصر السفلى لسكافية بأن تريننا فرقاً ملحوساً بين إقليم بني سويف والقاهرة مثلاً ، وبين إقليم القاهرة والإسكندرية ، فإذا أردنا تقسيم مصر السفلى على هذا الأساس ، فليكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام :

(١) القسم الأول : الصحراوي وهو الذي يشابه مصر العليا في ندورة أمطاره ، فإن ما يسقط فيه من المطر لا يزيد على ٢٥ ملليمترًا . وهذا الإقليم واقع جنوب خط ممتد من جنوبي السويس إلى بحيرة قارون ، واتجاهه من الغرب إلى الشرق بانحراف قليل إلى الشمال الشرقي .

(٢) الإقليم الثاني : القليل المطر . ويتراوح ما يسقط فيه من المطر بين ٢٥ و ١٠٠ مم وفي هذا الإقليم تقع حلوان والقاهرة وبنها وطنطا والمنصورة والزقازيق والحد الشمالي لهذا الإقليم هو خط المطر ١٠٠ ملليمترًا الممتد من جنوبي دمنهور إلى غربي بورسعيد ، بانحراف إلى الشمال الشرقي .

وهذه المنطقة انتقالية بين الإقليم الصحراوي جنوباً وإقليم البحر المتوسط شمالاً والمطر في شطرها الجنوبي أقل منه في شطرها الشمالي . فمقدار المطر في حلوان ٣٤ ملليمتر وفي العباسية ٣٢ وفي الزقازيق ٢٩ وفي كفر الزيات ٥٦ وفي القرشية ٦٠ — على أن الذي يميز هذه المنطقة عن سابقتها ليس مقدار المطر فقط . بل انتظام سقوطه ؛ فالشدوذ هنا أن تمر سنته دون أن تسقط أمطار . أما في المنطقة الصحراوية فإن سقوط المطر بمقدار محسوس هو الظاهرة النادرة .

(٣) أما الإقليم الثالث فهو إقليم البحر الأبيض المتوسط . وفي النظام المناخي العالى نوع من المناخ اسمه مناخ البحر المتوسط يتميز بمطر الشتاء وجفاف الصيف . فهذا الإقليم من أرض مصر هو الذي يمكننا — مع شيء من التسامح — أن ندخله في إقليم البحر الأبيض المتوسط . وليست سواحل مصر بالكثيرة المطر كثرة تعادل سواحل فرنسا وإيطاليا واليونان وسوريا ... ولكنها إذا اختلفت في المقدار فإنها متفقة في النوع . فأمطار هذه الأقاليم كلها نتيجة أحوال مناخية متشابهة ومتأثرة في كثير من الأحيان بعوامل واحدة . وفي سواحل القطر المصري مناطق صغيرة — كإقليم مريوط — يعيش أهلها من نتاج الأرض التي يسقيها المطر ولا يرويها النيل . فالبدوى بالقرب من مريوط زرع قطعة أرضه شعيراً لا يعتمد في ريه على فيضان النيل بل على مطر قليل تأتي به شهور الخريف والشتاء . ورخاء ساكن تلك النواحي مرتبط بسقوط هذا الغيث . فتتزل بنزوله البركة وتمنع أو تقل بامتناعه .

ويتراوح ما يسقط من المطر حول هذا الإقليم — الذي سميناه إقليم البحر المتوسط ، بين ١٠٠ و ٢٠٥ ملليمترات . وهو أقل في الشرق منه في الغرب . فهو في رشيد ١٥٣ مم وفي دمياط ١٢٤ و. وهو في الإسكندرية ٢٠٤ ملليمتر وفي بور سعيد ٨٣ . . وهذا الفرق الكبير يحتاج من غير شك إلى تعليل . والسبب الذي نعزو إليه هذا الاختلاف هو تقوُّس سواحل الدلتا . فالجزء المحصور بين

فرعى دمياط ورشيد بارز داخل فى البحر ، بحيث أصبحت السواحل مختلفة الاتجاهات . فمن إقليم مريوط إلى رشيد يتجه الساحل من الجنوب الغربى إلى الشمال الشرقى . ومن رشيد إلى دمياط يكون من الغرب إلى الشرق تقريبا مع تقوسات هنا وهناك . ومن دمياط إلى القرما (Pelusium) يكون اتجاه الساحل من الشمال الغربى إلى الجنوب الشرقى .

وأكثر هبوب الرياح التى تحمل المطر إلى سواحل مصر يكون إما من الغرب أو من الشمال الغربى . وفى كلا الحالتين نرى ساحل الإسكندرية ومريوط ورشيد يعترض هبوب هذه الرياح اعتراضا . ولا شئ أودعى إلى سقوط الأمطار من اعتراض السواحل أو الجبال هبوب الرياح الرطبة . فإذا مرت الرياح القربية على الدلتا أسقطت جزءا عظيما من أمطارها ووصلت إلى بور سعيد وحولتها من المطر قليلة .

أما إذا هبت الرياح الماطرة من الشمال الغربى فإن اتجاه هبوبها يكون موازيا لساحل البحر عند بور سعيد . ومعلوم أن المطر يقل سقوطه إذا كانت الرياح التى تحملها تهب موازية للساحل . ومن حيث نظام سقوط المطر على سواحل البحر الأبيض فإن الإسكندرية مثال حسن لهذا النظام :

المجموع	يونيو	مايو	ابريل	مارس	فبراير	يناير
٢٠٤	٠	١	٤	١٣	٢٤	٥٣
	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو
مليمتر	٦٧	٢٤	٧	١	٠	٠

الإسكندرية

فأشهر الصيف جافة تماماً وقد حدث أن سقطت قطرات من المطر في شهرى يونيو وأغسطس على وجه الشذوذ . ويبدأ سقوط المطر قليلاً جداً في نهاية سبتمبر . ثم يزيد في أكتوبر ونوفمبر حتى يبلغ النهاية العليا في ديسمبر حيث يسقط من المطر مقدار ٦٧ ملليمترًا ثم يقل بعد ذلك حتى يكاد ينعدم تماماً في الربيع . ونظام المطر في بور سعيد ورشيد ودمياط لا يختلف كثيراً عنه في الإسكندرية اللهم إلا في مقدار المطر . وسوى أن المطر في دمياط أكثر ما يكون في شهر يناير لا في شهر ديسمبر .

بقى أن نقول كلمة عن الحرارة في مصر السفلى . وما قدمنا ذكر المطر هنا إلا لأنه الفارق الحقيقي بين الأقاليم المختلفة . على أن هنالك أيضاً اختلافات جوهرية في الحرارة بين سواحل البحر الأبيض وبين إقليم القاهرة وحلوان مثلاً . إن الجدولين اللذين في الصفحة الآتية ينطقان بوضوح بالفرق الجوهرى بين مناخ القاهرة والإسكندرية :

(١) فالإسكندرية أدفأ في فصل الشتاء لا من القاهرة وحلوان فقط بل هى أيضاً أدفأ باعتبار المتوسط من أكثر بلاد الصعيد . وهى في الوقت نفسه أقل حرارة في الصيف من القاهرة . فالاختلاف الشهري أقل في الإسكندرية منه في أكثر بلاد القطر المصرى .

(٢) إن الفرق بين النهاية الكبرى والنهاية الصغرى في الإسكندرية يبلغ ٧ أو ٨ درجات : أى أن الليل أدفأ ، كما أن حرارة النهار ألطف ، منها في القاهرة . فآثر المناخ الصحراوى هنا قليل جداً .

وهذه الظاهرة وسابقتها ترجعان بالطبع إلى تأثير البحر والرياح التى تهب من البحر ، فإن البحر يحتفظ بالحرارة بينما يفقدها اليابس بسرعة . كما أن الماء لا تزداد حرارته بنفس السرعة التى تزداد بها حرارة اليابس .

(٣) هذه الظواهرات سهلة التعليل ، ولكن مما لا يسهل تعليله أن يكون

جدول لدرجات الحرارة في مصر السفلى

السنة	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليه	يونيه	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	
٢٠٥	١٣,٨	١٨,٦	٢٢,٩	٢٥,٠	٢٧,١	٢٧,٣	٢٦,٣	٢٣,٦	٢٠,١	١٦,٣	١٣,٣	١٢,١	حلولان
٢٠١	١٣,٣	١٧,٨	٢٢,١	٢٤,٥	٢٧	٢٧,٢	٢٦,١	٢٣,٤	١٩,٨	١٦	١٣	١١,٥	العباسية
١٩	١٢,٤	١٦,٩	٢١,١	٢٣,٦	٢٦	٢٦,٣	٢٤,٩	٢١,٧	١٨	١٤,٥	١١,٦	١٠,٤	الفرشية
١٩,٨	١٥,٢	١٩,١	٢٢,٨	٢٤,٦	٢٥,٦	٢٥	٢٣	٢٠,٣	١٧,٦	١٥,٦	١٤	١٤,٤	كوم الناضورة

يوليو				يناير				الموضع
الفرق	النهاية الصغرى	النهاية الكبرى	الفرق	النهاية الصغرى	النهاية الكبرى	الفرق		
١٤,٤	٢١,٥	٣٥,٤	١١,٣	٧,١	١٨,٤	١٨,٤	العباسية	
٧,٥	٢٢,٤	٢٩,٩	٨,٢	١٠,٢	١٨,٤	١٨,٤	كوم الناضورة	

شهر أغسطس هو أكثر شهور السنة حرارة بينما في بلاد القطر الأخرى يوليه هو أحر الشهور ؛ وقد لاحظ هذه الظاهرة المستر كريج في مقالة نشرها سنة ١٩١٣^(١) وعلاها بأنها هي أيضاً نتيجة تأثير البحر . فالإسكندرية ، نظراً لأن أكثر ما يهب عليها من الرياح من جهة البحر ، كانت حرارة البحر أكثر تأثيراً في مناخها من حرارة البر . ومعلوم أن البحر أبطأ من البر في امتصاص الحرارة الشمسية ، وأبطأ في فقدانها بالتشعع . فلهذا ليس يبدع أن يتخلف شهر الحرارة القصوى في الإسكندرية عنه في القاهرة ، ومقدار التخلف هذا من ١٥ إلى ٢٠ يوماً .

هذه هي الخواص الرئيسية لمناخ الإسكندرية وهي جميعها كما رأينا نتيجة موقع هذه المدينة على ساحل البحر الأبيض .

وخلاصة هذا البحث إذن أننا إذا حاولنا تقسيم القطر المصري إلى مناطق مناخية فأول شيء يخطر لنا أن نقسمه إلى إقليمين كبيرين : جنوبي لا يتأثر إلا نادراً بالأعاصير الشتوية والريحية ؛ وشمالي يتأثر بهذه الانخفاضات . . ثم بدا لنا أن نقسم الإقليم الأخير إلى أقاليم صغيرة : الأول صحراوي ، والثاني قليل المطر ، والثالث إقليم البحر المتوسط .

هذا التقسيم بالطبع لا يشمل سائر القطر المصري ، فإن بحثنا هنا قاصر على وصف جغرافية حوض النيل . وهناك مناطق أخرى تصلح لأن تكون أقاليم مستقلة مثل سواحل البحر الأحمر وشبه جزيرة سيناء وغيرها مما هو خارج عن حدود هذا الكتاب .

المهم أن يدرك القارئ أنه ليس من السهل فهم مناخ أى مملكة أو منطقة ما لم نحاول أن نتبين الفروق التي تميز بين الأقاليم المختلفة في داخل تلك المنطقة ؛

(١) راجع C. S. J. عدد ٨٠ وعنوان المقالة The Effect of the Mediterranean

Sea on The Temperature in Egypt.

ومن غير هذا تبقى الصورة التي في أذهاننا عن مناخ البلاد التي ندرسها صورة مبهمه مختلطة .

رياح الخماسين :

لقد أكرثنا في هذا الفصل من ذكر الرياح شمالية كانت أو غربية أو غير ذلك ، فلا حاجة بنا لأن نفرد لها بحثاً خاصاً . على أنه لا بد لنا أن نقول كلمة عن الرياح المعروفة بالخماسين نظراً لأهمية الموضوع .

الشائع بين الناس أن الخماسين رياح تهب في أثناء الخمسين يوماً التالية ليوم شم النسيم . وهذه الفكرة لا تستند على أى أساس علمي . فإن يوم شم النسيم نفسه ليس بتاريخ محدد . وموقعه في شهور الربيع قد يتغير من عام لعام طبقاً للحساب الخاص به . فلا علاقة بين هذا اليوم الغير المحدد وبين ظاهرة مناخية لها فصل خاص وموسم خاص ، مع العلم بأن يوم شم النسيم قد يحىء في أوائل مايو (كما حدث في عامي ١٩٢٩ و ١٩٤٨) مع أن هبوب رياح الخماسين هو أكثر ما يكون في شهر أبريل . فكيف يكون يوم شم النسيم هو أول الخماسين في حين أن الشطر الأعظم من موسم الخماسين قد انتهى ؟ . . .

والحقيقة أن المدة التي قد تهب فيها رياح الخماسين تبدى جدّاً من شهر فبراير وتنتهى في منتصف يونيو . ورياح الخماسين عبارة عن رياح تهب من الجهات الجنوبية (والجنوبية الشرقية والغربية) على مصر السفلى . وسبب هبوبها مرور انخفاضات آتية من الغرب . وقد قسم المستر ستون^(١) هذه الانخفاضات إلى نوعين : الأول الانخفاضات الآتية على طول البحر الأبيض المتوسط . والثاني الانخفاضات القادمة من الصحراء الليبية . والنوع الأول كثير الحدوث في شهر فبراير والنوع

L. J. Sutton A Barometric Depression of the Khamsin Type. (١)

الثانى هو النوع الغالب فى أبريل ومايو؛ وأما فى شهر مارس فيكون النوعان بمقادير متساوية . . ويستنتج من هذا أن طريق الأعاصير فى الشتاء يكون إلى شمال سواحل مصر، وجنوبها فى أشهر الربيع .

وأكثر الأشهر تعرضاً لهبوب الرياح الخماسينية هو شهر أبريل . ويقول المستر ستون إنه قد أحصيت الانخفاضات فى مدى ستة عشر عاماً فبلغ عددها ١٨٥ منها ٤١ فى فبراير و ٤٤ فى مارس و ٤٨ فى أبريل و ٤٣ فى مايو و ١٨ فى يونيو . لكن هذه الأرقام تحتاج لشيء من الشرح . فإن انخفاضات شهر فبراير تنشأ عنها رياح خماسينية قصيرة المدى تدوم نحو يوم أو يومين . بينما الانخفاضات الصحراوية فى شهر أبريل ومايو تسبب رياحاً حارة خماسينية تدوم ثلاثة أيام بل أربعة أيام أحياناً ، وعدا هذا فإن رياح فبراير ولو أنها تهب من الجنوب ، فإنها تهب فى وقت لم يتم فيه بعد تسخين الأقطار الجنوبية . ونظراً لقصر مدة هبوب الرياح ، لأنها ليست بعد رياحاً شديدة الحرارة ، فإنها تمر دون أن يشعر أحد بأن هناك خماسين . اللهم إلا إذا كانت الانخفاضات بعيدة الغور والرياح شديدة الهبوب — كما يحدث كثيراً فى فبراير — فيتثير تراباً وغيثاً وتضطربنا لأن نشكو من (أمشير الأرعن) ؛ وأما فى شهر أبريل فتكون الشمس قد سامت دائرة الاستواء . والأقطار الجنوبية سُخِّنت تسخيناً شديداً . فإذا مرَّ الانخفاض على سواحل مصر هبت من الصحارى الجنوبية رياح ساخنة حارة وكثيراً ما تحمل معها مقداراً كبيراً من الرمال . وهذه هى التى يعرفها الجميع بأنها هى رياح الخماسين حقا . مع أن جميع العوامل التى سببتها هى بعينها التى تسبب نظائرها فى شهرى فبراير ومارس .

وعلى العموم يمكننا القول بأن الانخفاضات المتأخرة (أبريل ومايو ويونيه) تسبب رياحاً أشد حرارة وجفافاً من الانخفاضات المبكرة . والخماسين فى شهر الربيع ليست أشد حرارة فحسب بل هى أيضاً تدوم مدة أطول . ولذا كررنا هنا بعض الانخفاضات الخماسينية التى حدثت وظل ذكرها عالفا بأذهاننا منا غير قصير :

(١) الانخفاض الذى مر بمصر السفلى فى آخر مايو وأول يونيو سنة ١٩١٤ فسبب ارتفاع درجة الحرارة فى القاهرة إلى ٤٥° (١).

(٢) الانخفاض الذى حدث فى منتصف يونيو سنة ١٩١٥ فهبت الرياح الخماسينية حارة ، شديدة الحرارة ، وبلغت درجة الحرارة فى العباسية ٤٥° ، وفى حلوان ٤٦.٣° .

(٣) الانخفاض الذى مر بمصر السفلى فى ٤ — ٨ مايو سنة ١٩٢٦ (٢) وقد زادت درجة الحرارة فى يوم ٧ مايو فبلغت ٤٣° .
ولنذكر الآن وصفاً مختصراً للأحوال الخماسينية (الشديدة) كما تشاهد فى بعض هذه الأمثلة .

أول إدراكنا لاقتراب (الخماسين) أن نرى فى الخريطة الجوية اليومية انخفاضاً فوق واحة سيوة . وفى اليوم التالى يزيد عمق هذا الانخفاض ، فبعد أن كان الضغط الجوى فى سيوة ١٠٠٨ ملليمبار أصبح فى اليوم التالى ١٠٠٤ ، وعندئذ تهب على مصر عادة رياح شرقية جافة ، وتأخذ الحرارة فى الازدياد . بعد هذا ينتقل الانخفاض ويدنو من الدلتا ويزداد عمقه ويصبح الضغط الجوى فى غرب الدلتا ١٠٠٢ ملليمبار وتهب على مصر رياح أشد حرارة وجفافاً آتية من الجنوب الشرقى . . . اقتربت الأحوال الخماسينية أن تبلغ أقصى شدتها فقد ارتفع الترمومتر إلى ٣٩° وانخفضت الرطوبة النسبية إلى ٣٠ ٪ ، وفى اليوم الخامس يكون الانخفاض مركزاً على الدلتا وقد انخفض الضغط الجوى إلى ١٠٠٠ ملليمبار أو إلى أقل من هذا . وهبت الرياح حارة جافة من الجنوب فارتفع الترمومتر إلى ٤٢° وانخفضت الرطوبة النسبية إلى ٢٠ ٪ وقد تحمل الرياح رمالا وترابا .

فى اليوم التالى ينتقل الانخفاض نحو فلسطين أو سوريا . تهب الرياح من

(١) راجع وصف هذا الانخفاض فى مجلة C. S. J. ١٩١٤ .

(٢) راجع وصفه فى كتاب الظواهر الجوية لمحمود حامد .

الجنوب الغربى ، وتنخفض درجة الحرارة فجأة ، وتزداد الرطوبة النسبية إلى ٦٠ ٪ أو ٧٠ ٪ . وبعد ذلك يمتلئ الانخفاض أو يبتعد عن مصر بحيث لا يصبح له تأثير في طقسها وتعود الأحوال إلى حالتها المناخية الاعتيادية . وتهب ريح الشمال باطراد .

وبالطبع ليست كل الأحوال الخماسينية شديدة كالتى وصفناها ، وربما كان بعضها أكثر شدة . وفى العادة لا يكون هنالك فى أثناء مرور الانخفاض غير يوم واحد تكون فيه الأحوال قاسية والحر شديداً شدة قد لا يطيقها كثير من الناس . والأيام التى تسود فيها الأحوال الخماسينية هى فى المتوسط ٢٧ يوماً كل عام : منها نحو ٧ فى كل من مارس وأبريل و ٦ فى فبراير و ٥ فى مايو و ٢ فى يونيو .

تلك هى رياح الخماسين التى يعدها الكثيرون نقطة سوداء فى صفحة مناخ القطر المصرى . وبالرغم من أن مدة اشتدادها قليلة قد لا تتجاوز بضعة أيام مبعثرة فى شهرى أبريل ومايو ، لكننا ألفنا أن نسمع الشكوى المرة من أن طقس مصر فى تلك الآونة شىء لا يطاق . ويلقك الناس فيقولون لك بشىء من الدهشة إن الترمومتر قد تجاوز درجة الأربعين ! فى الظل ! — ويؤكدون كلمة « الظل » كأنما الحرارة تقاس عادة فى الشمس ! .

والحقيقة أن فى هذا كله شيئاً من المبالغة . فإن الحرارة وإن تجاوزت الأربعين إلا أن درجة الرطوبة تنخفض جداً . فيصبح الحرارة غير شديدة الاحتمال ، ودرجة ٤٠ مع الجفاف خير بكثير من ٣٠ مع الرطوبة كما يعلم كل من زار أوروبا فى فصل الصيف . وعدا هذا فإن الأيام الخماسينية القاسية حقيقة لا تتجاوز بضعة أيام فى كل عام .

وإذا كانت هذه الرياح نقطة سوداء فى مناخ مصر ، فإن لهذا المناخ مزايا قل

أن يوجد نظيرها في قطر من أقطار العالم . فهنا السماء الصافية الأديم والشمس البازغة تنسكب منها الأشعة الحميمية شتاء وصيفا ... وهنا رياح الشمال المنعشة العليلية . وإذا شكاك بعض الناس أن الصيف شديد الحرارة يمنعهم من العمل . فهو لاء في الغالب من سكان المدن الذين قد داخل طبعهم النعومة والفقور . أما العامل المصري والفلاح المصري فيشتغل صيفا وشتاء لا يشكو قيظا ولا حرا . ولا يطلب أجازة أو عطلة .. ولو كان الفلاح المصري هو المقياس الذي نتخذه لقياس صلاحية مناخنا للشغل المتواصل ، فإن مناخ القطر المصري يعد من غير شك من أصالح مناخات العالم ...

Le P. and

لبنانه به یحییٰ سرحدی للفقہ الامام وریث علیہ السلام
راہِ نظام . یحییٰ بن محمد

الفصل العاشر

الإقليم النباتية

١٢

التربة :

الظواهرات النباتية لأى إقليم نتيجة التفاعل بين التربة والمناخ ، وقد يحسن بنا قبل الكلام على الأحوال النباتية فى حوض النيل أن نقول شيئاً عن التربة واختلافها فى حوض النيل .

يقسم الجغرافيون التربة إلى نوعين أوليين : التربة المنقولة transported ، والتربة الموضعية Local ؛ والاسمان يدلان على مدلولهما . فالتربة الموضعية هى التى نشأت وتكونت فى موضعها الموجودة فيه الآن . وهى نتيجة تفكك وتفتت الصخور التى تحتها ، وتعرضها فى أزمنة طويلة للتأثيرات المناخية التى ساعدت على تشكيلها وتسكينها ؛ وقد ينقل جزء من هذه التربة بتأثير الأمطار أو الرياح إلى أماكن بعيدة . ولكن الجزء الباقى منها فى موضعه هو التربة الموضعية التى لم تحملها إلى مكانها ريح أو أنهار .

والتربة المنقولة هى التى نقلت من موضعها الأسمى وحملتها الرياح أو الأنهار أو الثلوج إلى مكان بعيد فألقت بها هناك ، كما هو الحال فى تربة مصر وفى تربة الجزء الأدنى من حوض بحر الجبل وكذلك التربة الرملية فى الصحراء ، وتربة اللويس مثلاً فى بلاد الصين .

وهناك اختلاف آخر بين أنواع التربة وهو يتعلق بحجم الذرات التى تتكون منها التربة . فالتربة قد تتكون من رمل حباته كبيرة ، أو من طين (أو صلصال) حباته دقيقة جداً . وبين هذين نوع ثالث وهو الطفل^(١) فى منزلة

(١) الاصطلاحات الإنكليزية هى طين أو صلصال Clay طفل Loam رمل Sand .

بين هذين النوعين . . وأهمية هذا التفريق أن التربة ذات الذرات الدقيقة شديدة التماسك فلا تداخلها المياه إلا إلى عمق قليل جداً . بينما التربة الرملية تنفذ فيها المياه بسهولة ، والتربة الصلصالية ذات الذرات المتناهية في الدقة تكون صعبة المراس في الحرث والزرع . وإذا هطلت عليها الأمطار الغزيرة القحمت أجزاؤها ولم ينفذ منها الماء فتراكبت فوقها المياه فاستحالت إلى غدران ومستنقعات . فإذا عقب المطر جفاف شديد ، فإن مياه الغدران تتبخر ، وتجف التربة بسرعة وتتكون فيها شقوق عميقة ، ونظراً لأن الماء لم ينفذ فيها إلا إلى عمق قليل جداً ، فإنها تعدو وليس بها من الماء المختزن شيء .

وخير التربة من الوجهة الزراعية ما كانت وسطاً لا هي بالرملية جداً ولا بالصلصالية جداً .

ولنعد إلى حوض النيل . نجد أن الهضبة الاستوائية وأقاليم البحيرات كلها ذات تربة موضعية غالباً ، ذات لون أحمر . ولعلها نتيجة تفتت صخور الناحس والجرانيت مع طول تعرض للمطر الغزير . ونظراً لأن هذه هي منطقة « الركود » فإن النقل بواسطة الرياح قليل . ونظراً لأن أكثر الأراضي مستوية فإن النقل بواسطة المياه الجارية قليل أيضاً إلا في الجهات الجبلية .

فبتأثير الأمطار الغزيرة تكونت هذه التربة الصلصالية الحمراء المنتشرة في سائر الأقاليم الاستوائية ، التي يطلق عليها علماء التربة اسم لاتريت (Laterite) أو القرميدية^(١) وكثير من تربة حوض أعالي بحر الجبل وبحر الغزال يتكون من

(١) يقول ماريوت في كتابه (Marbut : Vegetation and Soil of Africa (N. Y.) أن التربة اللاتريتي الحقيقية أقل انتشاراً في المناطق الاستوائية مما يتوهم أكثر الباحثين ، وهو يميز أنواعاً أخرى تشبه اللاتريت ولكنها تختلف عنه ، ويجعل التربة في أكثر أعالي النيل من هذه الأنواع التي يسميها Lateritic Red Loams (راجع كتابه المذكور ص ٢١٤ وما بعدها) .

طفل أحمر اللون يشبه اللا تريت ولكنه أكثر منه خصوبة ؛ وكثيراً ما يحتوى نسبة عالية من مركبات الحديد .

وفي الحوض الأدنى لبحر الغزال والجبل وأكثر حوض السوبات والنصف الجنوبي للنيل الأبيض والحوض الأوسط للنيل الأزرق نوع آخر من التربة أسود اللون ، يطلق عليه العلماء اسم تشرنوزيم (Chernozem)^(١) . هي تربة صلصالية جداً شديدة التماسك ، تكثر فيها الغدران عقب نزول الأمطار ثم تصبح شديدة الجفاف في فصل الربيع .


وليست هذه التربة السوداء موضعية كلها ولا منقولة كلها . على أن فيضان نهر الجبل والسوبات عاملان قويان في نقل كثير من التربة إلى حوضيهما الأدنىين وهذا سيؤدى بالطبع ، على مدى القرون ، إلى زوال أكثر مستنقعات بحر الجبل بما يتراكم فيها من الرواسب .

والتربة السوداء هذه كثيراً ما توصف في خرائط السودان باسم تربة القطن السوداء Black Cotton Soil على أننا يجب ألا نفهم من هذه التسمية أن هذه التربة أصلح من سواها لزراعة القطن ، فإن بعضها قد يكون صالحاً لهذا وبعضها ليس كذلك . وإنما هي التسمية التي اختارها المهنيون التي قامت بعمل خرائط حكومة السودان . مع العلم بأن أكثر أرض الجزيرة ليس من التربة السمراء المنتشرة في أواسط السودان .

أما في هضبة الحبشة فإن التربة نتيجة تفكك طبقات البازلت . وينشأ من هذا تربة حمراء تشبه من بعض الوجوه طمي نهر النيل لكنها تختلف عنه ، لأن ذراتها أكبر حجماً ، وأقل اختلاطاً بمواد غريبة ، وتربة مصر قد نقلت كل هذه المسافات البعيدة ؛ وهذا يزيد في تفكك حبيباتها .

وتربة القطر المصري ، التي تعد من أخصب الترات ، جلها — وإن لم يكن

(١) كلمة روسية معناها تربة سوداء .



(شكل ٣٩)

خريطة تقريبية لتوزيع التربة في السودان (١) تربة « القطن » الثقيلة (٢) أنواع أخرى صلبة (٣) تربة نهري (٤) تربة رملية حمراء بكردوفان (٥) تربة رملية بخلاف ٤ (٦) تربة مشتقة من الحرسان النوبي (٧) طفل أحمر (٨) تربة رملية وحصى (٩) تربة جبلية ؟ [نقلا عن خريطة لحكومة السودان]

كلها — نتيجة تراكم الرواسب النيلية . . . ومما سبب غنى القطر المصرى أن هذه التربة تتجدد كل عام ، فإذا استنفدت الزراعة ما فيها من المواد الخصبة ، عوض هذا الفقد ما يأتى به النيل فى العام التالى .

وتربة مصر تختلف بعض الاختلاف فى مختلف النواحى . وهذا الاختلاف نتيجة اختلاط التربة فى بعض المواضع بالرمال الصحراوية التى تحملها الرياح فتختلط بصلصال النيل . والفلاح يسمى الأرض التى تزيد فيها نسبة الرمل عن ٢٠ و ٣٠ ٪ بالأرض الصفراء . بينما الأرض التى نسبة الحبات الرملية فيها قليلة يسميها الأرض السوداء . ويفرق ويلسكوكس التربة التى بين تحمل مقداراً من الأملاح قريباً من سطحها ، وبين التربة التى تكون أملاحها على عمق كبير : ثلاثة أمتار أو أكثر ؛ وفى رأيه أن الأولى تتأثر بارتفاع مستوى الترعرع فترتفع الطبقات الملحية ويكون هذا سبباً فى تلف كثير يصيب المزروعات^(١) .

هذا ذكر موجز لأحوال التربة فى حوض النيل ، ويحول بيننا وبين بحث هذا الموضوع بحثاً مفصلاً أن أكثره خارج عن ميدان البحث الجغرافى البحت . على أنه يحمل بنا أن نقول إنه ليست كل تربة منقولة دائماً خصبة . ولا كل تربة موضوعية دائماً ضعيفة . ولكن الأكثر أن التربة المنقولة وعلى الأخص تلك التى تتجدد من وقت لآخر هى عادة أكثر خصوبة . وعلى الأخص أن النقل كثيراً ما يفقت أجزاءها ويجعلها أصلح للزراعة ؛ ويمكننا أن نقول بوجه عام إن التربة الجيدة يجب (١) أن تكون فيها نسبة عالية من الصلصال نحو ٥ ٪ ، (ولو أن بعض النباتات تنمو وتزدهر فى الأراضى الطفلية) ولكن لا تكون عالية جداً (٧٥ ٪ فأكثر) فيتحول دون سهولة الصرف Drainage .

(٢) ويجب أن تكون فيها جميع المواد الغذائية اللازمة للنبات (مركبات الفوسفور والأزوت ونحوها) . وكلما كانت التربة أغنى فى هذه المواد كانت بالطبع

(١) ويلسكوكس : الرى فى مصر الجزء الأول .

أكثر خصوبة . ويجب أن نعوض الأرض ما تفقده من هذه المواد إما بزرعة محاصيل خاصة أو بالتسميد الصناعى .

(٣) يجب ألا تحتوى التربة على الأملاح الضارة بالزراعة .

(٤) يجب أن يكون فى التربة مقدار معتدل من المواد العضوية (Humus) فإن هذا مما يتطلبه كثير من المزروعات .

ويمكننا أن نقول إن حوض نهر النيل — وإن لم يكن كله فى نهاية الخصوبة ، إلا أن تربته بوجه عام جيدة ، فى الأماكن غير الصحراوية . ولذا يصبح العامل المهم ، الذى يتحكم فى نوع النبات وتوزيع الأقاليم النباتية ، هو المناخ لا التربة ، ومقارنة خريطة نباتية لحوض النيل بخريطة توزيع المطر ترىنا هذه الحقيقة بكل وضوح .

وفى حوض النيل ، الذى حوى جميع الأحوال المناخية من قيظ الأقطار المدارية إلى زمهرير المرتفعات الثلجية ومن أمطار خط الاستواء وهضبة الحبشة إلى جذب صحراء النوبة وجفافها ؛ فى هذا الحوض جميع الظاهرات النباتية التى يمكننا تصورها . فمن غابات كثيفة إلى أحراج وأدغال متناثرة الأشجار ، إلى حشائش عالية ، إلى أعشاب خشنة ، إلى شجيرات ضئيلة من ذلك النوع الذى تسمح بنموه الأحوال المناخية القاسية فى المناطق الجبلية الشديدة البرودة .

ويمكننا أن نقسم حوض النيل — بوجه عام — من حيث أحواله النباتية إلى قسمين متساويين تقريباً : أولهما المنطقة الصحراوية البهتة وهى النصف الشمالى لحوض النيل ، والثانى المنطقة غير الصحراوية ، وتشمل النصف الجنوبى .

لكننا إذا سهل علينا أن نعتبر القسم الأول منطقة نباتية واحدة لأنها كلها لا تباين فيها يميز بين نواحيها المختلفة ، فإن القسم الجنوبى كثير الاختلاف ولا بد من تقسيمه إلى مناطق نباتية شتى مبتدئين بالأقاليم الاستوائية .

الغابات الاستوائية :

إن منطقة البحيرات الكبرى ، برغم وجودها وسط الأفطار الاستوائية ، ليست بالإقليم الذى تتمثل فيه الغابات الاستوائية الكثيفة أحسن تمثيل . فغابات (السلفا) التى تملأ حوض نهر الكنفو ، والتى تتكاثر فيها الأشجار وتنمو بعضها إلى جنب بعض ، وترتفع دوحها فى الهواء إلى علو شاهق ، وتقلصق تيجانها كلٌ بجانب الآخر ، حتى تحجب نور الشمس عن أن يصل إلى باطن الغابة ، ويغطى الثرى ما بين جذوع هذه الدوح العظيمة أعشاب وشجيرات من أنواع شتى ، ويصل ما بين كل شجرة والى بينها نباتات متسلقة يلتف بعضها حول بعض ، كأنها الأسراس الضخمة الملتوية — تلك الغابات التى يكاد اجتيازها يكون ضرباً من المحال والى أشدة ظلامها وأجرتها وحرارة باطنها ، حرارة مشوبة برطوبة كثيرة ، عافت سكناها الضواري فضلاً عن الآدميين ، سوى من دفعهم إلى الاعتصام بها قوة قاهرة . مثل هذه الغابات لا تتمثل فى حوض النيل الأعلى أحسن تمثيل ؛ ولكنه ليس خالياً منها تماماً .

هذه الغابات ممثلة أحسن تمثيل فى حوض الكنفو وهو أغزر ماء وأشد حرارة من منطقة البحيرات . ويظن أن هذا الضرب من الغابات الكثيفة كان من قبل يغطى الجزء الأعظم من منطقة البحيرات ؛ أما الآن فإنه قاصر على جهات محدودة ، وربما كان خير مكان تتمثل فيه هذه الغابات هو الإقليم الواقع غرب جبال رونزوى الممتد إلى غرب السمليكى : وهو إقليم غابة إيتورى (Eturi) . وهو من أجزاء حوض النيل المتاخمة لحوض الكنفو . وهذه الغابة العظيمة هى امتداد لغابات الكنفو .

وعدا هذه الغابة توجد فى نواح متعددة فى أوغندا غابات من النوع الاستوائى مبعثرة هنا وهناك ، وبنوع خاص بالقرب من سواحل بحيرة البرت وإدورد وفكتوريا ، وكذلك على سفوح رونزوى والفون .

على أن الظاهرة النباتية الغالبة في أوغندة اليوم هي الحشائش لا الغابات .
وهناك عاملان يساعدان على إتلاف الغابات : الإنسان إذ يحرق الغابات لإحراز
أرض زراعية ، والطبيعة إذ تنفض صواعقها على الأرض فتوجب في الغابات نيراناً
هائلة . وليس نمو الغابات ورجوعها إلى حالتها الأولى بعد إحراقها وتدميرها بالشئ
الذى يتم خلال سنين أو عشرات السنين بل لا بد له من قرون عديدة تتوافر فيها
جميع الأحوال الملائمة لنمو هذه الدوح العظيمة وتكاثرها من غير أن يتدخل
الإنسان أو أى عامل آخر فيوقف هذا النمو ... وليس لسكان أوغندة الآن ،
وفيهم شعوب مجدة نشيطة ، غنى عن أرضهم حتى يتركوها لتطحن عليها الغابات .
وهكذا أصبحت الهضبة الاستوائية برغم مطرها الغزير وحرارتها الكثيرة
ومناطق الغابات الكثيفة فيها محدودة ، وأكثر هذه الغابات تحوى أشجاراً
خشبها نافع للإنسان .

هناك نوع آخر من الغابات يدعى عادة باسم غابات الأروقة Gallery
Forests وأول من دعاها بهذا الاسم الرحالة الإيطالى بياجيا Piaggia ثم تبعه
شوينفرت . ولعل سبب هذه التسمية هو أن هذه الغابات بضخامة أشجارها
العالية التى تشبه الأعمدة القائمة ولاسيطة امتدادها تشبه أروقة الهياكل والمعابد .
وهذا النوع من الغابات منتشر على حافى الأنهار فى أعلى النيل . وعلى الأخص
أنهار أوغندة وبحر الغزال (حيث رآها شوينفرت) وهذه الجداول والأنهار هى
التي تساعد على تنذية هذه الأشجار بالماء فى بلاد ينقطع فى بعضها المطر مدة
تتراوح بين ثلاثة وخمسة أشهر . وأشجار هذه الغابات لا تنقل فى ضخمتها وارتفاعها
عن غابات (السلفا) ، فأشجارها تعلو إلى أكثر من ٣٠ متراً والجذوع متجاورة
مقلاصقة ، والفراغ القليل الذى بينها تكسوه الأعشاب والشجيرات المتنوعة ، حتى
ليكاد السير وسطها يكون مستحيلاً .

لكن هذه الغابات تختلف عن السلفا بأنها تنمو فى حدود ضيقة (على

جانبي الأنهار) ، ولأنها تعتمد ماءها من الجداول والعيون لا من الأمطار وحدها .

ولا بد لنا أن نشير إلى أن هذه الغابات الكثيفة هي نتيجة وفرة الحرارة والرطوبة طول السنة .

وقد تكون هنالك أقاليم محدودة في حوض بحر الغزال وبحر الجبل مطرها كثير نوعا لكنه ليس غزيراً بدرجة الأمطار الاستوائية ، مع وجود فصل جفاف لا تهطل فيه أمطاراً مطلقاً ، فهذا كله قد ينشأ عنه نمو نوع من الغابات ليس بالكثيف ولا أشجاره عالية جداً ... ويفصل كل شجرة عن الأخرى مسافة خالية ، واجتياز هذه الغابات ليس بالشيء العسير . والعالم النباتي شانس Schanz يسمى هذا النوع الغابات الجافة ، أو غابات الجفاف Dry Forest . وهي في الحقيقة مجموعة أشجار منثورة وسط أقاليم الحشائش . والمهم أن نذكر أنه إذا وصفت منطقة بأنها منطقة حشائش فليس معنى هذا أنها خالية بقايا من الغابات .

السفانا :

على أن القسم الأعظم من حوض النيل — عدا المنطقة الصحراوية — واقع أكثره في منطقة الحشائش ، فهذه هي الظاهرة النباتية السائدة ، وإن تخللها في كثير من الأحيان أشجار متجمعة كأحراج أو مبعثرة وسط الحشائش .

وليست الظاهرات النباتية واحدة في جميع أقاليم السفانا ، بل هنالك اختلافات ناشئة من اختلاف مقادير الأمطار ومن اختلاف درجة الارتفاع عن سطح البحر ، فحيث تتوفر الحرارة والأمطار تكون الحشائش عالية علواً كبيراً . وحيث تقل الحرارة (بسبب الارتفاع) أو تقل الأمطار تكون الحشائش متوسطة الارتفاع . فبعد المنطقة الاستوائية مباشرة ندخل في منطة السفانا ذات الحشائش العالية

التي يبلغ طول حشائشها مقداراً يتراوح بين مترين وأربعة أمتار وفي هذه المنطقة تقل الأشجار وتكون ذات حجم صغير وارتفاع قليل . وكثيراً ما يكون ارتفاعها غير متجاوز ارتفاع الحشائش التي تنمو حولها .

وهذه الحشائش العالية إذا صلحت أحياناً غذاء لبعض الحيوانات فإنما تصلح لبعض البهائم الضخمة كالجاموس والفيلة . لكنها قلما تصلح للماشية وللبقر والغنم بنوع خاص . غير أن التربة التي تنمو فيها هذه الحشائش هي عادة تربة طفلية صالحة جداً لزراعة الحبوب والعلال ولهذا فإن إزالة الحشائش منها وزرعها غلالاً يأتي بنتائج حسنة .

وهذا النوع من الحشائش منتشر في أعلى النيل في النصف الشمالي من أوغندا ما بين بحيرتي فكتوريا والبرت إلى حوض الأسوا ، ثم في النصف الجنوبي لحوض بحر الغزال . أما الإقليم الواقع بين بحيرة فكتوريا وبحيرة إدورد فنظراً لارتفاعه فوق سطح البحر تكون حشائشه جبلية قليلة الارتفاع (نحو متر أو متر ونصف) وهي صالحة عادة لتغذية المواشي . . وأكبر ما يميز هذه المنطقة أن أعشابها دائمة لا تسكاد تنقطع طول العام ، ولذلك توافرت فيها المراعى .

وإلى الجهة الشمالية من الحشائش العالية ندخل في إقليم الحشائش الطويلة (المتوسط الارتفاع) التي يتراوح ارتفاعها بين متر ومترين وهذا هو الإقليم الذي يسميه مربوت (Acacia-Tall Grass) أي إقليم السنط والحشائش الطويلة . وذلك لأن أنواعاً عديدة من أشجار السنط والطلع كثيرة الانتشار في هذا الإقليم حتى لقد تكون غابات تكسو من الأرض مساحات كبيرة ؛ وتكون ذات قيمة اقتصادية كبرى كما هي الحال في كردوفان .

وهذه المنطقة أكثر انتشاراً في حوض نهر النيل من سابقتها . فهي تشمل الجزء الأعظم من حوض بحر الجبل وبحر السوبات وبحر الغزال والنيل الأبيض

وأواسط حوض النيل الأزرق . في هذه الأقاليم فصل جفاف يستمر أحيانا من ثلاثة إلى خمسة أشهر . وفي أثنائه تحترق الأعشاب وتجف جذوع الشجر ، وتعلوها طبقة من الدخان . وحيث يطول فصل الجفاف قد تهب الرياح بشدة فتملأ الفضاء بمزيج من التراب والدخان والرماد . وهذا الأوان من أشق الأوقات على ساكني تلك البلاد وعلى الأخص من غير أهلها . غير أنه لا يكاد أول الغيث ينزل حتى تلتئم الشقوق ، وتورق الأشجار ، وتندفع الأعشاب في نموها نمواً سريعاً ، يتعذر علينا أن نتصوره . فلقد يسير المرء أول الربيع في طريق يراه أمامه معبداً واضحاً ؛ فيمشي فيه يومين أو ثلاثة أيام قاصداً إلى ناحية من النواحي ، ثم يريد العودة من الطريق نفسه بعد أن سقط مبكر الغيث ، فإذا الحشائش قد نبتت على ذلك الطريق وعلى سائر الأرجاء التي حوله ، حتى استحال على المسافر أن يتبين النهج الذي سار فيه بعد أن اندثرت معالمه وزالت ، ونمت فيه حشائش يبلغ ارتفاعها متراً أو مترين .

والأشجار المنتشرة في هذه المنطقة — وأكثرها من السنط والطلح — قد يبلغ ارتفاعها من ثلاثة إلى خمسة عشر متراً وأكثرها له خاصية فريدة ، وهي أن جذع كل شجرة يعلوه تاج مفرطح واسع قليل السمك ، بحيث يجعل الشجرة في شكل المظلة . ولعل هذا الشكل هو أكثر شيء ملائمة لإقليم تهب فيه الرياح باطراد وشدة ، فيمر بهذا النوع من الشجر دون أن تلحق به عطبا كثيراً .

أعشاب صحراوية :

إلى شمال منطقة السفانا منطقة أخرى هي بمثابة دور انتقال من السفانا التي تتوفر فيها المراعي مدة لا تقل عن نصف العام إلى إقليم الصحاري البهتة . وهذه المنطقة الانتقالية محدودة وتشمل الجزء الشمالي من دارفور وكردفان والجزيرة وكسلا وهي منطقة قليلة الأمطار (٥٠ — ٢٠٠ مم) وأعشابها لا تنمو إلا مدة قصيرة .

وهى من نوع قصير ذى شوك أو منتفخ الأوراق كالصبار . بحيث يستطيع أن يتحمل الجفاف .

هذا وتختلف هضبة الحبشة فى أحوالها النباتية عن الأقاليم المجاورة كما تختلف عنها فى أحوالها المناخية . فى الجهة الغربية نرى سفح الهضبة تحف به منطقة الحشائش والسنط . ثم نرى على المنحدرات غابات كثيرة الانتشار لا تقل فى كثرتها عن أشجار المنطقة الاستوائية لكنها تقل عنها حجماً وأنواعها أكثر تعداداً وفيها كثير من أشجار المنطقة المعتدلة .

أما الحشائش التى تكسو هضبة الحبشة فهى من تلك الأنواع الناعمة التى لا يزيد طولها على متر ، والتى هى ذات فائدة غذائية لماشية ، وتشبه من بعض الوجوه الأقاليم العالية فى الهضبة الاستوائية .

٢ نبات المستنقعات :

المستنقعات ونباتها ظاهرة خاصة تختلف عن الأقاليم التى حولها . فنظراً لصعوبة تهريف مياه الأمطار بسبب استواء الأرض فى أجزاء كثيرة من حوض النيل الأعلى ، ونظراً لأن الأرض بطبيعتها لا تتسرب المياه بسهولة كما قلنا فى أول هذا الفصل ، نجد أن تكوين المستنقعات شئ سهل جداً ، سواء أكان ذلك فى المنخفضات والأودية أو على جوانب الأنهار والبحيرات ، وفى أوغندة مثلاً قد يتحتم أحياناً ردم طرق وسط المستنقعات حتى ييسر الانتقال من جهة إلى أخرى . وفى السودان الجنوبي كثيراً ما يقيم الأهالى حجازاً يحول دون تسرب المياه إلى قراهم ومنازلهم .

وفى فصل المطر تتحول أقطار شاسعة فى جنوب السودان إلى مستنقعات أو إلى سهول عشبية تغمرها المياه . كما أن هنالك أقطاراً فى الجزء الأدنى من بحر الغزال وبحر الجبل مستنقعاتها دائمة طول العام . وفى فصل المطر تنمو هذه فى

المساحة وتمتد إلى الشرق وإلى الغرب . وفي هذا الأوان يلجأ السكان ما استطاعوا إلى المساحات القليلة من بلادهم التي تكون مرتفعة قليلا عن السهول المجاورة .

وجود المستنقعات في حوض بحر الغزال وبحر الجبل قد نشأ عنه ما يسمى بالسدود ؛ وهذه السدود هي نتيجة مباشرة لحالة هذه الأقاليم من الفاحية النباتية . فالسد هو عبارة عن كتل من النبات تعترض مجرى النهر . وهو على نوعين : السد الذي يكثر في بحر الغزال وهو عبارة عن أعشاب تنمو في قاع النهر وأوراقها وأغصانها تطفو على وجه الماء . وأما سدود بحر الجبل فعبارة عن كتل ضخمة من النبات مندمج بعضها في بعض وقد يبلغ سمكها من ٥ إلى ٧ أمتار وطولها قد يبلغ ميلا وبعض ميل . ومثل هذا السد لو ترك وشأنه لبقى في النهر عدة سنين ، وهذا النوع هو الذي نقصده عادة حين نتكلم عن السدود ومنطقة السدود .

ومنطقة السدود هي الجزء الأدنى من بحر الجبل ابتداء من بلدة بور . ففي هذه المنطقة يكون لبحر الجبل مجار ومسيلات متعددة : منها مجرى واحد رئيسي وعدة مجار فرعية . وعلى ضفاف هذه المسيلات كلها مستنقعات وغدران تزداد حجما وعددا في فصل الصيف عقب الأمطار . . وعلى شواطئ هذه الغدران وفي قيعانها تنمو الحشائش المائية والأعشاب بكثرة ، ومن أهم هذه النباتات نبات البردي والبوص وأم الصوف والعمبيج .

وحين يحل فصل المطر تهب العواصف فيقتلع هذه النباتات وتلقى بها في الغدران . فلا يزال يدفعها التيار حتى يلقى بها في النهر بمقادير هائلة لأنه في وقت الفيضان يعلو مستوى الماء في النهر فيتصل النهر بالغدران والمستنقعات . وإذا كان الفيضان أعظم كانت الغدران والمستنقعات التي ترسل هذه النباتات إلى مجرى النهر أكثر وأوسع . ويكون مقدار السكبل النباتية المحمولة إلى المجرى الرئيسي

أكثر منه في السنين ذات الفيضان القليل .
فإذا وصلت هذه المقادير العظيمة من البردى والبوص وأم الصوف وغيرها
من الأعشاب إلى مجرى النهر حملها التيار ببطء على وجه الماء حتى تصادف في
طريقها عقبة تعترضها . وما أكثر العقبات في مجرى بحر الجبل الكثير الالتواءات
والانحناءات .

تقف هذه النباتات لدى تلك العقبة ، ويتلوها غيرها حتى تكون كتلة
ضخمة تسد مجرى النهر ، حتى أنها لتعوق جريانه قليلا ، وتجمع من ورائها المياه ،
بحيث يكون مستوى النهر وراء السد أعلا من مسقواه أمام السد . وتجري المياه
بسرعة من تحت السد حاملة كثيراً من النباتات والأعشاب . وبهذه الكيفية
يضاف إلى حجم السد من أسفله فيزداد سمكا كما ازداد مساحة ؛ والنباتات العليا
التي فوق سطح السد تأخذ في النمو والترعرع وتند جذورها في الكتلة النباتية
التي تحتها فتربطها وتدبجها بعضها في بعض .

وبمضي الزمن يصبح السد كتلة قوية مقبنة بحيث تسير فوقه الناس والفيالة
والماشية . وفي الوقت الحاضر يهتم بالطبع بأمر تطهير النهر من السدود فلا تترك
ليتراكم وتكون تلك العقبة الكؤود التي تعوق للملاحة ، وتعطل المواصلات .

الفصل الحادى عشر

الأحوال المائية (الايديولوجية) لنهر النيل

من أهم فروع الدراسة الجغرافية ، فرع لم يلق بعد كل ما يستحقه من العناية وهو دراسة نظام جريان الأنهار فى كثير من أقطار العالم . ثم الوصول بهذه الدراسة إلى قواعد يمكن الركون إليها . فكثير من أنهار العالم لم تدرس نظمها بعد دراسة دقيقة . وسكان بلد كمصر ليس به غير نهر واحد ذى شخصية قوية ونظام بارز واضح ، قد يذهبون إلى الظن بأن هذا النظام هو الذى يخضع له كل نهر آخر فى جريانه وفيضانه . وليس هذا بصحيح ولقد كان المصريون فى الأعصر القديمة يحسبون أن كل نهر لا يجرى إلا من الجنوب إلى الشمال ... فلما رأوا نهر الفرات للمرة الأولى قالوا عنه إنه ذلك النهر المعكوس الذى ينحدر وهو يصعد^(١) .

ودراسة الحالة المائية لأى نهر تشمل أمرين : الأول معرفة مقدار ما يجرى من الماء فى هذا النهر فى كل عام ، والأمر الثانى : نظام جريان النهر (Régime) فى مختلف الأشهر طول العام .

وقد يتبادر إلى الذهن لأول وهلة أن نظام النهر متوقف على مقدار ما يسقط فى حوضه من الأمطار ، وعلى الأمطار وحدها . لكن هذا إن صح فى بعض الأحوال فإنه لا يصح فى سائرهما ، فإن مقدار ما يحمله النهر من الماء نتيجة سقوط الأمطار أو ما يسيل من الجليد حين يذوب . هذان عاملان زيادة ؛ وهنالك عوامل نقص : كالتبخر بسبب ازدياد الحرارة ، وكتسرب مقدار من الماء إلى باطن الأرض ، وفى جميع هذه الأحوال نجد أن لدرجة انحدار النهر أثراً كبيراً فى تنظيم

1— That inverted water which goes downstream in going upstream.

جريانه . والعوامل الثلاثة الأولى كلها مناخية ، ليست كل أنهار العالم متأثرة بها جميعاً بدرجة متساوية ، وللاختلاف في الأحوال المناخية أثر واضح في اختلاف نظام الأنهار . وقد سبق لنا عند التكلم على مناخ الأقاليم الحارة أن قلنا إن العامل الأهم فيها هو الأمطار . وهذه الحقيقة نكررها مرة أخرى عند كلامنا على نظام الأنهار ؛ فالأنهار في البلاد الحارة تفيض أو تفيض كنتيجة لازمة لسقوط الأمطار ولامتناعها . والعوامل الأخرى التي تؤثر في جريان الأنهار كذوبان الجليد والتبخر ، أثرها ضئيل في تنظيم جريان النهر . فالجليد في هذه الأقطار قليل المقدار وذوبانه قليل الأثر ، وأما التبخر فعامل ثابت تقريباً طول العام واختلاف الحرارة من الفصل إلى الفصل ومن الشهر إلى الشهر اختلاف قليل . وكذلك درجة التبخر ؛ فهي إذن لا تؤثر تأثيراً كبيراً في تنظيم مجرى النهر ، اللهم إلا في حالة شاذة كإقليم المستنقعات في بحر الجبل والغزال .

فالعامل الأكبر في زيادة أنهار البلاد الحارة ونقصها هو المطر ، والأقاليم الحارة كما نعلم ذات مطر غزير في أشهر الصيف . فلا غرابة في أن تفيض أنهارها في أشهر الصيف وأوائل الخريف ثم تصبح جافة راكدة في أشهر الربيع . ولكن إلفنا لهذه الحالة في نهر النيل يجب ألا ينسينا أن عكسها تماماً هو الحال في بعض الأنهار التي تجري فيما وراء المدارين ، أي في أوروبا مثلاً . فهناك الأمطار موزعة على أشهر السنة بشيء من العدل . ولو كانت هي المؤثر الوحيد في تنظيم جريان الأنهار لكان نظام أنهار أوروبا معتدلاً قليل الاختلاف من شهر إلى شهر . لسكنا نعلم أن الحال بخلاف هذا ، وأن لأنهار أوروبا نظاماً في جريانها يجعلها تفيض في حين وتفيض حيناً آخر . وإذا كان مقدار ما يسقط من المطر قليل يتغير من شهر لشهر ، فإن الحرارة تتغير تغيراً كبيراً من فصل إلى فصل ، ودرجة التبخر تتغير تبعاً لها . ودرجة التبخر هي هنا المؤثر الأول في تنظيم جريان الأنهار ؛ فالأنهار تمتلئ في الأشهر الأولى من السنة ثم تأخذ في النقص حتى تبلغ النهاية الصغرى

في أواخر الصيف وأوائل الخريف ، أى أن الحالة كما قلنا هي بعكس ما نعهده في نهرنا العظيم ، وفي السكثرة الكبرى للأنهار المدارية .

على أن كثيراً من أنهار أوروبا كالرين والرون تستمد جزءاً عظيماً من مائها من الجليد الذائب ، ففي جبال الألب يسقط الثلج ويتراكم ويخزن هناك إلى أن يحل الربيع فمعهدها تمتلئ الأنهار بما يذوب من هذه الثلوج . وإذا كانت أشهر الربيع حارة أكثر من المعتاد كان فيضان تلك الأنهار عالياً قوياً خطراً . حتى إذا حلت أشهر الصيف أخذ مستوى الأنهار ينخفض حتى يبلغ غاية الانخفاض في أوائل الخريف .

والنيل بالطبع من النوع الأول الذى يتأثر في جريانه بالمطر تأثيراً مباشراً ولو أن هنالك مؤثرات أخرى ذات أهمية كبيرة كوجود البحيرات والانخفاضات ودرجة انحدار المجرى . وهذا كله له أثره في تشكيل جريان النهر وفيضانه ، وسنرى هذا كله عند كلامنا على كل جزء من أجزاء هذا النهر .

المقاييس :

على نهر النيل اليوم من منابعه إلى دلتاه ما لا يقل عن ٨٧ مقياساً^(١) بعضها وهو مقياس الروضة يرجع تاريخه إلى أكثر من ألف عام . ولدينا من الشواهد ما لا يدع مجالاً للشك في أن المصريين القدماء كانوا يعنون بقياس مستوى هذا النهر ، ولكن المقياس الوحيد الذى كان مستخدماً في بضعة القرون الأخيرة ولا يزال قائماً إلى يومنا هذا هو مقياس الروضة . أما المقاييس الأخرى العديدة التى أقيمت في العصر الحديث في مواضع كثيرة على النهر وروافده ، فالغرض الأول منها هو قياس مستوى النهر في كل مكان هام بغية العلم بمقدار ما يجرى في النهر من الماء في كل جزء من أجزائه ، ولمعرفة هذا الأمر الذى اصطلح المهندسون على تسميته

(١) راجع ص ٣٥ في كتاب مصلحة الطبيعيات رقم ١١ الخاص بقياس تصرف نهر النيل وأمطاره في سنة ١٩١٩ (طبع المطبعة الأميرية سنة ١٩١٩) .

تصرف أو تصرف النهر ، والذي يسميه الإنكليز Discharge ، لابد لنا من أن نعلم متوسط عمق النهر ومتوسط سرعة جريانه . وعمق النهر يختلف باختلاف مستوى مائه ، فإذا ارتفع المستوى زاد العمق . لهذا كان وجود مقياس ثابت يسجل مستوى النهر في كل وقت أمراً لازماً لقياس تصرف النهر بانتظام .

والمهم في كل مقياس أن يكون مثبتاً إلى جانب النهر تثبيته متيناً بحيث لا يكون عرضة لأن يرحزحه عن موضعه أى طارىء من الطوارئ . ومقياس الروضة مثلاً عبارة عن قطع من المرمر ذات أبعاد متساوية مثبتة في جدار قائم متين بحيث تكون هي والجدار كتلة واحدة .

وعلى كل مقياس بالطبع بيان بالارتفاعات المختلفة ، وهذه الارتفاعات تقاس بالنسبة إلى نقطة الصفر المصطلح عليها . فإذا قيل إن مستوى النيل في الروصيرص هو ١٦ ، فمعنى هذا أن مستوى النهر ارتفع إلى أن صار ١٦ متراً فوق نقطة الصفر ، كما هو مصطلح عليها في ذلك الموضع . ونقطة الصفر هي اصطلاحية محضة وتختلف في المقاييس المختلفة . فقد تكون نقطة الصفر في موضع ما هي الحد الأدنى لمستوى النهر عادة ، وقد تكون أقل من ذلك أو أكثر . فهذا كله لا يهم ما دامت هي نقطة ثابتة لا تتغير .

ويهمنا أن نلفت نظر القارئ إلى أن نقطة الصفر في المقاييس الواقعة بالقطر المصري من أسوان إلى الدلتا ، هي مستوى سطح البحر المتوسط . فإذا قلنا إلى مستوى النيل في أسوان ٩٥ فمعنى ذلك أن مستوى النهر هناك هو ٩٥ متراً فوق سطح البحر . وكذلك إذا قرأنا بأن مقياس الروضة قد سجل ١٨ متراً . فمعنى ذلك أن مستوى النيل قد ارتفع في الروضة حتى أصبح أعلى من مستوى سطح البحر بثمانية عشر متراً . هذا كما قلنا خاص بمقاييس النيل في القطر المصري

قط وأما في بقية مقاييس النهر فإن نقطة الصفر اصطلاحية بحتة^(١). هذا والقارىء في غنى عن أن نشرح له أهمية قياس مستوى النهر في أجزائه المختلفة فإن على هذا وحده تتوقف معرفة ما يجري فيه الماء . ومعرفة الإجراءات التي يمكن بها تدبير مياه النهر بالخرن والصرف ، بل ليس هذا كل شيء . فمن المهم جداً أن نتقي خطر الفيضان العالى في إبان الفيضان ، فإذا سجل مقياس الروصيرص رقماً عالياً (٢٠ و ٢١) وأبرق لنا هذا الأمر أمكن اتخاذ التدابير الوقائية من أخطار الفيضان قبل حلوله بنحو أربعة عشر يوماً .

وهناك جداول كثيرة تنشرها مصلحة الطبيعيات تبين اختلاف مستوى نهر النيل كما تسجلها المقاييس في الفصول المختلفة في كل موضع من المواضع .

الموضع	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيه
غندوكرو	١١,٢٩	١١,٣٨	١١,٣٠	١١,٣٦	١١,٥٢	١١,٥٩
الرصيرص	١٢,١٣	١١,٦٩	١١,٤٠	١١,٣٢	١١,٦٨	١٢,٧٨
وادي حلفا	٢,٧٠	٢,٢٧	١,٨٣	١,٥٢	١,٣٨	١,٥٣
الموضع	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
غندوكرو	١١,٥٦	١١,٧٨	١١,٩٨	١١,٨٠	١١,٧٣	١١,٤٦
الرصيرص	١٥,٥٤	١٨,٨٥	١٨,٤٢	١٦,١٢	١٤,٠٨	١٢,٨٢
وادي حلفا	٢,٧٣	٦,٤١	٧,٤٩	٦,١٨	٤,٢٩	٣,٢٥

(١) نقطة الصفر في كثير من المحطات الهامة معروف ارتفاعها فوق سطح البحر الأبيض المتوسط . فهي في الخرطوم على ارتفاع ٣٦٠ متراً ، وفي وادي حلفا ١١٤ .

وهذه المطبوعات سهلة القنول قليلة الثمن فليرجع إليها القارى^(١) حيث لا متسع لسردها هنا ولكنا نكتفى هنا على سبيل التمثيل بذكر موضعين أو ثلاثة كما هو موضح فى الصفحة السابقة .

فهذا الجدول يرينا حالة مستوى النهر فى مواضع ثلاثة : من بحر الجبل والنيل الأزرق والنيل الرئيسى .

فعند غندوكرو لا يختلف مستوى النيل بين الانخفاض والارتفاع إلا بمقدار ٦٩ سنتيمتراً^(٢) . فالقاطنون على ضفاف النيل فى تلك الأصقاع لا يكادون يلاحظون اختلافاً كبيراً فى مستوى النهر طول العام . بينما الساكن على النيل الأزرق عند الرصيرص يلاحظ اختلافاً كبيراً بين إبريل ، شهر الانخفاض ، وبين أغسطس ، شهر الارتفاع ؛ ومقدار الزيادة نحو سبعة أمتار ونصف . وكذلك يشاهد اختلاف كبير يقرب من هذا فى وادى حلفا بين فصلى الانخفاض والارتفاع .

* * *

إذن فأهمية هذه المقاييس هى فى إعطائنا فكرة صحيحة عن مقدار ما يجرى من الماء فى النهر وروافده فى مختلف الفصول . وبهذا نصل إلى معرفة نظام جريان النهر وروافده من جهة ، ومجموع ما يجرى فيه من الماء فى العام من جهة أخرى . وقد اعتاد الإيدولوجيين أن يبينوا نظام جريان النهر بمقدار تصرفه فى الثانية بالأمطار المسكبة . أما مجموع ما يأتى به النهر من الماء فى الشهر أو فى العام

(١) راجع مثلاً الكتب الآتية :

1— The Discharges and Levels of the Nile in 1919.

2— Summary of Hydrographical Data in the Southern Sudan 1926.

3— Macdonald., Nile Control.

4— Willcocks., Egyptian Irrigation (1913)

5— Hurst and Others., The Nile Basin Vols. III and IV

(٢) هذا بالطبع فى المتوسط ويقطع النظر عن الأحوال الشاذة .

فيحسب عادة بملايين الأمطار المكعبة ، وسنئين هذا في كلامنا على النهر في كل جزء من أجزائه :

* * *

الهضبة الاستوائية وبحر الجبل :

أمطار الهضبة الاستوائية دأمة طول العام تقريباً وإن زادت زيادة واضحة في الربيع وأخرى في الخريف ؛ فالنيل هنا لا يخلو من الماء في أى وقت من أوقات السنة ولا ينقص مستواه نقصاً كبيراً من شهر إلى شهر ، ولكن هنالك عامل آخر غير عامل انتظام سقوط الأمطار وهو بحيرة فكتوريا التي تجمع المياه من جداول وروافد لا عدد لها ثم تخزنها وتصرفها بانتظام واطراد إلى النهر الوحيد الذى يخرج منها .

في هذه البحيرة يتجمع من مياه الهضبة الاستوائية أكثر مما يتجمع في بقية البحيرات وماؤها صاف عذب ، والنهر الأكبر الذى يمدّها — وهو نهر الكاجيرا — يخلف تصرفه من ١٤٠ إلى ٦٠٠ متر مكعب في الثانية ، على أن أكثر ما يغذى البحيرة بالماء جداول ينحدر فيها الماء كالسيل عقب سقوط الأمطار ، ثم تبقى جافة إلى أن تسقط الأمطار مرة ثانية . ومقدار ما تحمويه البحيرة من الماء ليس بالطبع مقدراً ثابتاً . فإن مستواها عرضة لتغيرات موسمية ، وهذه صغيرة في حد ذاتها ، فإن المستوى في مايو ويونيه يكون أعلى منه في فبراير بنحو ٣٠ سم ولكن بالنظر إلى مساحة البحيرة الكبرى ، فإن هذا الاختلاف الطفيف معناه زيادة محسوسة في مقدار ما في البحيرة من الماء وبالتالي مقدار ما يخرج منها .

وقد يكون مستوى البحيرة في بعض السنين أعلى من مستواها في السنين الأخرى ، كما بين ذلك الأستاذ بروكس ، بتأثير البقع الشمسية . ففي زمن تكاثرها

يزداد المستوى قليلا . وينقص المستوى إبان نقص البقع الشمسية ... وقد سبق لنا أن أشرنا إلى ذلك^(١) .

ومقدار تصرف نيل فكتوريا عند شلالات ريبيون هو كما يلي : (١٩١٢ — ١٩٤٢) .

يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو
٦١١	٦١١	٦٣٢	٦٨٤	٧٦٠	٧٧٠
يوليه	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
٧٢٠	٦٨٠	٦٥٠	٦٢٥	٦٢٠	٦٣٤ (٦٦٧)

فموسط ما ينصب من البحيرة إلى النيل هو ٦٦٧ متراً مكعباً في الثانية . لكن هذا ليس كل ما تفقده البحيرة ، بل الذي تفقده بالتبخر أكثر من هذا بكثير ، وقد ذهب ويلسكوكس وكريج إلى أن نسبة ما تفقده البحيرة بالتبخر إلى ما ينصرف منها إلى نهر النيل هو بنسبة ٩ : ٢^(٢) ولهذا السبب لم ير المهندسون فائدة في التفكير في تحويل بحيرة فكتوريا من خزان طبيعي إلى خزان صناعي ، تحفظ فيه مياه النهر إلى وقت حاجة سكان مصر والسودان إلى الماء ، لأن نسبة التبخر العالية تجعل مثل هذا المشروع قليل النفع . وكل ما اقترحه بعضهم (مثلاً السر وليم ولسكوكس) هو توسيع أو تعميق مخرج النيل عند شلالات ريبيون ، بحيث يزيد ما يخرج من البحيرة ويزداد تصرف النهر في هذا الموضع . على أن هذا أيضاً قليل النفع لأن أكثر هذه الزيادة ستفقد في مستنقعات بحيرة كيوجا الضحلة حيث درجة التبخر عالية جداً .

يجرى نيل فكتوريا من البحيرة إلى نامسغالي جريانا سريعا لا يكاد يفقد

(١) راجع ص ٤١ وما بعدها .

(٢) راجع كتاب الري في مصر ص ٢٤١ .

فيه شيئاً من مائه ، وبعد ذلك ينصب في بحيرة كيوجا ثم يخرج منها عند ميفاء مسندى دون أن يزداد ماؤه شيئاً — هذا إن لم ينقص .

وبعد هذا يدخل النيل عند فويرا في مجرى كثير الجنادل والمدافع والخوانق وتأخذ مياهه في الزيادة قليلا ، حتى إذا وصل إلى بحيرة البرت كان تصرفه أعلى قليلا منه عند مخرجه من بحيرة فكتوريا أو كيوجا .

وفي بحيرة البرت تتجمع المياه التي يحملها نيل فكتوريا ونهر سمليكي الذي يبلغ تصرفه مقدارا يتراوح بين ١٠٠ و ٣٠٠ متر مكعب في الثانية^(١) وكذلك تفحدر على جوانبها الشديدة الانحدار سيول عديدة .

وتمتاز بحيرة البرت على بحيرة فكتوريا — من الوجهة المائية — بأن سواحلها المرتفعة تجعلها صالحة لأن يخزن فيها مقدار عظيم من الماء دون أن تزداد نسبة المتبخر من مائها ، لأن مساحة سطحها لا تزداد بارتفاع مستواها ازدياداً كبيراً ، ولهذا كانت بحيرة البرت أصلح من بحيرة فكتوريا لأن تحول إلى خزان صناعي . ويخرج النيل من بحيرة البرت (نيل البرت) أكثر ماء من نيل فكتوريا ، وتصرفه أعلى . ومقدار تصرف النهر عند وادلاي هو كما يلي :

يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيه
٨١٩	٧٩٧	٧٦٦	٧٤٥	٧٥٢	٧٥٤
يوليه	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
٧٥٩	٧٧١	٧٩٥	٨١١	٨٢٨	٨٤٢

ونحن نلاحظ في تصرف النهر هنا أنه أقل ما يكون في أبريل وأكثر ما يكون في ديسمبر ، وأن الاختلاف بين الأشهر قليل بوجه عام ، ويرجع

(١) المؤلف نفسه صفحة ٢٤٨ .

السبب في هذا إلى أمر واحد وهو خضوع نظام الجريان لتأثير بحيرة البرت نفسها .
فهي تخزن المياه ثم تصرفها بانتظام ؛ ولذا قل الاختلاف من الشهر إلى الشهر .
ثم إن بحيرة البرت نفسها يكون مستواها أعلى مما يكون في ديسمبر وأقل ما يكون
في أبريل . . . وتعليل هذه الظاهرة أن الأمطار الغزيرة حول بحيرة البرت في شهر
أكتوبر ونوفمبر يعقبها شهر ديسمبر الذي تكون فيه درجة التبخر أقل منها في
أى شهر آخر ، فأمطار الخريف وإن تكن أقل في المقدار من أمطار الربيع إلا أنها
أكبر تأثيراً في رفع مستوى البحيرة ، لأن نسبة التبخر من مائها في الشتاء أقل
منه في الصيف . أما بحيرة فكتوريا الواقعة في قاع المنطقة الاستوائية فيتأثر
مستواها بالأمطار لأن اختلاف درجة التبخر من وقت لآخر قليل . ولهذا كان
مستواها أعلى ما يكون في مايو ويونيو وأقل ما يكون في يناير وفبراير .

ومقدار الاختلاف بين المستوى الأعلى والمستوى الأدنى لبحيرة البرت هو
٣٣ سنتيمتراً أى أكثر قليلاً من درجة الاختلاف في بحيرة فكتوريا .

بعد مغادرة بحيرة البرت يجرى النيل في وادٍ متسع ومجرى ضحل تحفه
المستنقعات وأشجار البردى والعمبيج والبوص ، وتبقى الحال هكذا إلى أن يبلغ
النهر نمولى ، وعندها ينتهى نيل البرت ويبدأ بحر الجبل . وما لا مجال للشك فيه
أن نيل البرت يفقد كثيراً من مائه بين البحيرة ونمولى ، رغم ما ينصب فيه من
الجداول والروافد . فيصرفه عند نمولى أقل من غير شك منه عند وادلاى . وقد
ذكر المستر هرست في كتابه عن حوض النيل أن مياه بحيرة البرت تفقد ملياراً
من الأمتار المكعبة عند وصولها إلى منجلا^(١) .

أما إلى الشمال من نمولى فإن النهر يسيل في مجرى كله خوانق وشلالات
وجنادل وتأتيه الروافد الكثيرة بالماء الغزير خصوصاً في أوائل الصيف ، فيزداد

(١) راجع الملحق الثالث للجزء الرابع من كتاب Nile Basin ص ٤٢ .

تصرف النهر زيادة عظيمة في الصيف وفي الخريف . فعند منجلا يكون تصرف النهر ٨٦٦ متراً مكعباً في فبراير ثم يزداد إلى ١٣٧٢ في سبتمبر . وفي المسافة ما بين نمولى ومنجلا يكاد النهر ألا يفقد من مائه شيئاً يذكر ، نظراً لسرعته وضيق مجراه وإلى الشمال من منجلا يأخذ النهر في الاقتراب من منطقة المنخفضات والمستنقعات ، فتزداد نسبة ما يفقده النهر بالتبخر إلى درجة كبيرة . وحسبنا أن نورد هنا الأرقام الدالة على تصرف النهر في مواضع مختلفة من بحر الجبل بحساب ما يجري في النهر من الأمطار المسكبة في الثانية .

الموضع	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيه	متوسط
منجلا	٩١٨	٨٦٦	٨٣٥	٨٦٤	١٠٢٦	١٠٦٥	٩٥٢
بور (أرقام تقريرية)	٦٨٣	٦٥٥	٦٦٤	٥٧٣	٦٦٧	٦٩٥	—
الزراف	١٦٤	١٦٨	١٦٤	١٥٥	١٥١	١٣٧	١٤٣
نهاية بحر الجبل	٣٥٠	٣٢٦	٣٢٨	٣١٧	٢٩٨	٢٩٢	٣١٢
بحر الجبل والزراف معاً	٥١٤	٤٩٤	٤٩٢	٤٧٢	٤٤٩	٤٢٩	٤٥٥
الموضع	يوليه	اغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	متوسط
منجلا	١١٣٦	١٢٦٤	١٣٧٢	١٣١٣	١٢١٢	١٠٤٢	٩٥٢
بور (أرقام تقريرية)	٧٣٥	٧٦٠	٧٧١	٧٨٢	٧٢١	٦٩٦	—
الزراف	١٤٣	١٦١	١٧٨	١٨٢	١٧٩	١٧٧	١٤٣
نهاية بحر الجبل	٢٨٩	٢٩٣	٣٠٢	٣١٥	٣٠٠	٣١٩	٣١٢
بحر الجبل والزراف معاً	٤٣٢	٤٥٤	٤٨٠	٤٩٧	٤٧٩	٤٩٦	٤٥٥

و يتأمل هذا الجدول نرى جلياً أن ما يضيع من ماء النهر شمال منجلا بوجه عام ، وفي إقليم المستنقعات بنوع خاص ، مقدار عظيم جداً . ومن الغريب أن

هذا المقدار الضائع كثير دائماً في كل شهر من أشهر العام سواء أ كان مستوى النهر في منجلا عالياً أو منخفضاً . فإذا جرى في النيل عند منجلا ١٣٧٢ متراً مكعباً في الثانية لم يصل منه إلى ما بعد بحيرة نوبلا نحو ٤٥٠ م^٣ في الثانية . ولو كان الفيضان عالياً وازداد مقدار تصريف النهر عند منجلا إلى ألفي متر مكعب أو أكثر — كما حدث في بعض السفين — فإن هذا لن يؤثر في تصريف النهر عند بحيرة نوبلا كثيراً . كأن هذه المياه الزائدة لا تأثير لها غير زيادة مساحة المستنقعات وازدياد ما يفقد النهر من مائه بهذه الوسيلة .

ولبيان هذه الحقيقة نورد هنا جدولاً يوضح ما يجري في بحر الجبل من الماء طول العام ، في سنتين ، إحداهما ذات فيضان منخفض وهي سنة ١٩٤٠ والأخرى ذات فيضان عال وهي سنة ١٩٤٢ ، مع مقارنتها بمتوسط ما يجري في النهر ؛ والأرقام هي بملايين الأمتار المكعبة .

السنة	منجلا	بور	كنيسة	حلة النوير	نهاية الجبل
المتوسط للسنتين من					
١٩١٢ إلى ١٩٤٢	٢٧,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٩٦٩٠	١١,٠٠٠	١٠,٣٠٠
فيضان ١٩٤٠	٢٢,٠٠٠	٢١,٥٠٠	٩٣٤٠	١١,٠٠٠	١٠,٤٠٠
فيضان ١٩٤٢	٣٢,١٠٠	٢٥,١٠٠	٩٧٨٠	١١,٣٠٠	١٠,٥٠٠

وهكذا نرى أن هذه الفيضانات على اختلافها الكبير في منجلا شديدة التشابه في نهاية بحر الجبل .

وإذا كانت نسبة المفقود من ماء بحر الجبل عظيمة فإن المفقود من ماء بحر الغزال أعظم ، وكل ما يصل إلى النيل الأبيض من ماء هذا النهر هو نحو ٢٠ متراً مكعباً في الثانية طول العام . ذلك كل ما يستفيد منه النيل من حوض

بحر الغزال ، ذلك الحوض النسيح الكثير الأنهار الذي سماه ركلوس إقليم
الأنهار Pays des rivières

إذن فإن كل نصيب نهر النيل من الهضبة الاستوائية وأمطارها الغزيرة هو
نحو ٤٧٥ مترًا مكعبًا من الماء في الثانية ، حتى لقد قدر ليونز أن ما يصل إلى النيل
الأبيض لا يعادل أكثر من جزء من مائة جزء من أمطار الأقاليم الاستوائية^(١) .
ولا نظن تقديره هذا مبالغًا فيه .

السوبات :

أهم مقياس لتصريف نهر السوبات واقع عند حلة دليب على مقربة من
نقطة التقائه ببحر الجبل . وتصريفه في هذا الموضع هو كما يلي (متوسط ١٩١٢ —
١٩٢٧) :

يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيه
٣٠٢	١٥٥	١٠٤	٨١	١٥٨	٢٤٠
يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
٤٩٠	٦٠٣	٦٨٤	٧٤٦	٧٦٢	٦١٥

فالنهر بوجه عام معتدل الجريان ومدة فيضانه أطول من مدة فيضان أنهار
الحبشة الشمالية ؛ فالأمطار في حوض السوبات تبدأ مبكرة وتنتهي متأخرة . ولهذا
أصبح النهر وهو لا يكاد يخلو من الماء في أى وقت من أوقات السنة ، ولو أن
مياهه تقل قلة ظاهرة من فبراير إلى مايو .

ومياه السوبات في بعض أشهر الفيضان تتكافأ في المقدار ومياه بحر الجبل ،

(١) راجع مقالته في الصفحة ٣٤٣ من الجزء الثالث من كتاب Oxford Survey
of the Brit. Empire.

لكن السوبات أقوى تياراً وأسرع جرياناً حتى إنه يحجز جزءاً من ماء بحر الجبل فيمنعه من الجريان إلى النيل الأبيض ، ولكن هذا الجزء يسير . وليس بصحيح ما يذكره بعض الكتاب من أن مياه السوبات تحجز جميع مياه بحر الجبل وتحول بينها وبين الانصراف إلى النيل الأبيض .

النيل الأبيض :

مياه النيل الأبيض تتكون من مياه السوبات والجبل مجتمعين ، ونسبة ما يأتي به كل من النهرين تختلف من آن لآخر ؛ فمياه السوبات تكون في الخريف أكثر من مياه بحر الجبل .

وفي الربيع يكون أكثر ما يجري في النيل الأبيض مصدره مياه بحر الجبل إذ تقل مياه السوبات ، ولهذا كان النيل الأبيض قليل الماء في الربيع ونظراً لاتساع مجراه وبطء جريانه كانت نسبة المفقود من مائه بالتبخر كبيرة . ولكن يظهر أن هنالك مقداراً من الماء يتسرب إلى الطبقات المجاورة للنهر في زمن الفيضان ثم يرد إلى النهر في زمن التجفيف ؛ وهذا المقدار يوازي تقريباً ما يفقده النهر بالتبخر . ولهذا نرى أن تصريف النيل الأبيض عند ملاكال في زمن الجفاف لا يزيد كثيراً عن تصريفه عند الخرطوم وتصريف النهر في هذين الموضعين هو كما يلي :

(١٩١٢ — ١٩٤٢) .

يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو
٨٤٠	٦٨٠	٦٠٠	٥٤٠	٥٨٠	٧٤٠
٩٣٠	٧٠٠	٥٧٠	٥٤٠	٥٥٠	٦٢٠
يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر المتوسط
٩١٠	١٠٥٠	١١٦٠	١٢٤٠	١٢٢٠	١١٠٠
٥٩٠	٥٨٠	١١١٠	١٤٠٠	١٢٢٠	١٠٩٠
٨٢٠					

والمقارنة بين تصريف نهر النيل عند ملا كال وعند الخرطوم من الأشياء التي عالجها جميع الكتاب عن نهر النيل ، فيحسن بنا أيضاً أن نذكرها ذكراً خاصاً . لنذكر قبل كل شيء أن المياه التي تمر بملا كال لا تصل إلى الخرطوم إلا بعد مدة تتراوح بين ٢٠ و ٢٦ يوماً^(١) ، فيحسن بنا أن نذكر هذه الحقيقة عند مقارنة تصريف نهر النيل في كلا الموضعين في كل شهر من شهور السنة .

ولنبداً بشهر أبريل ، شهر الانخفاض الشديد ، نجد أن تصريف النهر لا يختلف في الخرطوم عنه في ملا كال ؛ وسبب هذا أن النهر لا يزال متأثراً عند الخرطوم بتصريف النهر في شهر مارس . هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن هذا هو الأوان الذي يعود فيه إلى النهر مقدار كبير مما تسرب من الماء إلى الطبقات الجاورة للنهر . وفي شهر مايو ويونيو يزداد تصريف النهر قليلاً قليلاً عند ملا كال ويزداد بمقدار أقل عند الخرطوم . وليس في هذا شيء من الغرابة ، ولكن الظاهرة الغربية تبدأ في شهر يونيو ، وتستمر إلى أوائل سبتمبر . وهذه الظاهرة هي أن تصريف النيل الأبيض يزداد كثيراً عند ملا كال زيادة لا نرى لها أثراً عند الخرطوم . وهذا ظاهر من الجدول السابق . ولا سبب لهذا سوى أن فيضان النيل الأزرق يبلغ أشده في هذه الآونة فيحجز مقداراً عظيماً من مياه النيل الأبيض فيحول دون جريان جزء كبير من مائه إلى شمال الخرطوم . ويصبح النيل الأبيض جنوبى الخرطوم عبارة عن بحيرة كبرى ، يخزن فيها الشطر الأكبر مما يأتي به النهر من مياه السوبات وبحر الجبل .

وفي الأسبوع الثاني أو الثالث من شهر سبتمبر يهدأ فيضان النيل الأزرق قليلاً ، ويأخذ الماء المخزون جنوب الخرطوم ينصرف إلى شمالها فيزداد تصريف النيل الأبيض من ٥٨٠ في أغسطس إلى ١١١٠ في سبتمبر إلى ١٤٠٠ متر مكعب

(١) ويلسكوكس وكريج : الجزء الأول ص ١٤٤ (الرى في مصر) .

فى أكتوبر وبعء ذلك يعوء النهر إلى جريانه الطبيعى . على أن هذه الظاهرة التى لاتنكر أهميتها ، قد غلا بعض الكتاب فى تقديرها ، فزعموا أن النيل الأزرق وقت فيضانه ، يحبس مياه النيل الأبيض جميعها ويمنعها من الجريان إلى الشمال بقاءاً^(١) ؛ وفى هذا شىء كثير من الإسراف .

* * *

النيل الأزرق :

يخرج الآبى من بحيرة طانا جدولا صغيراً ليس فى تصرفه ما يدل على الدور الهائل الذى يلعبه النهر العظيم . وليس الماء الذى يستمده الآبى من بحيرة طانا بمعاىل ولا مشابه لما يستمده نيل فكتوريا من بحيرته الكبرى . فنشأة النيل الأزرق نشأة متواضعة وأما نشأة نيل فكتوريا فذات شأن كبير . لكن حالة كل منهما بعد ذلك تختلف كل الاختلاف عن حالة الآخر . فالنيل الأزرق يزداد ضخامة وقوة فى كل خطوة يخطوها حتى يصبح تصرفه فى وقت الفيضان ٥٠٠٠ أو ٦٠٠٠ متر مكعب فى الثانية ، بينما نيل فكتوريا يتحول إلى نيل البرت ثم إلى بحر الجبل ، ولا يزال يفقد من مائه ومن قوته حتى يصبح تصرفه لا يكاد يبلغ عشر تصرف النيل الأزرق .

إذن ليس النيل الأزرق عند خروجه من بحيرة طانا بالنهر العظيم الخطر . ولكننا يهمنى أن نذكر هنا تصرفه عند خروجه من بحيرة طانا لأهمية هذه المسألة لمشروع تحويل البحيرة إلى خزان . وتصريف الآبى قرب مخرجه هو كما يلى :

(١٩٢٠ — ١٩٢١) .

(١) راجع مثلاً كتاب ويلسكوكس وكريج : الرى فى مصر ص ٢٧٣ وما بعدها .

يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو
٨٦	٥٤	٣٥	١٨	٨	٥
يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٥	١٤٣	٢٩٧	٣١٠	٢٠٩	١٣٢

ولا يزال النيل الأزرق يعظم ويزداد ماؤه حتى يصبح هو النهر المهيمن على نظام النيل وجريانه ؛ ففيضان النيل معناه قبل كل شيء فيضان النيل الأزرق ، ونقص النيل معناه نقص النيل الأزرق . وإذا كانت مصر هبة من النيل فهي هبة النيل الأزرق قبل كل شيء .

ويقاس تصريف النيل الأزرق قبيل الخرطوم بنحو ٢٠ كيلو متراً بالقرب من صوبا وهو كما يلي (١٩١٢ — ١٩٤٢) بالأمطار المسكبة في الثانية :

يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو
٢٩٧	١٩٤	١٥٨	١٢٨	١٩١	٤٨٧
يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
٢٣٠٠	٥٨٢٥	٥٥٩٠	٢٩٥٠	١٠٥٠	٥١٠

على أن النيل الأزرق قد يتجاوز هذه المقادير ويزداد تصريفه إلى ١٠٠٠٠ م^٣ في الثانية أو أكثر في سنين الفيضان العالي .

ولا يستمد النيل ماءً جديداً شمال الخرطوم إلى البحر اللهم إلا ماء العطبرة . وهو نهر جاف في خمسة شهور (يناير إلى مايو) يملى حتى ينعف في شهر أغسطس ثم ينخفض بسرعة كما امتلاً بسرعة . وتصريفه موضح في الصفحة التالية (١٩١٢ — ١٩٤٢) .

ويمتاز العطبرة بأنه أكثر أنهار النيل طيناً ، ونسبة الرواسب التي يحملها أكبر من أي نهر آخر من أنهار النيل بالنسبة إلى حجمه . فالنيل الأزرق في شهر أغسطس

يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيه
—	—	—	—	—	٣٤
يوليه	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
٦٨٠	٢٠٠٠	١٣٤٥	٣٠٠	٦٨	١٨

مثلاً يحمل من الرواسب نحو كيلو جرام في كل متر مكعب من الماء . بينما العطبرة في الشهر نفسه قد يحمل ثلاثة كيلو جرامات أو أكثر في كل متر مكعب من الماء ^(١) .
وأما النيل الأبيض فيتراوح مقدار ما يحمله من الرواسب في الصيف من ١٠٠ إلى ٢٠٠ جرام .

ونذكر بهذه المناسبة أن مقدار ما يحمله نهر النيل كله من الرواسب إلى القطر المصري يقدر بنحو ٨٥٠٠٠٠٠٠ طن ^(٢) . هذا بصرف النظر عما يحمله النهر من الأملاح الذائبة في مائه .

بعد التقاء العطبرة بالنيل يصبح النهر بلا مورد آخر يزيد في مائه . وكل ما هنالك أن مقداراً من مائه يفقد بالتبخر ما بين العطبرة والبحر . وقد يحسن أن نوضح هذه الحقيقة في الجدول المدرج بالصفحة التالية ، المبين فيه تصرف كل من النيل الأبيض والأزرق والعطبرة من جهة ، ثم تصرف نهر النيل عند وادي حلفا من جهة أخرى .

فالمتوسط السنوي لتصرف النيل الأبيض والأزرق والعطبرة معاً هو ٢٨٢٠ بينما متوسط تصرف النيل عند وادي حلفا هو ٢٧٤٠ متراً مكعباً في الثانية ، والفرق بينهما نتيجة التبخر فقط ومقداره ليس بالكبير إذا ذكرنا المسافات الشاسعة التي يقطعها النهر وسط فياف جرداء لا تمدّه بشيء من الماء .

(١) ويلسكوكس وكريج : الري في مصر ص ٤٧ .

(٢) الكتاب نفسه ص ٦٧٩ .

النهر	النبيل الأبيض	» الأزق	العبارة	مجموع الثلاثة	النبيل عند وادى حلفا
يناير	٩٣٠	٣٨٨	—	١٣١٨	١٤٢٠
فبراير	٧٠٠	٢٥٣	—	٩٥٣	١٠٣٠
مارس	٥٧٠	١٧٤	—	٧٤٤	٧٦٠
أبريل	٥٤٠	١٢٥	—	٦٦٥	٦٢٠
مايو	٥٥٠	١٥٢	—	٧٠٢	٥٧٠
يونيو	٦٢٠	٣٧٨	٣٣	١٠٣١	٦٨٠
يوليو	٥٩٠	١٩١٧	٦٥٠	٣١٥٧	١٧١٠
أغسطس	٥٨٠	٥٦٩٣	٢١٠٠	٨٣٧٣	٧٠٢٠
سبتمبر	١١١٠	٥٨٨٠	١٣٩٠	٨٣٨٠	٨٤٤٠
أكتوبر	١٤٠٠	٣٣٠٨	٢٨٠	٤٩٨٧	٥٧٢٠
نوفمبر	١٢٢٠	١٣٤٤	٦٦	٢٦٣٠	٢٩٧٠
ديسمبر	١٠٩٠	٦٥٨	١٦	١٧٦٤	١٨٦٠
متوسط	٨٢٠	١٦٢٠	٣٨٠	٢٨٢٠	٢٧٤٠

بقيت مسألة هامة في مائية

نهر النيل تجب الإشارة إليها .
وهي أن مراجعة أرقام التصريف
النهرى من شهر لشهر بل من
أسبوع لأسبوع تفيدنا فائدة
كبيرة في تفهم نظام جريان
النهر وفيضانه وفي توضيح مدتي
الانخفاض والارتفاع ، ولكن
هنالك حساب آخر لمجموع
ما يجرى في النهر من الماء سنويا
في موضع ما ، وهذا يحسب
عادة بمليارات الأمتار المكعبة ،
أو بالكيلو مترات المكعبة ،
وهذا المقدار بالطبع ليس واحداً
في كل عام ، ولكن معرفة
المتوسط لأعوام كثيرة أمر
مهم . ويحسن كذلك أن نعرف
شيئاً عن السنين الشاذة التي
ينقص فيها هذا المقدار إلى درجة

قد تعتبر خطرة . والجدول الآتى يوضح لنا المتوسط السنوى لهذه المقادير في بضعة
مواقع هامة على نهر النيل وروافده :

متوسط التصريف السنوى (١٩٠٦ — ١٩٢٣) بـمليارات الأمتار المكعبة

الموضع	متوسط التصريف السنوى	أعلى مقدار معروف	أقل مقدار معروف
منجلا	٢٧,٠٠	(١٩١٧) ٥٥,٧٢	(١٩٢٢) ١٥,٢٣
بحر السوبات	١٤,٤٧	(١٩١٨) ٢٣,١٨	(١٩١٣) ٩,٥٣
نهاية بحر الزراف	٤,٥١	(١٩١٨) ٩,١٢	(١٩٢٢) ٢,٨٤
نهاية بحر الجبل	٩,٨٤	(١٩١٨) ١١,٥٤	(١٩٢٢) ٧,٥٤
نهاية بحر الغزال	٠,٦٣	—	—
ما يصل إلى ملا كال من) مياه بحر الجبل والزراف)	١٤,٣٥	(١٩١٨) ٢٠,٦٦	(١٩٢٢) ١٠,٣٧
النيل الأبيض عند ملا كال	٢٩,٤٥	(١٩١٨) ٤٤,٤٧	(١٩١٣) ٢٣,٧٨
النيل الأبيض عند الخرطوم	٢٦,٤٦	—	—
النيل الأزرق (عند صوبا)	٥٣,٧٥	(١٩١٦) ٨٨,٠٠	(١٩١٣) ٢٥,٠٠
العطبرة	١١,٦٤٠	(١٩١٦) ٢٧,٠٠	(١٩١٣) ٥,٠٠
مجموع الثلاثة	٩١,٨٥	—	—
النيل عند وادى حلفا	٨٩,٣٠	—	—
» » أسوان شمال الخزان	٨١,٧٩	(١٨٧٩) ١٢٩,٠٠	(١٩١٣) ٤٤,٠٠

فإذا تأملنا هذا الجدول قليلاً^(١) بدت لنا فيه أمور :

(١) جميع أرقام هذا الجدول منقولة من نشرات مصلحة الطبيعيات . خصوصاً :

Hydrographical Data in the S. Sudan, 1926. Discharges of the Nile in (1919) (by P. Philips) (1925).

وقد اضطررنا للاحتفاظ بهذه الأرقام على الرغم من انتهاءها في سنة ١٩٢٣ لأن الأرقام الخاصة بالسنين الأخيرة لا تتناول جميع المحطات المذكورة .

أولاً : أن مياه بحر الجبل عند منجلا تبلغ في المتوسط مايقرب من ثلاثين ملياراً ولكن ما يصل منها إلى ملا كال لا يزيد على ١٤ ملياراً من الأمطار المسكبة .

ثانياً : نلاحظ أن بحر الجبل عرضة لأن تقل مياهه في بعض السنين بحيث لا تزيد عند منجلا على ١٥ ملياراً كما حدث في سنة ١٩٢٢ وقد كانت سنة قليلة الأمطار .

ثالثاً : أن النيل لا يفقد ما بين الخرطوم ووادي حلفا سوى مقدار يسير بينما الخسارة ما بين وادي حلفا وأسوان كبيرة . فمن ٩١٨٥ ملياراً للأشهر الثلاثة : النيل الأبيض والنيل الأزرق والعطبرة ، يصل إلى وادي حلفا ٨٩٣٠ مليار ولا يصل منها إلى أسوان غير ٨١٧٩ مليار . وليس الإقليم الذي بين العطبرة ووادي حلفا بمختلف كثيراً من حيث الحرارة عن الإقليم ما بين وادي حلفا وأسوان . ومع هذا يفقد النيل في المرحلة الأخيرة ثلاثة أمثال ما يفقده في المرحلة الأولى ، والسبب في هذا بالطبع أن خزان أسوان يحجز هذه المقادير الكبيرة من المياه فيعرض شطراً كبيراً منها للتبخر .

رابعاً : أن النيل الأزرق والنيل بأسره عرضة لاختلافات هائلة بين النقص والزيادة ؛ فقد كانت مياه النيل في أسوان ١٢٩ ملياراً في سنة ١٨٧٩ و ٤٤ ملياراً في سنة ١٩١٣ . أي أن ماء النيل قد يكون في سنة من السنين ثلاثة أمثاله في سنة أخرى . حقيقة أن هذا الشذوذ ليس بالقاعدة ، ولكن على هذه الأحوال الشاذة تتوقف الحياة الاقتصادية للملايين من السكان ، ولا بد لمن يفكرون في مشاريع النيل أن يذكروا هذه الأشياء ويحسبوا لها حسابها ، وإذا كانت مياه سنة ١٩١٣ لا تزيد على نصف متوسط ما يأتي به النهر عادة ، فإن ملء خزانات عظيمة تصبح مسألة غير سهلة الحل .

خامساً : أن سنة ١٩٢٢ كانت سنة جفاف نسبي في حالة الأشهر الاستوائية ،

أوسنة ١٩١٣ كانت سنة نقص كبير في حالة الأنهار الحبشية . ولكننا بمراجعة الأرقام التفصيلية لكل عام والتي لا يتسع لها المكان هنا ، نرى أن هذه السنين كانت سنى نقص سواء في الأقاليم الاستوائية أو في أنهار الحبشة وإن كانت أظهر في أحد الإقليمين منها في الآخر . وهذا يدلنا على أن هضبتى الحبشة والهضبة الاستوائية تتأثر كلتاها بمؤثرات متشابهة وإن لم تكن متفقة تماما .

ولا بد لنا في ختام هذا الفصل أن نشير إلى ظاهرة لا زلنا حديثي العهد بها ، ألا وهي الفيضانات الخطرة ، وقد كان فيضان عام ١٩٣٨ عام ١٩٤٦ من هذا الطراز . ومن المهم أن نذكر أن خطر الفيضان لا يحىء من أن مجموع مياه النهر في سنة من السنين يزيد على السنين الأخرى ، بل العبرة دائماً بما يجرى في النهر أثناء أشهر ثلاثة وهي يوليو وأغسطس وسبتمبر . وقد بدأ تصريف النيل الأزرق عام ١٩٤٦ بداية متواضعة جداً وكان تصريفه في النصف الأول من السنة أقل من المعدل بكثير ولكنه وثب في منتصف يوليو وفي أغسطس وسبتمبر وثبة هائلة سريعة ، فارتفع مستواه ارتفاعاً كبيراً في مدة وجيزة . وقد كان مجموع التصريف السنوى كله للنيل الأزرق ٦٤ ملياراً في تلك السنة ، كان منها في أغسطس وسبتمبر وحدهما ٤١ ملياراً . ولو كان هذا الفيضان موزعاً توزيعاً معتدلاً لما كانت له تلك العواقب الخطيرة .

الفصل الثاني عشر

مشروعات الري

لعل موضوع مشروعات النيل ليس تماماً من موضوعات الجغرافيا الطبيعية ، وقد يكون أقرب إلى الجغرافيا البشرية . ولكن ألف طالب الجغرافيا أن يرى بحث هذا الموضوع عقب الكلام على حالة النهر المائية لما بينهما من علاقة لا شك فيها . ومشروعات الري موضوع طويل يتناول ذكر كل شيء عمل أو قد يجعل التقدير مياه نهر النيل . ولو تناولنا بالبحث كل حالة لها علاقة بهذا الموضوع لاحتاج هذا الأمر إلى مؤلف قائم بنفسه . وسنضطر لأن نهمل ذكر أشياء كثيرة لها علاقة بالري ؛ كالترع والقنوات والمصارف الكثيرة الانتشار في حوض النيل الأدنى . وسنكتفي بذكر المشاريع البارزة التي أكملت أو التي قد يشرع في تنفيذها ، والتي كان لها أثر ملحوظ في تنظيم جريان النهر ولها من هذه الناحية أهمية خاصة لطالب الجغرافيا ، لأنها أحدثت تغييراً جوهرياً في النظام الصيفي للنهر .

قناطر الدلتا وأسبوط وإسنا وزفتى ونجع حمادى :

هذه المشاريع الخمسة — وفيها القديم والحديث — كلها من نوع واحد وتخدم أغراضاً متشابهة . وأولها من أقدم المشاريع التي أقيمت على النيل . والمشكلة التي أريد حلها ببناء القناطر هي مسألة تغذية الترع بالماء زمن الانخفاض وإيصال المياه إلى الحقول والمزارع بأيسر وأمرع وسيلة . فإما أن تكون القنوات والترع عميقة جداً حتى يمكن أن ينصرف إليها ماء النيل ، وإما أن يرفع ماء النيل بطريقة ما إلى مستوى الترع . أما تعميق الترع وما يستلزمه هذا

من المشقة في تطهيرها من متراكم الطمي في كل عام فأمر شاق كثير النفقات .
وعدا هذا فإن الترع إذا كانت عميقة الجرى فإن هذا معناه أنها تكون دون
مستوى الأراضي الزراعية بكثير ؛ وهذا يستلزم نفقات كثيرة لرفع المياه .

إذن كان لا بد من التفكير في رفع مستوى النهر في المواضع التي تستمد منها
الترع ماءها . وقد رأى محمد علي ذلك فقرر في سنة ١٨٣٣ أن يسد فرع رشيد في
زمن التحاريق بسد من الحجارة لكي يرفع مستوى فرع دمياط . . وكان هذا
الأخير هو الذي يمدأ كثر الترع بالماء . وكانت الخطوة الثانية أن اقترح لينان
باشا بناء قناطر على فرعي النيل ، شمال نقطة افتراق الفرعين بنحو ١٠ كيلومترات
ثم عدل هذا المشروع وتقرر بناء القناطر شمال نقطة الافتراق مباشرة . وقد بدى
في هذا العمل الكبير سنة ١٨٤٢ ولم يتم إلا في سنة ١٨٦١ . وفي سنة ١٨٦٣
أمكن إغلاق فرع رشيد للمرة الأولى من أجل تعلية مستوى فرع دمياط . وقد
عملت ترميمات شتى في بناء القناطر بقصد تقويتها وذلك ما بين سنة ١٨٨٧ وسنة
١٨٩٠ والبناء عبارة عن قنطرة على كل من الفرعين : ذات فتحات (٧١ فتحة
لفرع دمياط و ٦١ لفرع رشيد) اتساع كل منها نحو خمسة أمتار . وجميع هذه
الفتحات تغلق عادة في أثناء شهر مارس لكي تحفظ مستوى النهر عاليا في أبريل
ومايو ويونيو . وعند بدء الفيضان تفتح جميع الأبواب فتتمر مياه الفيضان دون أن
يعوقها عائق . ومع ذلك فقد يمحتم إغلاقها — كلها أو أكثرها — في أثناء
فيضان ضعيف .

وفي كتاب ويلسكوكس وكريج وصف مطول لهذه القناطر وتاريخها .
ولكن المتقدين لهذا المشروع بأنه لم يكن محكما ومتينا من أول الأمر يتجاهلون
أن هذه البناء كان أول مشروع هائل فكر فيه ، وأول بناء ضخيم أقيم على نهر
النيل ، وقد استفاد المهندسون كثيرا من هذه التجارب الأولى فسهل هذا عليهم
فيما بعد بناء غيرها من القناطر ...

وقد أنشئت منذ بضع سنوات قناطر محمد على على بعد ٢٣ كيلو متراً من القاهرة ، وحلت محل قناطر الدلتا ، التي تقرر الاحتفاظ بها كبناء تاريخي مجيد . بعد أن ظلت تؤدي وظيفتها زهاء الثمانين سنة .

وكما أن قناطر الدلتا إنما أقيمت لكي تساعد على رفع مستوى النهر فتستفيد منه الرياحات مياهاها ، كذلك بنيت قناطر أسيوط لترفع مستوى النهر حيث تستفيد ماءها ترعة الإبراهيمية ، تلك القناة العظيمة التي حفرها إسماعيل لتغذي الشطر الأعظم من الأقاليم الوسطى بالوجه القبلي . والإبراهيمية أطول قناة في القطر المصري (٣١٨ كم) ومن أطول القنوات في العالم . وقد يبلغ تصرفها في الخريف زهاء ٨٠٠ متر مكعب . فهي بحجمها وطولها هذا أقرب إلى أن تكون نهراً صناعياً من أن تكون مجرد ترعة . فبناء قناطر أسيوط كان لازماً لتغذية الأراضي العديدة التي تروى من الإبراهيمية . والقناطر تعترض مجرى النهر شمال أسيوط مباشرة . وطولها يزيد على ٨٣٠ متراً ولها نحو ١١١ باباً عرض كل باب نحو خمسة أمتار وارتفاعه نحو اثني عشر متراً ، وبين كل باب والذي يليه فاصل عرضه متران . وهذا هو نفس النظام الذي اتبع في بناء قناطر الدلتا . وفي الناحية الغربية عمر تسير منه السفن ، مجهز بأبواب . وقد تم بناء القناطر في سنة ١٩٠٢ ، وبلغت تكاليفها نحو ٨٧٠.٠٠٠ جنيه .

وفي السنة التالية تم بناء قناطر زفتا . وفي سنة ١٩٠٨ قناطر إسنا ، التي ساعدت كثيراً على تحسين حالة الري في مديرية قنا . وجميع هذه القناطر ، وكذلك قناطر نجع حمادى ، التي تم بناؤها في عام ١٩٣١ ، كلها مبنية على النمط والطراز الذي بنيت به قناطر الدلتا وأسيوط وكلها متشابهة في الوظيفة التي تؤديها ؛ ومنذ عامين تم إنشاء قناطر إدفينا على مصب رشيد ، وهذه لها وظيفة أخرى ، وهى الاحتفاظ بمياه النيل من التسرب إلى البحر في زمن الانخفاض ، وحمايتها من طغيان مياه البحر من الوقت نفسه .

خزانه أسوان :

قد يحسن أن نذكر — ولو أن هذا من الأشياء الواضحة — أن بناء خزان
أمر يختلف عن بناء مجرد قناطر . فإن بناء سد ليخزن من ورائه مليار أو ملياران
من الأمتار المكعبة هذا شيء ؛ وبناء قناطر لمجرد رفع مستوى النهر وتحويل مائه
إلى جهة خاصة شيء آخر ، ولهذا كان بناء سد لحجز ماء النهر كله أو جله عملاً
هندسيا جسيما . وكان لا بد من تفكير طويل ومقارنة طويلة بين المشروعات
المتخلفة قبل البت في الأخذ بأحد المشروعات ونبذ ما عداه .

ونحن أبناء الجيل الحاضر قد ألفنا رؤية سد أسوان حيث هو اليوم واختزان
المياه حيث تحتزن الآن ، بحيث قد ننسى أن هذا المشروع لم يكن الوحيد الذي
فكر فيه . إن فكرة تخزين مياه نهر يفيض في موسم ويغيب في موسم آخر فكرة
تكاد تكون طبيعية . وقد فكر فيها المصريون منذ العصور القديمة . وبديهي
في نهر يأتي بماء زائد عن حاجة البلاد في فصل من فصول السنة ثم ينقص ماؤه
عن الحاجة في فصل آخر أن يفكر أهل البلاد في أن يدخروا من زيادته لنقصانه .
على أن الطبيعة نفسها قد علمت الإنسان في مصر الدرس الأول في تخزين
مياه النهر . فقد كان النيل إبان الفيضان يغمر مساحة كبرى في ذلك المنخفض
العظيم الذي ندعوه اليوم بالفيوم . كان النيل متصلاً بهذا المنخفض في بعض العصور
اتصالاً مباشراً . فكان النهر — والإنسان بعد في حالة أولية — يغمر هذا
المنخفض وقت الفيضان . حتى إذا أخذ ماء النهر ينقص ومستواه ينخفض عاد إليه
شطر عظيم من هذا الماء المخزون . هذه هي الحال الطبيعية التي أوحى إلى بعض
حكام مصر أن يحولوا هذا الخزان الطبيعي إلى الخزان الصناعي المشهور الذي يعرفه
الناس باسم بحيرة مورييس . وذلك بتنظيم ملء هذه البحيرة ، ثم تنظيم تفريغها
في زمن البحاريق .

وقد بقيت بحيرة مورييس تؤدي وظيفتها الهامة إلى زمن هيرودوت واصطرابون ثم أخذت تتلاشى على مضي القرون بسبب الإهمال في جهة ، ولحاجة الحكام إلى أرض جديدة للزراعة في إقليم الفيوم أو لانخفاض مستوى النهر بحيث بات من المتعذر استبقاء الصلة بينه وبين المنخفض ، اللهم إلا عن طريق بحر يوسف الذي يحمل الماء إلى الفيوم ولا يحمله منها ، وهكذا أخذت البحيرة تتضاءل حتى باتت كما نعهدها اليوم : بركة قارون . وأصبح الجزء الأكبر من البحيرة أرضاً زراعية . وقد كان في جملة المشروعات التي فكر فيها مشروع بإحياء بحيرة مورييس ، لا في مكانها الأول الذي أسمى عامراً بالسكان ، بل بتحويل وادي الريان ، الذي لم يكن يوماً من الأيام جزءاً من بحيرة مورييس ، ولسكن قد يؤدي الوظيفة التي كانت تؤديها ، إلى خزان يملأ وقت الفيضان ويفرغ زمن انخفاض النهر .

ووادى الريان عبارة عن منخفض واقع إلى الجنوب الغربى لمديرية الفيوم ، يفصله عن منخفض الفيوم حاجز من حجر الجير ارتفاعه فوق سطح البحر نحو ٣٦ إلى ٦٠ متراً . ولكنه في بعض المواضع منخفض بحيث لا يزيد ارتفاعه على ٢٦ متراً فوق سطح البحر . وهذا في مساحة طولها ٦٠٠ متر .

وقاع وادى الريان منخفض في بعض المواضع عن سطح البحر بنحو ٤٠ متراً . ومساحة الوادى — إذا حصرناه في داخل خط ارتفاع ٢٧ — تبلغ ٦٧٣ كيلو متراً مربعاً . وسعته تبلغ أكثر من ثمانية عشر ملياراً من الأمتار المكعبة ... وبين الوادى وبين النيل نحو ٣٠ كيلو متراً من الصحراء يليها وادى النيل الخصب وعرضه هنا عشرون كيلو متراً .

ونظراً لأن وادى الريان منخفض لا عن سطح البحر فقط بل منخفض كثيراً عن وادى النيل ، كان لا بد من ملئه بالماء وتحويله إلى بحيرة يصل مستواها إلى ٢٧ متراً فوق سطح البحر في زمن الفيضان . ثم يرد جزء من مائها في أشهر الربيع وأوائل الصيف بحيث ينخفض مستواها إلى ٢٤ متراً فوق سطح البحر .

فليس كل ما في البحيرة من الماء المخزون والذي يمكن استخدامه في رى الأراضي المصرية ، وإنما هو الثلاثة الأمطار العليا ما بين مستوى ٢٤ و ٢٧ ، وقد قدر ويلسكوكس أن خزان الريان يمكن في هذه الحالة أن يمد بلاد مصر شمال بنى سويف في أوائل الصيف بفحو مليارين من الأمطار المسكوبة .

وكان هذا المشروع يقتضى عمل قناة خاصة واسعة تمتد من نهل النيل جنوبى بيا إلى وادى الريان . وتكون وظيفتها أولاً المساعدة على ملء البحيرة ، وهذا قد يستغرق سبع سنوات ، بعدها تستخدم القناة في تصريف ماء البحيرة إلى نهر النيل . بينما يكتفى ببحر يوسف لملء البحيرة في أشهر الخريف والشتاء^(١) .

كان المعارضون لهذا المشروع كثيرين ... قالوا بعدم صلاحيته لأسباب كثيرة أهمها أن تخزين المياه إلى هذا المستوى العالى يسبب تلف كثير من أراضي الفيوم بالنشع ، وأن وادى الريان قد يشتمل في مواضع كثيرة على شقوق أو انكسارات يتسرب منها الماء فيتعذر أو يستحيل ملؤه بالماء . وأنه على فرض إمكان ملئه بالماء فإنه لا يمكن أن يغذى النيل إلا في شهر أبريل ومايو . وبعد هذا يكون تصريفه ضعيفاً جداً في يونيو ومنعدماً في يوليو حين تشتد الحاجة إلى الماء . وفوق ذلك فإن جزءاً عظيماً من القطر المصرى لا ينتفع بماء الخزان .

لهذه الأسباب وغيرها عدل عن مشروع خزان وادى الريان ، وعدل حتى عن فكرة استخدام هذا الوادى كمصرف لمياه الفيضان ، إذا كان الفيضان خطراً . وقد طوى مشروع وادى الريان بنوع خاص إذ كانت صلاحيته مشكوكاً فيها بينما مشروع خزان في نفس وادى النيل وفي مجرى نهر النيل كان شيئاً غير مشكوك في صلاحيته .

(١) راجع ويلسكوكس وكريج الجزء الثانى ص ٦٨٠ وما بعدها .

لم يكن في حوض النيل بمصر ، أو على مقربة من حوض النيل منخفض آخر صالح لأن يكون خزاناً لمياه النهر ، سوى منخفض وادى الريان المذكور ؛ فالصحراء الشرقية والغربية كليهما خالية من المنخفضات الواسعة العميقة الطبيعية القريبة من وادى النيل فلم يعد هنالك مندوحة من الانصراف إلى المشروع الثانى الذى فكر فيه فى نفس الوقت الذى أعد فيه مشروع الريان . والمشروع الآخر هو تخزين ماء النهر فى نفس مجرى النهر ، بإقامة سد متين فيه ، تتجمع من ورائه مياه النهر وقت الزيادة ، ثم تصرف مياهه وقت الانخفاض بقدر الحاجة . وأول ما يخطر لنا أن هذا الخزان يمتاز على الأول بشئ جوهري وهو أن جميع المياه المخزونة يمكن استخدامها والانتفاع بها ، بينما الخزان الأول لابد أولاً من ملئه بالماء إلى مستوى ٢٧ متراً ، ثم لا ينفذ منها إلا بالثلاثة الأمتار العليا ... وكان لابد من اختيار الموضع الصالح لبناء ذلك السد فى نهر النيل . وقد روى أن هنالك مواضع ثلاثة قد تصلح لهذا الأمر وهى السلسلة والكلاشة وأسوان ... فأما الموضع الأول فإن الصخور التى تحف النهر — وهى من الخرسان النوبى — ضعيفة البنية قليلة الصلابة . وأما باب الكلاشة فصخره جرانيتية متينة ولكن النهر هنا عميق جداً بحيث يستدعى بناء السد نفقات باهظة . إذن لم يبق غير أسوان مكاناً صالحاً لبناء السد . فالصخور التى تكون مجرى النهر هنا متينة ، وليس الجرى بالشديد العمق حتى يتعذر بناء السد فيه . والنهر متسع الجرى بحيث يمكن بناء سد طويل فيه جميع الفتحاح اللازمة الكافية لمرور جميع مياه الفيضان وقت الفيضان ... على أن حسن هذا الموقع وصلاحيته كانت تشوبها شائبة خطيرة . وهى أن بناء السد فى هذا الموضع وتخزين الماء ما بين أسوان وحلفا سيؤدى حتماً إلى رفع مستوى النهر فى هذا الجزء من وادى النيل إلى درجة كبيرة بحيث يغمر الماء عدداً عظيماً من الهياكل المصرية القديمة والتحف الأثرية العديدة وعلى الأخص قصر أنس الموجود الموجود فى

في مستوى ١١٣ متراً فوق سطح البحر يسع الخزان ٢٤٢٥ مليون متر مكعب من الماء (التعليمة الأولى) .

في مستوى ١٢٠ متراً فوق سطح البحر يسع الخزان ٥٠٠٠ مليون متر مكعب من الماء وهو المستوى الذي تجاوزه التعليمة الثانية .

إذن فإن الخزان كما بنى للمرة الأولى — وقد شرع في بنائه في سنة ١٨٩٨ وتم في آخر سنة ١٩٠٢ وملى للمرة الأولى في سنة ١٩٠٣ — لم يكن يسع غير مليار واحد من الأمطار المسكبة . ولهذا أخذت الأنظار تتجه إلى ضرورة تعليته ، فيقرر في سنة ١٩٠٧ أن يشرع في تقوية الخزان وتعليته بحيث يصبح مستوى الماء فيه إذا ملى ١١٣ متراً فوق سطح البحر . وقد تمت هذه التعليمة في سنة ١٩١٢ ، وبذلك ضوعفت سعة الخزان . وقد بلغ ما أنفق من المال في عمل هذا الخزان نحو ٤٢٢٠.٠٠٠ ر جنييه وهذا بيانها :

الخزان في حالته الأولى	٢٤٤٠.٠٠٠ ر جنييه
تقوية قاعدة الخزان	» ٢٨٠.٠٠٠
التعليمة إلى مستوى ١١٣	» ١٨٠.٠٠٠
نزع ملكية وتعويضات الخ	» ٣٢٠.٠٠٠
المجموع	٤٢٢٠.٠٠٠ ر جنييه

وهذا بالطبع مبلغ كبير ، إذا أضيف إليه نفقات التعليمة الثانية وقد تجاوزت مليونين ونصف مليون من الجنيهات ، أصبح مقدار ما أنفق على الخزان أكثر من سبعة ملايين من الجنيهات^(١) . ومن غير شك قد جنت البلاد من وراء ذلك منافع مختلفة .

وسد أسوان كما هو الآن عبارة عن بناء مقين مشيد عند الطرف الشمالي

(١) هذا عدا التعويضات الكثيرة التي دفعت بعد التعليمة الجديدة .

لشلال أسوان ، وممتد من الشاطئ الأيمن إلى الأيسر على خط مستقيم طوله نحو كيلو مترين . والجزء الشرقى من السد (أكثر من ٥٠٠ متر) خال من الفتحات بينما الشطر الأعظم (إلى الناحية الغربية) به نحو ١٨٠ فتحة أكثرها سبعة متران وارتفاعه سبعة أمتار ومجهزة بأبواب تفتح وتغلق حسب نظام ملء الخزان وتفريغه . والسد مبني على قاع النهر : وهو غالباً من الجرانيت . ولو أنه أكثر صلابة في بعض المواضع منه في غيرها . وارتفاع السد عن قاع النهر في بعض المواضع يبلغ الأربعين متراً . وسمك السد في أعلاه يزيد على عشرة أمتار . وعند القاع يبلغ الثلاثين متراً . وبناء السد رأسى أو مائل قليلاً في الجهة الجنوبية ولكنه مائل كثيراً إلى الجهة الشمالية لكي تكون مقاومته لضغط الماء عظيمة . والطريق الممتد على سطح السد يبلغ ارتفاعه ١٢٣ متراً فوق سطح البحر . ولو أن مستوى التخزين قلما يزيد على ١٢١ متراً .

ولقد أثر الخزان في جغرافية النهر بعض التأثير ، فبقطع النظر عن الأراضي التي استفادت من ماء الخزان بتحسين حالة الري فإن نظام النهر نفسه قد عدل تعديلاً جوهرياً بسبب إنشاء الخزان . كان مستوى نهر النيل عند الشلال قبل بناء السد نحو ٩٥ أو ٩٦ متراً فوق سطح البحر في زمن الفيضان وأقل من هذا بنحو عشرة أمتار في زمن الانخفاض . وكانت المناسيب أقل من هذا عند بلدة أسوان ، أما الآن فإن مستوى الخزان إذا ملئ يصل إلى ١٢١ متراً فوق سطح البحر ، وقلما ينخفض المستوى إلى أقل من ٩٥ متراً . وكذلك أحدث إنشاء الخزان حالة جديدة في تصريف النهر ، ففي أيام الفيضان تفتح جميع أبواب الخزان بحيث يمكن لجميع مياه الفيضان مهما كان عالياً وقويا أن يمر من تلك الفتحات بسهولة دون أن يعوقه عائق بسبب تراكم كثير من الرواسب في الخزان . وأما في غير زمن الفيضان فإن الأبواب تغلق تدريجياً حين يراد ملء الخزان ، بحيث يكون تصريف النهر عند بلدة أسوان تابعاً لضرورة ملء الخزان .

أصبح إذن مستوى النهر جنوب السد ولا علاقة له بتصريف النهر . ومن قبل إنشاء الخزان كان التصريف تابعا لمستوى النهر . فإذا ارتفع المستوى زاد التصريف . أما اليوم فالحالة — جنوب السد — هي بعكس هذا تماما فإن مستوى النهر يرتفع عند تمام امتلاء الخزان إلى ١٢١ متراً (أو أكثر قليلا) . وفي هذه الآونة يقل تصريف النهر . أما في زمن الفيضان فيفتح أبواب الخزان جميعا . ويكون مستوى النهر أقل منه في أى وقت آخر . وأما التصريف فهو أعلى ما يكون . وفي الجدول الآتى بيان لمستوى نهر النيل جنوبى سد أسوان وتصريف النهر :

الشهر	مستوى النهر بخزان أسوان مترا فوق سطح البحر الأبيض	التصريف بالأمتار المكعبة في الثانية (شمال السد مباشرة)
يناير	١٢٠,٨٠	١١٤٠
فبراير	١٢٠,٧٢	٩٤٠
مارس	١٢٠,٢٩	٧٦٠
أبريل	١٢٠,٤٦	٧١٠
مايو	١١٨,٧٥	٧٧٠
يونيو	١١٢,٠٥	٩٩٠
يوليو	١٠٢,٥٩	١٦١٠
أغسطس	٩٨,١٥	٦٢٠٠
سبتمبر	٩٨,٢٥	٧٦٧٠
أكتوبر	١٠١,٥١	٥٤٦٠
نوفمبر	١١٣,٨٢	٢٨٥٠
ديسمبر	١١٨,٣٧	١٥٥٠

فمستوى النهر في الخزان مخالف تماما لتصريف النهر عند أسوان . وعدا هذا لا بد لنا أن نلاحظ أن مستوى النهر قبل بناء الخزان لم يكن يزيد على ٩٥ أو ٩٦ متراً إلا نادراً . أما اليوم فإنه يزيد إلى ١٢١ متراً أى أنه يزيد بنحو ٢٦ متراً عن المستوى الأعلى قبل بناء الخزان . ومعنى هذا أن جميع الأراضي الملاصقة للنهر والتي

كانت فيما مضى أعلى من مستوى النهر في زمن الفيضان بنحو ٢٦ متراً تغمرها الآن مياه الخزان . وقد زادت مساحة هذه الأراضي بعد العملية الثانية زيادة كثيرة إذن فالخزان وقت امتلائه (وخصوصاً شهر فبراير ومارس وابريل) يكون بمثابة بحيرة مستطيلة تحتل مجرى النيل القديم وجميع الأراضي التي حوله التي مستواها لا يزيد على ١٢١ متراً فوق سطح البحر . وامتداد هذه البحيرة هو من شلال أسوان شمالاً إلى قرب بلدة كاجنارتى جنوب وادى حلفا ، أى أن طول هذه البحيرة يبلغ ٣٦٠ كيلومتراً .

وجميع المياه المخزونة في هذه البحيرة الصناعية تفرغ سنوياً لتوصيلها إلى أراضي القطر المصرى في الأشهر التي تشتد فيها حاجة البلاد إلى الماء . فالبحيرة إذن ذات شكل ومساحة متغيرين بحيث تكبر في الربيع ثم تأخذ في الانخفاض والانكماش من أول مايو إلى أن تتلاشى في منتصف يوليو ويظل مستواها منخفضاً إلى منتصف الخريف . ويكون البدء في ملئها عادة في النصف الأول من أكتوبر حين ينخفض مستوى نهر النيل في أسوان إلى نحو ٩٠ متراً فوق سطح البحر ، وحين يكون ماء النهر خالياً نوعاً ما من الرواسب الكثيرة . فإن ملء الخزان بالماء ذى الرواسب الكثيرة مما يدعو إلى تراكم الطين فيه ، وهذا يجعله في النهاية محدود الفائدة . وفي الوقت الحاضر قد لا يخلو الأمر من تراكم بعض الرواسب جنوب السد ، وإن لم يكن هنالك شاهد محسوس يدلنا على ذلك ، مع أن خزان أسوان قد مضى على بنائه نحو خمسين عاماً .

وقد كان من المسائل الهامة التي استشير فيها الخبراء عند التفكير في عملية خزان أسوان للمرة الثانية هى مسألة إمكان ملء الخزان إلى المستوى المطلوب (١٢٠ — ١٢٢ متراً) وهل تصريف النهر في وقت خلوه من الرواسب كاف لملء الخزان بعد العملية الجديدة . وقد كان جواب الخبراء على هذا السؤال بالإيجاب ، وبأنه من الممكن ملء الخزان إلى المستوى الجديد إذا بدىء في ملئه عند ما يكون مستوى

النهر في أسوان ٩٠ أو ٩١ متراً بديل ٨٧ أو ٨٨ ، وليس في هذا أي خطر جديد من حيث احتمال تراكم الرواسب^(١)

وذكرت اللجنة الدولية أن ملء الخزان تماماً بعد التعلية الجديدة قد لا يكون ممكناً في بعض السنين حين تكون مياه النيل شحيحة . ومع أن أمثال هذه السنين نادرة ، غير أن إنشاء خزان جبل الأولياء قد أضاف صعوبة جديدة . وإذا راجعنا فيضان النيل في الثمانين عاماً الماضية ، وجدنا أنه سيقدر أو يستحيل ملء الخزان تماماً في تسع سنين منها . وقد ترتب على التعلية التي تمت في عام ١٩٣٤ زيادة مقدار الماء الممكن خزنه إلى ٣٨٠ مليوناً من الأمتار المكعبة . وهو المشروع الوحيد الجديد الذي وافقت عليه جميع الهيئات بعد دراسة وافية وبحث شامل ، بخلاف خزان جبل الأولياء ومشروعات النيل الأعلى التي قامت عليها اعتراضات ، واستغرقت بحثاً طويلاً . والراجح عند أكثر الباحثين أن خزان أسوان قد رفع إلى أقصى مستوى يمكن أن يبلغه ، ولذلك لا ينتظر أن تكون هنالك تعلية ثالثة . ولو أنه من الجائز أن يرفع مستوى الخزان إلى ١٢٢.٥٠ متر فوق سطح البحر في المستقبل^(٢) .

وبالطبع قد كان لبناء هذا الخزان العظيم شأن كبير في حياة مصر الاقتصادية ، فكثير من الأراضي التي كانت تروى بطريقة ري الحياض أصبح من الممكن تحويلها إلى طريقة الري المستديم . وكذلك كثير من الأراضي البور باتت من جملة الأراضي المنزرعة . وهذه الحال كلها ازدادت بعد التعلية الثانية بحيث أصبح اعتماد سكان هذا القطر على هذا الخزان الصناعي هو الظاهرة الكبرى للحياة الاقتصادية في مصر . وأي حادث أو طارئ من أي نوع كان يصيب هذا الخزان

(١) راجع مذكرة وزير الأشغال وخلاصة تقرير اللجنة الدولية عن مشروع التعلية بعدد ٢٠١ فبراير سنة ١٩٢٩ من جريدة الأهرام .

(٢) لم يكن من المتعذر أن يبنى سد أسوان بارتفاع أكبر مما يبلغه اليوم ، بحيث يحتوي الخزان مقداراً أكبر مما يحتويه الآن ، على شرط أن يكون هذا البناء قد تم على دفعة واحدة . غير أن هذه التعليقات المتكررة هي بمثابة الترقيع ، ولا يمكن التماهي فيها بعد اليوم .

سيكون له من غير شك تأثير عميق جداً في حياة البلاد الاقتصادية .

خزان سنار :

ننتقل الآن إلى المشروع الخطير الآخر الذي له في السودان ، أو على الأقل في الجزيرة ، منزلة تعادل ، بشكل مصغر ، منزلة خزان أسوان في مصر . وذلك هو مشروع خزان سنار .

وسنار بلدة ذات شأن واقعة على الضفة اليسرى للنيل الأزرق بينها وبين الخرطوم نحو ٣٦٠ كيلومتراً . وقد نتساءل : لماذا وقع الاختيار على هذا الموضع دون سواه لبناء خزان على النيل الأزرق ؟ إن مشروع بناء هذا الخزان مرتبط بمشروع رى الجزء الشمالى للجزيرة ، وهو الجزء الذى اختير لأن يزرع قطناً ويروى بماء مستمد من النيل الأزرق ، فكان لابد من بناء سد على النيل الأزرق ثم حفر قناة تغذى من هذا النهر وراء السد وتغذى الإقليم المراد زراعته قطناً .

والإقليم الذى أريد البدء بزراعته (٣٠٠.٠٠٠ فدان) واقع على الضفة اليسرى للنيل الأزرق ابتداء من خط عرض ١٤ إلى ٣٥ ر ١٤ . وقد يتبادر إلى الذهن لأول وهلة أن السد يجب أن يبنى بالقرب من هذه الأراضى وأن القناة تحفر بحيث تصل بين النيل وبينها مباشرة . ولكننا متى ذكرنا أن مستوى الأراضى على ضفاف النيل الأزرق عادة أعلى من مستوى النهر حتى في زمن الفيضان تبين لنا جلياً أنه لابد من أن تحفر القناة بحيث تخرج من النيل في موضع أعلى ، أى إلى الجنوب قليلاً .

وسنار هى أقرب موضع على النيل ، بالنسبة للأراضى المراد زرعها قطناً ، يمكن أن يبنى فيه السد بحيث تخزن وراءه المياه وتحفر القناة ، فيتحدّر منها المياه بسهولة إلى أرض الجزيرة .

وكان لابد لبناء السد من اختيار جزء من النهر يكون قاعه صخرياً صلباً .
 وكان أقرب موضع يتوافر فيه هذا الشرط الهام هو موضع اسمه مكوار على مسافة
 ثمانية كيلومترات جنوب سنار . فهنا تقرر بناء السد وشرع فيه في عام ١٩١٤ .
 ثم أوقف العمل أثناء الحرب واستؤنف بعدها ، وتم بناؤه في سنة ١٩٢٥ . وفي
 صيف وخريف تلك السنة ملء الخزان للمرة الأولى لتغذية أراضي الجزيرة التي
 تقرر البدء بزرعها . وكان المشروع الأول يرمى إلى خزن المياه بدرجة يمكن معها
 استثمار نصف مليون من الأفدنة . ولكن جاء النيل شحيحاً جداً في سنة ١٩١٣
 فتقرر تخفيض هذا المقدار إلى ٣٠٠.٠٠٠ فدان . وفي أواخر سنة ١٩٢٤ أنذرت
 حكومة انكلترا مصر — بمناسبة مقتل السردار — بأنها ستستخدم ما شاءت
 من مياه النهر لتزرع ما شاءت من الأراضي . ثم رأت بعد ذلك أن تعدل عن
 هذا الإنذار بشرط أن تقام لجنة دولية تبت في مسألة نصيب كل من مصر
 والسودان في ماء النيل . وقد قدمت اللجنة الدولية تقريرها في سنة ١٩٢٥ ولكنه
 لم ينشر للناس إلا في سنة ١٩٣٠^(١) .

وسد مكوار بناء عظيم طوله من الضفة اليمنى إلى اليسرى أكثر من ثلاثة
 كيلومترات ، وهو مبني في الطرفين الشرق والغرب بالطين . ولكنه في الوسط
 مشيد بالجرانيت . وفي وسطه فتحات كافية لأن تمر منها مياه النيل الأزرق حتى
 في السنين التي يصل فيها تصريف النهر إلى ١٥٠.٠٠٠ م^٣ في الثانية . وإن لم يعرف
 عن النهر أن تصريفه قد بلغ هذا المقدار . والخزان يحتوي عند امتلائه
 ٧٨١.٠٠٠.٠٠٠ متر مكعب من الماء . ويكون مستوى سطح الماء في الخزان

(١) هذه اللجنة كانت مؤلفة من هولندي ومصري وانكليزي برئاسة الأول . وقد
 توفي الرئيس الهولندي كريم . وقدم العضوان الآخران (عبد الحميد سليمان وما كريجور)
 تقريرهما . ولقد كان أسوأ ظاهرة بدت في حادثة السردار لإنذار الحكومة الإنكليزية المذكور .
 فقد بين هذا أنه من العبث الاتفاق مع تلك الحكومة على أي شيء خاص بتلك المياه ما دام
 في قدرتها أن تعبت بهذا الاتفاق كلما أرادت ذلك .

٤٢٠٧٠ متراً فوق سطح البحر . (وسطح السد نفسه ٤٢١٨٠ متراً) . غير أن هذه الأرقام قد عدلت في صيف سنة ١٩٥١ ، عند ما طلبت إدارة السودان ووافقت الحكومة المصرية على رفع مستوى التخزين بمقدار متر .

ويختلف خزان سنار عن خزان أسوان ، بأن مصر يمكنها الانتفاع بكل ما يخزن في خزان أسوان ، أما أراضي الجزيرة فنظراً لارتفاعها عن مستوى النهر فإنها لا تنفع إلا بالجزء الأعلى من الماء المخزون . فإذا كان في خزان سنار مثلاً ٣٠٠ مليون من الأمطار المكعبة فإن هذا لا يفيد أرض الجزيرة كثيراً لأن مستوى الخزان عندئذ يكون أقل من ٤١٧ متراً ، ولا يمكن أن تتغذى القناة من الماء المخزون على هذا المستوى . ولا بد من ملء الخزان إلى مستوى ٤١٧٢٠ متراً حتى يمكن تغذية القناة التغذية الكافية . والماء الذي يخزن فوق هذا المستوى هو الذي يمكن ادخاره والانتفاع به في ري الجزيرة .

في زمن انخفاض النيل الأزرق عند سنار يصبح مستوى الماء فيه نحو ٤٠٧ متراً فوق سطح البحر ، وفي الفيضان يصل المستوى إلى ٤١٥٧٠ متراً أي أن مستوى النهر العادي حتى في زمن الفيضان ليس كافياً لتغذية قناة الجزيرة التغذية القائمة . فلا بد من أحد أمرين إما تعميق القناة أو رفع مستوى الماء . . . وتعميق القناة ليس بالشئ اليسير خصوصاً إذا علمنا أنها تروى أرضاً غير منخفضة . فلا بد إذن من رفع مستوى النهر إلى ٤١٧٢٠ متراً حتى يسهل تغذية القناة التغذية اللازمة . ثم لا بد من رفعه بعد ذلك إلى المستوى الأعلى ٤٢٠٧٠ متراً حتى يخزن فيه مقدار آخر لتغذية القناة وقت الحاجة .

لقد كرر أيضاً أن أرض الجزيرة في حاجة إلى الماء ابتداء من منتصف يوليو . ومستوى النيل الأزرق لم يصل بعد إلى أعلاه ، فلا بد من حجز مقدار من الماء في الخزان في ذلك الوقت لرفعه إلى المستوى المطلوب .

هذه الأمور كلها لا بد من تذكرها وتفهمها جيداً حتى يتسنى لنا أن نفهم

المسائل المعقدة التي نتجت عن بناء هذا الخزان ، فهذه الأمور تفسر لنا جيداً لماذا يملأ الخزان على دفعتين :

في الدفعة الأولى يملأ الخزان من مستوى ٤٠٩ إلى مستوى ٤١٧ر٢٠ بحيث يحتوى ٣٣٠ مليوناً من الأمطار المسكبة . وهذه الملائة الأولى تكون مادة ما بين ١٥ و ٣٠ يوليو .

فالغرض من هذه الملائة الأولى هو رفع مستوى النهر من أجل تغذية قناة الجزيرة ، حين يرتفع مستوى ماء النهر إلى ٤١٧ر٢٠ متراً تسقى هذه القناة ماءها من فيضان النهر مباشرة ، وبالطبع لا يملأ الخزان في هذا الوقت إلا بالقدر الضروري جداً لأن الماء متشبع بالرواسب فيحسن ألا يخزن منه الشيء الكثير .

أما الماء الثانى فيبدأ عادة من ٢٧ أكتوبر تقريباً إلى أوائل ديسمبر ، وفي هذه الفترة يملأ الخزان من مستوى ٤١٧ر٢٠ إلى المستوى الأعلى ٤٢٠ر٧٠ ، ويزداد مقدار الماء المخزون من ٣٣٠ إلى ٧٨١ مليوناً^(١) من الأمطار المسكبة أى بمقدار ٤٥١ مليوناً ، وهذا المقدار الأخير هو الذى يمكن الارتفاع به فى الجزيرة . أما المقدار الأول ففائدته رفع مستوى النهر ، على أنه من الممكن بالطبع ، مع بقاء الخزان مملوءاً إلى الحد الأعلى ، أن يحول جزء من تصريف النهر نفسه إلى القناة من أجل رى الجزيرة .

وفي منتصف إبريل إلى ٣٠ منه تكون أرض الجزيرة قد استكملت حاجتها من الرى ، فيبقى بالخزان من الماء مقدار ٣٣٠ مليوناً لا يمكن استخدامها ، فهذه ترسل إلى مصر حيث تصل إلينا فى أواخر مايو ، ومقابل إعطاء مصر هذا المقدار من الماء تقوم إدارة الجزيرة بتحويل مقدار معادل من مياه النيل الأزرق إلى قناة الجزيرة أو برفعه بواسطة الآلات (وهذا يكون عادة فى شهر يناير وفبراير) .

(١) يزيد الماء المخزون إلى ما يقرب من مليار من الأمطار المسكبة بعد التعلية الجديدة المتفق عليها .

إذن فإن أصحاب مشروع الجزيرة وإن لم ينتفعوا مباشرة بالمياه المخزونة تحت مستوى ٤١٧٢٠ فإنهم بطريق المبادلة يحصلون على هذا المقدار من مياه النيل مباشرة .

ولفهم هذه النقطة الأخيرة يجب أن نذكر شيئين :

أولاً : أن قناة الجزيرة التي يبلغ أقصى تصرف لها الآن ١٦٨ متراً مكعباً في الثانية ، قد تستمد ماءها من خزان سنار فقط أو النيل الأزرق فقط أو من الاثنين معاً : جزءاً من الخزان وجزءاً من النهر .

ثانياً : أن هنالك اتفاقاً بين الحكومتين على أن ماء النيل الأزرق ما بين ١٨ يناير إلى ١٥ يوليو يخصص لسد حاجة مصر ولا يجوز تحويل جزء منه إلى قناة الجزيرة . اللهم إلا بطريق المبادلة الذي أشرنا إليه آنفاً . والذي معناه أن ما يؤخذ من النيل الأزرق في هذه المدة يرد إلى مصر في شكل مياه الخزان التي لا يمكن استخدامها في الجزيرة .

إذن نستخلص مما تقدم أن قناة الجزيرة تتغذى من النيل الأزرق مباشرة في شهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر . وقد كانت فيما مضى لا تأخذ من النهر سوى ٨٤ متراً مكعباً . ثم أريد زيادة هذا المقدار إلى ١٦٨ متراً مكعباً في الثانية . ولكن في اتفاقية النيل المعقودة في ٧ مايو سنة ١٩٢٩ ، تقرر ألا يزيد ما تأخذه القناة من ماء النهر مباشرة عن ١٢٦ متراً مكعباً في الثانية حتى سنة ١٩٣٦ . وهو التاريخ الذي كان يظن أن يتم فيه إنشاء خزان جبل الأولياء ، فتجد فيه مصر عوضاً عما يحجز من مياه النيل الأزرق .

أما شهر ديسمبر فهو الشهر الذي يملأ فيه الخزان ويبلغ ما تأخذه القناة من النهر مباشرة في أثناء هذا الشهر مقدراً يتراوح بين ١٢٦ و ٨٠ متراً مكعباً في الثانية حسب حالة النهر وفي يناير تأخذ القناة من النهر مباشرة ٨٠ متراً مكعباً ثم يقل هذا

المقدار إلى ٥٢ مترا مكعباً^(١) . وبعد ١٨ يناير تصبح مياه النيل الأزرق أكثر لزوما لمصر فلا يؤخذ منها شيء لأجل السودان إلا بطريق المبادلة كما أوضحنا من قبل وفي الوقت نفسه تقل حاجة أرض الجزيرة للماء قلة ظاهرة ، لأن جمع القطن — وهو المحصول الرئيسى — يبدأ فى شهر يناير .

بعد هذا كله من الطبيعى أن يتساءل الإنسان : إلى أى حد أفاد هذا المشروع وكيف كان أثره فى السودان ومصر ؟ — إن المشروع لم تمض عليه بعد سنون كثيرة بحيث تظهر التجارب المختلفة فى سنى الانخفاض ما إذا كان هنالك ضرر يلحق بمصر فى تلك السنين . ولعلنا لسنا بعد فى حالة تسمح لنا بإبداء رأى قاطع ، على أن إجماع المفكرين ، حتى ذوى الآراء المتناقضة منهم ، أنه فى السنين ذات المياه الغزيرة والفيضان العالى سيعم الرخاء ، وتجد مصر والجزيرة كفايتهما من ماء النهر دون أن يلحق بإحداها أذى من جراء الأخرى . بل قد نذهب إلى أبعد من هذا فنقول إنه فى زمن الفيضان الخطر قد يكون من صالح مصر جداً أن يحول جزء من ماء النيل إلى قناة الجزيرة فى شهر أغسطس وسبتمبر . فيقل تعرض أرض مصر لأخطار الفيضان .

على أن الاعتراضات على هذا المشروع إنما جاءت من التفكير فى سنى القحط أمثال سنة ١٩١٣ أو السنين التى هى أحسن منها قليلا ولكنها مع ذلك دون المتوسط .

فى مثل هذه الحال قد يعترض على المشروع مثلاً أن حجز جزء من مياه النيل عند سنار من ١٥ إلى ٣٠ يوليو بقصد ملء الخزان الملاءة الأولى قد يؤدى إلى تأخير وصول مياه الفيضان إلى مصر فى وقت الحاجة إليه ... وهذا الاعتراض لا شك فى وجاهته فإن المقدار الذى يراد خزنه وهو ٣٣٠ مليوناً من الأمتار

(١) كما هو مبين فى كتاب ضبط النيل لماكدونالد ص ٨٧ (نسخة انكليزية) ، وفى تقرير عبد الحميد سليمان وماكريجور .

المكعبة في مدة تتراوح بين ١٠ و ١٥ يوما معناه إنقاص تصريف النهر إنقاصا محسوسا . . ودرءا لهذا الخطر رأت الحكومة المصرية ، في اتفاقها الذي أشرنا إليه قبلا ، أن تشترط ألا يبدأ بملء الخزان إلا في وقت الذي يبالغ فيه تصريف النيل الأزرق والأبيض معا ١٦٠ مليوناً من الأمتار المكعبة في اليوم . وإلا تأخر موعد ملء الخزان ^(١) بنحو عشرة أو خمسة عشر يوما ، فقد ثبت أنه لو كان خزان سنار موجوداً في يوليو سنة ١٩١٣ وملء الملة الأولى من ١٥ إلى ٣٠ يوليو لأدى هذا حتما إلى تأخير وصول الماء اللازم لرى أراضى مصر . فالشرط المذكور في الاتفاقية هو الضمان لمصر بأن الخزان لا يبدأ في ملئه إذا كانت حالة النهر في هذا الشهر هي حالة متوسطة أو فوق المتوسط ، وإذا نفذ هذا الشرط فلا خطر على مصر من هذه الناحية .

واعترض على مشروع خزان سنار وجبل الأولياء بل وعلى سياسة الإكثار من المخزين بوجه عام وأنها ستؤدى حتما إلى تخفيض مستوى النيل تخفيضاً يتعذر معه في كثير من السنين ملء الحياض . وهذا قد يؤذى البلاد التي تروى بالحياض ، والظاهر أن هذا الاعتراض وجيه ولا تنكره السكثرة العظمى من المهندسين . ولعل مثل هذه الحال هي إحدى البواعث على تشييد قناطر نجع حمادى .

وقد تؤدى حالة انخفاض الماء في نيل مصر إلى تعذر الملاحاة في بعض الشهور . وهنالك اعتراضات أخرى ليس هذا موضع بحثها ، ولندكرها هنا ذكراً . فمثلا أن الاتفاق على تغذية القناة بمقادير محدودة أمر لا بد لتنفيذه من مراقبة وزارة الأشغال المصرية . ومثل هذه المراقبة قد تصبح متعذرة أو مستحيلة لأسباب سياسية ... وكذلك قد يعترض بأنه إذا توسعت حكومة السودان في رى أرض

(١) رأى عثمان باشا محرم في انتقاده لاتفاقية ٧ مايو سنة ١٩٢٩ أنه يجب أن يشترط أن يكون تصريف النيل الأزرق وحده ١٠٠ مليون من الأمتار المكعبة في اليوم قبل البدء في ملء الخزان ، بصرف النظر عن تصريف النيل الأبيض . راجع جريدة الأهرام (٣ يونيو سنة ١٩٢٩) .

الجزيرة^(١) بحيث استعدت الحال استخدام مقدار كبير من المياه فإنه من السهل جداً توسيع قناة الجزيرة وتعميقها بحيث يحول إليها شطر كبير من مياه النيل الأزرق . فإنه يراد بعد زمن طويل أو قصير أن يزداد المقدار المزروع بالجزيرة إلى ثلاثة ملايين من الأفدنة . فهذا ربما استدعى تحويل الشطر الأكبر من مياه النيل الأزرق إليها .

حقيقة إن المفروض أن هذا المشروع لا يتم إلا بعد أن تكون مصر قد قامت ببناء خزان جبل الأولياء والمشاريع الأخرى في أعلى النيل . ولكن إذا أبت مصر القيام بهذه المشاريع ، أليس في قدرة حكومة السودان أن تضي في استثمار أرض الجزيرة إلى الحد الأقصى من غير التفتات إلى حاجة مصر وأهل مصر ؟ هذه الأسئلة وأضرابها قد شغلت الكتاب والمهندسين ولا تزال تشغل بال الكثيرين . ولا شك أن العبث بمياه النيل بقصد إلحاق الأذى بمصر وسكانها ، أمر جرى في رءوس كثير من الإنجليز^(٢) . ووجود سد مثل سد سنار يضع في أيدي هؤلاء العابثين سلاحاً شديداً للخطر .

* * *

خزان سنار هو المشروع الثاني الخطير — بعد خزان أسوان — الذي أمكن بواسطته تخزين شطر عظيم من ماء النيل . وهناك مشروعات أخرى قد شغلت

(١) كان الاتفاق الأول بين مصر وإنكلترة على ألا يزيد مقدار أراضي الجزيرة المستثمرة على ٣٠٠ ألف فدان . ثم منعت إنكلترة هذا الاتفاق في إنذار سنة ١٩٢٤ ، والاتفاق الأخير بين الحكومتين لا يحدد المساحة التي يمكن استثمارها . بل يحدد مقدار المياه التي يسوغ لإصنافها إلى أراضي الجزيرة . والحكومة السودانية بعد ذلك الحرية في توسيع تلك المساحة كما تشاء في داخل تلك الحدود وهذا الترتيب قد سمح بتوسيع المساحة فوق المقدار الأول بكثير بحيث قاربت المليون فدان ، دون أن تستنفد أرض الجزيرة حصتها من الماء طبقاً لنصوص تلك الاتفاقية .

(٢) قال أحد كبار الضباط في البرلمان الإنجليزي : « لو أنني كنت المهدي لجعلت مصر تدفع ثمن كل لتر من الماء يجري في النيل » راجع هذا وأمثاله من الأقوال في مقال للمؤلف هذا الكتاب في عدد شهر يوليو سنة ١٩٤٧ من مجلة The Middle East Journal التي تصدر في واشنطن .

المهندسين ووزارة الأشغال المصرية والاقتصاديين . وأنفقت في سبيلها أموال كثيرة في أعمال المساحة والتصميم ، والارتياح والاستكشاف . ولكن لم ينفذ منها بعد سوى خزان جبل الأولياء ، الذى دار حوله الجدل زمناً طويلاً ، ثم نفذ بعد ذلك رغم معارضة كثير من المصريين وملىء للمرة الأولى عام ١٩٣٧ .

* * *

خزان جبل الأولياء .

يعلم القارىء مما ذكرناه من قبل أن مياه النيل الأزرق نظراً لشدة سرعتها وقوة اندفاعها تمنع مياه النيل الأبيض أو الجزء الأكبر منها فى زمن الفيضان من أن تنصرف إلى شمال الخرطوم . فتتجمع مياه النيل الأبيض جنوب الخرطوم إلى مسافة بعيدة وتكون بحيرة مستطيلة ماؤها يكاد يكون راكداً كمياه البحيرات . إذن فى زمن الفيضان يتكون شبه خزان طبيعى فى الجزء الأدنى من النيل الأبيض . فمعقول والحالة هذه أن يفكر المهندسون فى (ضبط) هذا الخزان الطبيعى وتحويله إلى خزان صناعى .

ومتى تكونت هذه الفكرة ، فالخطوة الثانية هى التفكير فى اختيار الموضع الملائم لبناء سد ذى فتحات يشبه سد أسوان ومكوار . وهذا الموضع يحسن أن يكون قريباً من الخرطوم بقدر الإمكان حتى يكون قريباً أيضاً من القطر المصرى الذى سينتفع بمياه هذا الخزان . وقد وجد أن أقرب موضع ملائم هو الموضع الذى عنده جبل الأولياء على الضفة اليمنى لنهر النيل . أى على بعد نحو ٤٥ كيلومتراً من الخرطوم .

يحسن هنا أن نعود فنذكر أن الموضع الذى يبنى فيه سد هائل يجب ، أو على الأقل يحسن جداً ، أن يكون قاع النهر عنده من صخر متين ، كى يكون هنالك أساس طبيعى قوى ذو صلابة بحيث يتحمل البناء الهائل الذى سيقام عليه . وكذلك

يجب أن يكون مجرى النهر واسعاً بشكل معتدل بحيث يمكن بناء سد ذى فتحات كافية لأن يمر منها تصريف النهر كله . ولكن يجب ألا يكون المجرى واسعاً جداً بحيث يفقد كثير من الماء المخزون بالتبخر . وكذلك يجب ألا يكون النهر عميقاً بحيث تصبح نفقات البناء باهظة جداً .

والنيل الأبيض عند جبل الأولياء ليس عميقاً ، بل هو فى الواقع ضحل جداً ، وقاعه صخري كما هى الحال عند مكوار وأسوان . ولكن قاع النهر عند أسوان ومكوار يتكون من أحجار الجرانيت ومن صخور بلورية أخرى متينة . وأما عند جبل الأولياء فإن قاع النهر من الخرسان النوبى . وشتان بين هذا الصخر من حيث المتانة وبين الجرانيت . وقد يخشى أنه لقلة صلابته قد ينفذ منه الماء بمقادير محسوسة . وكذلك نرى أن النهر فى هذا الموضع متسع المجرى جداً بحيث تكون نسبة التبخر من ماء الخزان من غير شك أعلى بكثير منها فى أسوان أو سنار .

وقد اقترح السر مردخ مكدونالد سنة ١٩٢٠ بناء سد من الصخر (الخرسان النوبى) طوله ٣٠ ر ٥ كيلومتراً ما بين جبل الأولياء وجبل مندرية مدعم عن الجانب الشرقى بحاجز من الطين والصخر طوله ١٦٥٠ متراً . فيكون طول السد كله ٦٦٨٠ متراً أى أطول من ثلاثة أمثال سد أسوان . وكان المقدر أن يخزن الماء فى هذا الخزان إلى مستوى ٣٧٨٥٠ متراً فوق سطح البحر . ولكن ارتفاع بناء السد نفسه يصل إلى مستوى ٣٨١٥٠ متراً فوق سطح البحر . أى أعلى من مستوى التخزين بثلاثة أمتار . والعادة أن يبنى السد بحيث لا يرتفع أكثر من متر أو مترين فوق مستوى التخزين . وكان يرى أيضاً الانخفاض بالخزان لحجز الفيضانات العالية وتقليل خطرها عن مصر . وفى هذه الحال كان يرى ملأه إلى مستوى ٣٨٠ متراً فوق سطح البحر . وهذه الزيادة القليلة بين مستوى التخزين العادى (٣٧٨٥٠) ومستوى التخزين لدرء خطر الفيضان (٣٨٠) .

ولو أنها لا تزيد على مائة وخمسين سنتيمتراً ، لكنها تؤدي إلى غمر مساحات هائلة من أراضي السودان ، نظراً لأن هذه الأراضي مستوية سهلة . فأقل ارتفاع في مستوى النهر كفيل بغمر مساحات عظيمة من الأراضي . وبهذا يزداد ما تدفعه مصر على سبيل التعويض .

وكان يراد بهذا الخزان — كما صممه السر مردخ مكدونالد — أن يخزن فيه نحو ثمانية مليارات من الأمطار المسكبة — يضيع نصفها بالتبخر . فيبقى لمصر بعد ذلك أربعة مليارات لتنتفع بها في أشهر الانخفاض من يناير إلى يونيو . وقد عدل عن هذا المشروع الكبير بعد البدء فيه ، نظراً لما وجه إليه من الانتقادات الشديدة . وتنحصر هذه الانتقادات في أن المشروع بشكله هذا كثير التكاليف ، ونسبة المنقود من الماء الخزون فيه عالية ، ولأن هذا السد إذا أسئ استعماله قد يؤدي مصر أذى شديداً .

وقد اقترح المستر ديبوى على الحكومة المصرية أن تعدل هذا المشروع تعديلاً يجعله أبسط مما اقترح أولاً ، وبهذا تبقى أكثر الاعتراضات التي وجهت إلى المشروع ، وكانت التعديلات الجوهرية التي رآها المستر ديبوى هي :
أولاً — ألا يزيد مستوى الخزان كثيراً عن أعلى مستوى للنهر الحالي ، بأن يكون مستوى الخزان ٣٧٧ر٢٠ متراً . فلا يغمر من الأراضي الواقعة على ضفتي النهر سوى ما يغمر منها في سنى الفيضان العالي .

ثانياً — أن يعدل عن فكرة استخدام هذا الخزان لدرء خطر الفيضانات العالية ، لأن هذا سيؤدي إلى رفع مستوى الخزان ، ورفع بناء السد نفسه .
ثالثاً — ألا يكون بناء السد كله من الحجر ، بل يكون بناء الشطر الغربي منه (إلى نحو ثلاثة كيلو مترات) بالطين . فهذا يقلل من تكاليف الخزان كثيراً .

وكان رأى المستر ديبوى أن هذه التعديلات من شأنها أن تدحض جزءاً

كبيراً من الاعتراضات التي وجهت إلى مشروع الخزان في صورته الأولى^(١) .
وقد قامت وزارة الأشغال بعد ذلك بعمل تصميم جديد لمشروع خزان جبل
الأولياء جعل فيه مستوى التخزين ٣٧٧ر٢٠ متراً فوق سطح البحر . ولكن
جعل مستوى سطح السد نفسه (أى مستوى الطريق الذى فوق السد) ٣٨٠
متراً أى أعلى من مستوى الخزان بمترين وثمانين سنتيمتراً .

وهذا الإسراف فى بناء السد يجعله أعلى من مستوى الخزان ظاهرة لم نرها
فى خزان أسوان ولا خزان سنار . ولكننا نراها فقط فى سد جبل الأولياء ، أى فى
المشروع الوحيد الذى انتقد بأنه قد يساء استخدامه للإضرار بمصر . فهل هنالك
علاقة بين ارتفاع السد عن مستوى الخزان وبين احتمال الإساءة إلى مصر ؟

لو أن السد يبنى بحيث لا يزيد إلا بمقدار ١٠٠ سنتيمتر عن مستوى
الخزان لكان هنالك تطابق بديهي بين السد وبين الخزان . أما ارتفاع السد
بنحو ثلاثة أمتار عن المستوى المقدر للخزان فقد يراد به الخير . وقد يراد به
الشر ... فيراد به الخير بأن ينظر إلى المستقبل البعيد وإلى احتمال إعادة النظر فى
مسألة مستوى الخزان . فإذا أريد فى المستقبل رفع مستوى الخزان وزيادة مقدار
الماء المدخر ، أمكن القيام بهذا الأمر من غير حاجة إلى تعلية السد من جديد
كما حدث فى سد أسوان .

أما أن يراد بالمشروع فى شكله الجديد أن يكون وسيلة لتهديد مصالح مصر
فقد جاء ذكر هذا موضعاً فى مذكرة لصاحب المعالي عثمان محرم (باشا) ومحمد زغلول
(باشا) . وخير ما نفعله أن نذكر بعض ما جاء فى تلك المذكرة نقداً للمشروع^(٢) :

(١) آراء المستر ديوى مبسطة فى تقريره (المطبوع سنة ١٩٢٥) فى ص ٢٣ و ٨٠
(نسخة انكليزية) .

(٢) تراجع المذكرة كاملة فى جريدة الأهرام بتاريخ ١٦ نوفمبر سنة ١٩٢٨ .

الأضرار المحتمل من خزان جبل الأولياء :

« الآن وقد ظهر أن بناء خزان جبل الأولياء حسب المشروع المراد تنفيذه يمكن من يتحكم فيه من حجز المياه به لغاية منسوب ٣٨٠ متراً . فلنبحث عن ضرر التخزين المنسوب المذكور إذا كان من يده الأمر يريد الإضرار بالقطر المصري .

« إذا راجعنا صفحة ٤٩ من كتاب ضبط النيل ... نجد أن متوسط سعة ما يمكن تخزينه بخزان جبل الأولياء لغاية مستوى ٣٨٠ هو تسعة مليارات من الأمتار المكعبة يضاف إليها ثلاثة مليارات على أقل تقدير ، تفقد بالتبخر والتسرب وقت الملء . فيكون ما يمكن أن يحجز في هذا الخزان لتصل المياه به للمنسوب ٣٨٠ متراً هو اثنا عشر ملياراً من الأمتار المكعبة .

« وبكتاب ضبط النيل (نسخة إنكليزية ص ٢٢٦ وما بعدها) نجد مبيناً بها تصرفات النيل الأبيض بالمالاكال من سنة ١٩٠٩ إلى سنة ١٩١٨ شهراً فشهراً فإذا أخذنا تصرفات سنة ١٩١٨ ... نجدها كما يأتي :

مليون متر مكعب	مجموعة تصرف النهر			
٤٩٧٠	»	»	»	شهر يناير
٤٦٢٠	»	»	»	» فبراير
٤١٤٠	»	»	»	» مارس
٢٨٨٠	»	»	»	» أبريل
٢٤٥٠	»	»	»	» مايو
٢٩١٠	»	»	»	» يونيو
٣٣٣٠	»	»	»	» يوليو

فمن يتسلط على خزان جبل الأولياء وتسول له نفسه أن يضر القطر المصري

يمكنه أن يتحكم في إيراد المياه الصيفية الآتية للقطر المصرى من النيل الأبيض ،
الذى عليه المعول مدة التحريق بإحدى الطريقتين الآتيتين : —

الأولى : إذا كان خزان جبل الأولياء قد تم ملؤه مدة الفيضان على أن
يبتدىء تفريغه من يناير لغاية مارس ، ففي هذه الحالة يمكن أن يعيد قفله وملأه
ثانياً ، بأن تحجز فيه كل المياه الآتية من النيل الأبيض لمدة أربعة شهور من إبريل
لغاية يوليو ، لأن مجموع تصرف النهر في الأشهر الأربعة المذكورة أحد عشر
ملياراً وكسور أى أقل من الاثنى عشر ملياراً التى يمكن تخزينها به .

الثانية : إذا تعمد من بيده أمر التحكم في هذا الخزان عدم ملئه مدة الفيضان
يمكنه حينئذ أن يقفل هذا الخزان قفلاً محكماً في أوائل فبراير ويستمر هذا القفل
حتى أواخر يوليو . وبذلك يتم له حرمان مصر من كل إيرادها الصيفى الآتى لها
النيل الأبيض .

» وهذا باعتبار تصرفات سنة ١٩١٨ ، أما إذا أخذنا بالسنين الأخرى التى
إيرادها أقل من سنة ١٩١٨ فإن مدة القفل والحرمان تزيد قليلاً وكثيراً عما تقدم
بنسبة تصرفات النهر الطبيعية « انتهى .

ويرى القارىء أن هذا النقد مبنى بنوع خاص على أن المشروع الحالى
يجعل من الممكن زيادة التخزين إلى مستوى ٣٨٠ متراً وعلى الاعتبارات
السياسية . فلو أمكن تلافي هذين الأمرين لزال الشطر الأعظم من الاعتراضات
الموجهة إلى هذا المشروع ^(١) .

(١) لا شك أن هنالك أساساً للتهمة بأن أحد الأغراض الباعثة على بناء خزانات في
السودان هو التحكم في مصر فقد جاء في كتاب السر قلنتين تشيرول عن مصر العبارة الآتية :

“Schemes for storing the waters of the Blue and White Nile in the
Sudan were prepared under Lord Kitchener's personal direction and he
took the keenest interest in them, not only because they opened up prospects
of an almost unlimited supply of water to Egypt as well as the Sudan, but
because he saw what big political issues were bound up with the permanent
control, from the Sudan, of the Nile waters, upon which the very existence of
Egypt depends”. The Egyptian Problem, p. 101.

هذا مثال للاعتراضات التي ظلت توجه إلى هذا المشروع . ولا بد من لفت النظر إلى أن السياسة البريطانية كانت في الوقت نفسه تضغط ضغطاً شديداً على حكومة مصر لكي تمضي في تنفيذ خزان جبل الأولياء ؛ وكانت تدفع الحكومات الموالية لها نحو التنفيذ دفعاً شديداً ، حتى أوشك هذا المشروع الهندسي أن يصبح مشكلة سياسية بين مصر وبريطانيا حتى قيل إن بعض البريطانيين أُنذِر بأن الخزان قد تبنيه هيئة أخرى إذا لم تقم مصر ببنائه . ولا شك أن هذا — إن صح — لا يعدو أن يكون من قبيل التهديد السخيف ، لأن أراضي الجزيرة نظراً لارتفاعها من جهة ، وانخفاض مستوى النيل الأبيض عنها من جهة أخرى : لا يمكن أن تنفع بمياه هذا الخزان . ولا شك أن تدخل السياسة في هذا المشروع قد أثار حوله لفظاً لم يهدأ إلا بعد أن نفذ المشروع فعلاً ، وأخذت ثمرته تظهر . ومن الممكن أن يتصور المصلحة البريطانية في إنشاء هذا الخزان . فإذا ضربنا صفحاً عن الاعتبارات السياسية وأن هذا المشروع يضع في أيدي الإنجليز سلاحاً آخر للعبث بمياه النيل ، تبين لنا أن هنالك أربع فوائد تجتمعها هيئات بريطانية مختلفة . الأولى : أن هذا المشروع الضخم سيوكل أمر تنفيذه إلى شركة بريطانية ، وفي ذلك كسب ظاهر في وقت كانت تسود العالم فيه أزمة اقتصادية شديدة . ثانياً : أن الحكومة المصرية ستدفع تعويضاً مالياً ، يساعد حكومة السودان ، خلاف ما كانت تدفعه مصر سنوياً بطريقة منتظمة . ثالثاً : أن بناء خزان النيل الأبيض يمكن من زيادة المياه التي تستولى عليها شركة الجزيرة لرى مساحة أوسع من أراضي الجزيرة ، وذلك دون أن تخسر شيئاً أو تنفق مبلغاً من المال . رابعاً : أن الخزان قد يغمر مساحة محدودة من الأرض مدة من الزمن في كل سنة ، وهذا مما يساعد في تحريض السودانيين على المهاجرة إلى أرض الجزيرة ، حيث الحاجة شديدة إلى الأيدي العاملة .

وعلى أثر تعلية خزان أسوان للمرة الثانية خشي أن تسكن مصر مؤقتاً بهذا الوفرة الجديد من المياه ، فاشتد الضغط على الحكومة المصرية وقررت فعلاً في عام ١٩٣٣ تنفيذ مشروع خزان جبل الأولياء . ولم تلبث أن سلمت مليوناً من الجنيهات لحكومة السودان على سبيل التعويض قبل أن يبدأ تنفيذ المشروع . ورسا العطاء فعلاً على شركة انجليزية ، فبادرت بينائه طبقاً للمواصفات المعدلة ، وتم بناء السد ، بحيث أمكن ملؤه للمرة الأولى في عام ١٩٣٧ .

في تلك السنة ملئ الخزان إلى مستوى ٣٧٥ر٨٠ متراً فوق سطح البحر ، وفي كل سنة بعد ذلك كان يملأ إلى مستوى أعلا من العام السابق بمقدار خمسين سنتيمتراً ، حتى ملئ إلى المستوى المطلوب وهو ٣٧٧ر٢٠ في عام ١٩٤٢ . ونظراً لقلة ما يحمل النيل الأبيض من الرواسب يمكن الشروع في ملئ الخزان في شهر يولييه ويكمل ملؤه في أكتوبر ، ونظراً لاتساع مجرى النهر لا يزيد مستوى التخزين على مستوى النهر شمال السد إلا بمقدار ستة أمتار ونصف متر . وبسبب فقدان مقدار كبير من الماء بالتبخر ، يبدأ تفريغ الخزان في وقت مبكر (في شهر فبراير) ، ولا يبقى شهر مايو حتى يكون الماء المخزون قد صرف كله ، أى أن مصر تبدأ باستخدام الماء المخزون في النيل الأبيض قبل أن تبدأ في استخدام المياه المخزونة في خزان أسوان . ومقدار الماء الذي يحتويه الخزان وقت امتلائه إلى مستوى ٣٧٧ر٢٠ متراً فوق سطح البحر يبلغ نحو ٣٢٠ مليون من الأمتار المكعبة ، يصل منها إلى مصر مقدار يتراوح بين مليارين ومليارين ونصف مليار من الأمتار المكعبة .

وفي الجدول الآتي مقارنة مفيدة بين الخزانات الثلاثة :

ارتفاع مستوى الخزان عن مستوى النهر (بالمتر)	الطول (بالكيلو متر)	سعة الخزان بملايين الأمتار المكعبة	
٣٥	٣٦٠	٥٣٠٠	أسوان
٦,٥	٥٣٠	٣٢٠٠	جبل الأولياء
١٦	١٦٠	٨٠٠	سنار

والذى يلفت النظر فى هذه المقارنة هو طول خزان جبل الأولياء الذى يمتد إلى مسافة ٥٣٠ كيلومتراً مع أن ارتفاع مستوى التخزين لا يزيد كثيراً على سبعة أمتار ، وسبب ذلك ضعف انحدار النيل الأبيض ، تلك الظاهرة التى سبق شرحها ، والتى تجعل أقل ارتفاع فى مستوى الخزان ، يرفع مستوى النهر إلى مسافات بعيدة . واتساع مجرى النيل الأبيض جعل من الممكن أن يخزن فيه من الماء نحو ثلاثة مليارات ونصف مليار ، مع أن الفرق بين مستوى التخزين جنوب السد ومستوى النهر شمال السد لا يزيد على بضعة أمتار . ولكن هذه الحالة هى التى جعلت مقدار ما يفقد من الماء بالتبخر عظيماً جداً ، لأن سطح الماء أعظم من أى خزان آخر .

* * *

هذه السدود الثلاثة هى أعظم مشروعات أقيمت على نهر النيل ، وأثرت فى نظام جريانه الطبيعى تأثيراً كبيراً . وهذه الخزانات الثلاثة تخرج من ماء النيل مقداراً عظيماً من الماء ، بحيث يتعذر ملؤها كلها إلى غايتها القصوى فى السنين التى ينقص فيها الفيضان عن المعدل نقصاً محسوساً . وقد رأى الأستاذ سميكة (بك) أننا إذا رجعنا إلى أرقام الفيضان فى الثمانين عاماً الأخيرة تبين لنا أن ملء هذه الخزانات ملأً كاملاً يستحيل القيام به فى نحو تسعة أعوام منها^(١) .

وهكذا يكون التفكير فى إقامة سد جديد بقصد ادخار الماء على النيل الأبيض أو الأزرق أو النيل الرئيسى أمراً قليل الجدوى ، ما لم ييسر تدبير مقدار أعظم من الماء فى أعلى النيل ، ولذلك نرى أن المشروعات الهامة التى هى موضع التفكير تحاول كلها معالجة هذه الناحية ؛ وأهم هذه المشروعات إنشاء خزان ببخيرة طانا ، وآخر فى بحيرة ألبرت ، وحفر قناة فى منطقة السدود .

(١) راجع كتابه Filling Aswan Reservoir نشرته مصلحة الطبيعيات سنة ١٩٤٢ .

وقد اتخذ التفكير في تدبير مياه النيل اتجاهاً جديداً في المدة الأخيرة ؛ وذلك أن ادخار الماء فيما مضى كان يرمى إلى اختزان الماء في زمن الفيضان لكي يصرف كله في وقت الانخفاض . أى أن العملية كلها لا ينظر فيها إلا إلى حالة النهر في عام واحد . والاتجاه الجديد يرمى إلى تناول عدد كبير من السنين ، وإلى تخزين « احتياطي » من الماء لمواجهة السنين الشحيحة . وهذا التخزين الاحتياطي يسميه بعض رجال الرى التخزين القرنى Century Storage ، أى الذى يدخل في حسابه حالة النهر في مدى أعوام عديدة .

ومثل هذا التخزين يجوز ان يقترن بالتخزين الموسمى على الطريقة المتبعة الآن ، ولكن لا بد لذلك من خزان ضخم مثل خزان بحيرة ألبرت ، ومن الجائز أن يوزع التخزين القرنى على عدة مشروعات مثل خزان ألبرت وخزان طانا والخزان المراد إنشاؤه في الشلال الرابع شمال مروى وإن كان الغرض الأول من إنشائه هو درء أخطار الفيضان العالى .

وفما يلي بيان موجز لمشروعات هذا البرنامج الذى يرمى إلى تحقيق أغراض ثلاثة وهى زيادة المياه ، وتكوين احتياطي مائى للسنين الشحيحة ودرء خطر الفيضانات العالية مثل فيضان ١٩٣٨ و ١٩٤٦ .

وللتوسع في دراسة هذا البرنامج لا بد للقارىء أن يرجع إلى الجزء السابع من كتاب حوض النيل للأساتذة هرست و بلاك وسميكة ، وفيه وصف تفصيلي لجميع المشروعات الجديدة .

* * *

بحيرة طانا :

لقد سبق لنا وصف بحيرة طانا فليرجع إليه ... والتفكير في تحويلها من خزان طبيعى إلى خزان صناعى يرجع إلى نحو ٤٥ سنة مضت على الأقل . وقد أرسل ما لا يقل عن ثلاث بعثات مختلفة لارتياح البحيرة وسواحلها وقياس تصريف

البحيرة والأنهار التي تصب فيها . وأهم هذه البعثات هي البعثة التي أرسلت سنة ١٩٢٠ و ١٩٢١ والتي لا يزال تقريرها من أهم المراجع عن هذا الجزء من هضبة الحبشة .

وقد قررت هذه البعثات جميعاً أنه من الممكن تخزين المياه في البحيرة . بأن يدخر فيها ما لا يقل عن ٣٥٠٠ مليون من الأمطار المسكبة (أى أكثر مما يسعه خزان أسوان قبل التعلية الثانية) . بل ومن الممكن أن يكون جملة المدخر في هذه البحيرة نحو ١١٥٠٠ مليون . والمقدار الزائد وهو ٨٠٠٠ مليون يكون بمثابة احتياطي للسنين التي لا تمتلئ فيها البحيرة إلى المستوى المطلوب لقلة الأمطار ، ولتحسين الفيضان إذا كان منخفضاً .

وتنفيذاً لهذا المشروع اقترحت بعثة بحيرة طانا الأخيرة بأن يسد مخرجان من مخرج نهر الآبى (والقارىء يذكر أن المخرج تعترضه جزيرتان تقسمه إلى ثلاثة مخارج) وأما المخرج الثالث وهو الأوسط فتبنى فيه قناطر ذات فتحات تصريفها نحو ٥٠٠ متر مكعب في الثانية .

وكذلك اقترحت البعثة تعميق مجرى النهر بعد خروجه من بحيرة طانا إلى بضعة كيلو مترات . لتسهيل التصريف . ثم حفر نفق بين الكيلو الثامن والحادى عشر لتقصير المسافة .

وكذلك توسيع المخرج نفسه وتعميقه بحيث يمكن الارتفاع بأكثر الماء المخزون في البحيرة .

وقد كان المستر ديبوى في سنة ١٩٠٣ يرى أن الارتفاع بخزان طانا يحسن أن يقصر على السودان . ولكن هذا رأى لم يقل به أحد بعد ذلك . خصوصاً أن نفقات المشروع (وتقدر بنحو مليونين ونصف من الجنيهات) قد يحسن أن تشترك فيها الحكومتان المصرية والسودانية . ولقد تزيد النفقات مليوناً أو مليونين إذا أريد تمهيد طريق أو سكة حديدية من السودان إلى بحيرة طانا .

والاعتراض الذى قد يقال بأن تحويل بحيرة طانا إلى خزان قد يؤذى مصر بإنقاص ما يصل إليها من مياه النيل الأزرق اعتراض لا قيمة له . فقد رأينا من قبل أن تصريف البحيرة ضئيل جداً بحيث لا يمكن أن يؤثر تأثيراً محسوساً فى ما يصل إلى مصر من مياه النيل الأزرق . والاعتراض بأن تخزين المياه فى البحيرة ثم تفريغها فى وقت الفيضان قد يؤذى مصر بأن يجعل الفيضان خطراً ، هذا أيضاً اعتراض غير وجهيه . فإن مستوى البحيرة وتصريفها لن يختلف كثيراً عما هما عليه الآن بعد تحويلها إلى خزان صناعى .

والاعتراض الأكبر الذى حال دون تنفيذ هذا المشروع ، والذى قد يحول دون تنفيذه إلى زمن طويل ، هو اعتراض حكومة الحبشة التى سيعمل المشروع فى بلادها . والتى لديها من الاعتبارات السياسية ما جعلها تشك فى أن من صالحها الموافقة على هذا المشروع حتى ولو بذل لها شيء من المال على سبيل التعويض .

مشروعات أعالي النيل :

فى أشهر الربيع وأول الصيف تكون أنهار الحبشة قليلة الماء . ويكون أكثر ما يصل إلى مصر من الماء فى ذلك الوقت مصدره بحر الجبل والزراف . والمشروعات الخاصة بتدبير مياه هذا الإقليم لم تزل إلى اليوم رهن البحث . وليس بممكن بعد القطع بشيء فى أمرها ، أو التنبؤ بما ستكون عليه عند البدء فى تنفيذها .

ولكن الذى نعلمه أن هنالك مشاريع فى إقليم بحر الجبل ومنطقة البحيرات وقد أتى على ذكرها كثير من كبار المهندسين مثل السر ويليم غارستن والسر وليام ويلكسكس والسر مردخ مكدونالد والمسترتونتهام والمسترنيوهوس . كما أن هرست وبلاك وسميكة أصدروا حديثاً (١٩٤٦) الجزء السابع من كتاب حوض النيل يتضمن بحثاً وافياً لهذه المشروعات . وأهم ما فكر فيه من هذه

المشاريع تحويل بحيرة فسكتوريا إلى خزان ، وتحويل بحيرة ألبرت إلى خزان ، والقيام بعمل يؤدي إلى توصيل مياه بحر الجبل إلى النيل الأبيض دون أن يفقد منها الشطر الأكبر في إقليم السودان .

فأما المشروع الأول فقد عدل كثيراً عما كان عليه في صورته الأولى فأصبح مجرد « ملحق » بمشروع بحيرة ألبرت ؛ وليس من المنتظر أن يتخذ في شأنه أى إجراء قريب . وأما خزان ألبرت ، وإقليم السودان ، فهما الآن موضع بحث وتحري دقيقين .


فأما تحويل بحيرة ألبرت من خزان طبيعي إلى خزان صناعي فمشروع قد قال به السر وليم غارستن منذ خمس وأربعين سنة . والبحيرة بطبيعتها وبسواحلها العالية قابلة لأن تحول إلى خزان دون زيادة كبيرة في مساحة سطحها . وبهذا لا يزيد المتبخر من مائها كثيراً عما هو الآن . ونحن نعلم أن مساحة البحيرة نحو ٥٤٤٠ كيلو متراً مربعاً فيرفع مستواها متراً واحداً يمكن اختزان ما لا يقل عن خمسة مليارات من الأمتار المكعبة من الماء . ولكن المشاريع التي فكر فيها ترمى إلى اختزان أضعاف هذا المقدار .

وبالطبع سيسمّدعى هذا المشروع بناء سد ذى فتحات لتصرف مياه البحيرة عند الحاجة بحيث تصل إلى مصر في زمن الانخفاض . وقد رأى السر غارستن أن هناك موضعاً على نيل ألبرت على مسافة خمسة عشر كيلو متراً من البحيرة صالحاً لبناء مثل هذا السد . ورأى آخرون أنه قد يحسن بناء هذا السد عند نمولى . وهذا هو رأى الراجح الآن ، وذلك لزيادة الاوهار طبقاً لمشروع « التخزين القرنى ^(١) » .

وقد اعترض على مشروع خزان ألبرت ، بأن مياه هذه البحيرة فيها شئ من

(١) يرى هرست وبلاك وسميكة أن يتسع خزان ألبرت لنحو مائة مليار تراز فيما بعد إلى

١٤٠ ملياراً . وهذا يرفع مستوى البحيرة بنحو ٢٢ متراً فوق متوسط ارتفاع سطحها الحالي .



(شكل ٤٠)

الملوحة وأن بعض الأملاح التي
بها من النوع الضار بالزراعة
وبالتربة . وقد زعم المستر هرست
أن هذه الملوحة ستزول أو تقل
إلى درجة تصبح فيها عديمة
الأهمية ، حين يملأ الخزان وفي
أثناء جريان المياه إلى بحر الجبل
والنيل الأبيض .

أما مشروع منطقة السدود
فقد كان رأى السر ويليام
غارستن فيه أن يحفر مجرى
جديد ليجرى فيه بحر الجبل
ما بين بلدة بور إلى قبيل التقاء
السوبات ببحر الجبل . وقد
أطلق على هذا الجرى اسم قناة بور
وقد عاد السر مردخ ماكدونالد
في كتابه ضبط النيل فمضد هذا
المشروع وقدر أن نفقاته تبلغ
خمسة عشر مليوناً من الجنيهات .
وأكثر المهندسين يرى أنه
يكلف أكثر من هذا كثيراً .

ورأى ديبوى أن هذا المشروع يكاد أن يكون عديم الفائدة وبخاصة إذا

نظرنا إلى نفقاته الباهظة^(١) ، وأن المقول أن يعتنى بإصلاح المجارى الطبيعية :
مجرى الجبل والزراف وإصلاحها وتعميقها بحيث يمكن تدريجياً أن تسيل فيها
مياه أعلى النيل دون أن تفقد في المستنقعات .

ورأى المستر توتنهام مثل هذا الرأي تقريباً^(٢) .
وقد ذكر المستر نيوهوس في كتيب^(٣) له أن هنالك تسعة مشروعات مختلفة
لتوصيل مياه هضبة البحيرات إلى النيل الأبيض من غير فقد مياه كثيرة في
المستنقعات ، وهذه المشاريع التسعة هي :

- (١) عمل مجرى جديد مستقيم يوصل من رجف إلى التقاء السوبات بالنيل الأبيض .
- (٢) » » » » » بور » » » » »
- (٣) عمل مجرى جديد من بور إلى الكيلو ١٧٥ على بحر الزراف ، ثم إصلاح
النهر ما بين نهاية الزراف إلى السوبات . (يلاحظ أن الكيلو ١٧٥ هو الموضع
الذى فى جنوبه يكون الزراف نهراً كثيراً المستنقعات ، وفى شماله يكون نهراً ذا
مجرى محدود خال من المستنقعات) .

(٤) عمل مجرى جديد من بور إلى التقاء السوبات بالنيل الأبيض . ولكن
بدلاً من أن يكون مجرى مستقيماً كما هو الحال فى المشروع (٢) يكون المجرى ماثلاً
أولاً إلى الشمال الغربى فيقترب من بحر الزراف عند الكيلو ١٧٥ ثم إلى الشمال
الشرقى إلى مصب السوبات . وعند الكيلو ١٧٥ يوصل ما بين المجرى الجديد
والزراف بقناة .

(٥) إصلاح مجرى بحر الجبل (بالخفر والتعميق وبناء الجسور الخ) من بور إلى نو
ثم إلى النيل الأبيض .

(١) راجع تقريره المشار إليه ص ٨٥ .

(٢) راجع تقرير بعثة أعلى النيل (المطبوع بالقاهرة سنة ١٩٢٦) ص ٩ .

(٣) The Problem of the Upper Nile ص ٥٧ وما بعدها القاهرة سنة ١٩٢٩ .

(٦) إصلاح مجرى بحر الجبل من بور إلى قطعى الزراف ثم إصلاح الزراف بعد ذلك .

(٧) إصلاح بحر الجبل من نو إلى السوبات . والزراف إلى نهايته ، فيستخدم الجريان معاً .

(٨) عمل مجرى جديد يبتدىء من بحر الجبل ما بين منجلا و بور إلى نهر فيشينو Viveno ثم إلى نهر بيبور (مع تعميقهما وتوسيعهما) ثم إلى السوبات وإلى النيل الأبيض .

(٩) عمل المجرى الجديد إلى السوبات كما هو مذكور في مشروع (٨) وفي الوقت نفسه يصلح مجرى بحرى الجبل والزراف — بحيث ينتفع بهما أيضا . وقد أضاف المرحوم المستر بتشر مشروعا عاشراً ، وهو المسمى مشروع قناة جونجلاي^(١) . وسنشير إليه فيما يلى .

على أن كل هذه المشاريع يراد بها غرض واحد وهو إمكان توصيل مياه هضبة البحيرات إلى النيل الأبيض من غير فقدان شيء كثير منها ... وهذه المشاريع مرتبطة تمام الارتباط بمشروع خزان بحيرة البرت . فلا بد قبل حفر قناة حول منطقة السدود ، أن ندبر المياه التى ستجرى فى هذه القناة : ونحن نعلم أن تصريف بحر الجبل عند منجلا يختلف المقدار جداً من سنة إلى سنة . وإذا أردنا أن نضمن تصريفاً منتظماً للنهر عند منجلا وجب أولاً جعل بحيرة البرت خزاناً تتوفر فيه المياه من أجل السفين التى يقل فيها تصريف النهر . وقد أوضح المستر نيوهوس فى كتابه المذكور قبلاً أن تصريف البحيرة يجب أن يصل إلى نحو ٢٥٠٠ — ٢٨٠٠ متر مكعب فى الثانية حتى يكون وافياً بحاجة مصر : ولا بد من بناء المجرى الجديد أو إصلاح المجارى الحالية بحيث يمكن توصيل نحو ٢٠٠٠ متر مكعب من منجلا إلى ملا كال .

(١) راجع كتابه A.D. Butcher : The Jonglei Canal Diversion Scheme

نشرته وزارة الأشغال المصرية سنة ١٩٣٨ .

وكل ما عمل إلى الآن من الإصلاح في إقليم المستنقعات هو تطهير النهر من السدود . وهذا قد زاد في تصريف النهر قليلا . ثم عمل قطعين في أعالي بحر الزراف طول كل منهما نحو خمسة كيلو مترات ليوصلا بين بحر الجبل وبحر الزراف . وقد عمل القطع الأول سنة ١٩١٠ والثاني سنة ١٩١٣ . وقد تضاربت الآراء فيما إذا كان هذان القطعان قد زادا في تصريف النهرين معاً أم لا . وهناك أسطول صغير مجهز بكراكات قوية يقوم في الوقت الحاضر بتجارب صغيرة في الجرى الأدنى لبحر الجبل وبحر الزراف ، كإصلاح شاطئ أو تعميق جزء من الجرى . على أن العمل الكبير لم يتقرر ولم يبدأ فيه بعد ، على الرغم من الأموال الكثيرة التي أنفقت في المساحة والتطهير .

ولا شك أننا قد أصبحنا قريبين من اتخاذ قرار نهائى في هذا الأمر . والمشروع الذى يميل إليه رجال الري في الوقت الحاضر هو مشروع بتشر الخاص بقناة جونجلاى معدلا تعديلا يزيد في مائة عن المقدار الذى قرره بتشر . وينص المشروع على حفر قناة تبدأ من نهر آتم مارة ببلدة جونجلاى Jonglei . ولذلك أطلق على هذا المشروع اسم مشروع جونجلاى . والمفروض أن يكون عمق هذه القناة نحو خمسة أمتار . واتساع قاعها ١٢٠ مترا ، وتحمل نحو ٥٥ مليوناً من الأمتار المكعبة في اليوم ، بينما يحمل بحر الجبل نحو أربعين مليوناً ، على أن ينظم تصريف القناة بما يتفق وحاجة الزراعة في شمال الوادى .

وهناك مشروع آخر يرى هرست وزميلاه أن يقدم على سواه ، وهو بناء سد جديد عند الشلال الرابع ، والغرض الأكبر منه المساعدة في درء خطر الفيضان ، ومن الجائز الانتفاع به أيضاً في تخزين مقدار من الماء ، ويرى حضراتهم أن تكون سعة هذا الخزان كافية لحجز ثمانية مليارات من الأمتار المكعبة .

ملحق بالفصل الأخير

اتفاق ٧ مايو سنة ١٩٢٩

رئاسة مجلس الوزراء

يا صاحب الفخامة السيد _____ نازد

١ — تأييداً لمحادثتنا الأخيرة أتشرف بأن أبلغ فخامتكم آراء الحكومة المصرية فيما يختص بمسائل الري التي كانت موضع مباحثتنا .
إن الحكومة المصرية توافق على أن البت في هذه المسائل لا يمكن تأجيله حتى يتيسر للحكومتين عقد اتفاق بشأن مركز السودان ؛ غير أنها ، مع إقرار التسويات الحاضرة ، تحتفظ بحريتها التامة فيما يتعلق بالمفاوضات التي تسبق عقد مثل ذلك الاتفاق .

٢ — من البين أن تعمير السودان يحتاج إلى مقدار من مياه النيل أعظم من المقدار الذي يستعمله السودان الآن .

ولقد كانت الحكومة المصرية دائماً — كما تعلم فخامتكم — شديدة الاهتمام بعمران السودان وستواصل هذه الخطة ، وهي لذلك مستعدة للاتفاق مع الحكومة البريطانية على زيادة ذلك المقدار بحيث لا تضر تلك الزيادة بحقوق مصر الطبيعية والتاريخية في مياه النيل ، ولا بما تحتاج إليه مصر في توسعها الزراعي ، وبشرط الاستيثاق بكيفية مرضية من المحافظة على المصالح المصرية على الوجه المفصل بعد في هذه المذكرة .

٣ — وبناء على ما تقدم تقبل الحكومة المصرية النتائج التي انتهت إليها لجنة مياه النيل في سنة ١٩٢٥ المرفق تقريرها بهذه المذكرة . والذي يعتبر جزءاً

لا ينفصل من هذا الاتفاق . على أنه نظراً للتأخير في بناء خزان جبل الأولياء ، الذى يعتبر ، بناء على الفقرة الأربعين من تقرير لجنة مياه النيل ، مقابلاً لمشروعات رى الجزيرة ترى الحكومة المصرية أن تعدل تواريخ ومقادير المياه التى تؤخذ تدريجياً من النيل للسودان فى أشهر الفيضان كما هو مبين بالبند ٥٧ من تقرير اللجنة بحيث لا يتعدى ما يأخذه السودان ١٢٦ متراً مكعباً فى الثانية قبل سنة ١٩٣٦ وأن يكون من المفهوم أن الجدول المذكور فى المادة السابق ذكرها يبقى بغير تغيير حتى يبلغ المأخوذ ١٢٦ متراً مكعباً فى الثانية . وهذه المقادير مبنية على تقرير لجنة مياه النيل فى إذن قابلة للتعديل كما نص على ذلك فى التقرير .

٤ — ومن المفهوم أيضاً أن الترتيبات الآتية ستراعى فيما يخص بأعمال الرى على النيل .

(١) أن المفتش العام لمصلحة الرى المصرية فى السودان أو معاونيه أو أى موظف آخر يعينه وزير الأشغال تكون لهم الحرية الكاملة فى التعاون مع المهندس المقيم بخزان سنار لقياس التصرفات والارصادكى تتحقق الحكومة المصرية من أن توزيع المياه وموازنات الخزان جارية طبقاً لما تم الاتفاق عليه . وتسرى الإجراءات التفصيلية الخاصة بالتنفيذ والمتفق عليها بين وزير الأشغال ومستشارى رى حكومة السودان من تاريخ الموافقة على هذه المذكرة .

(٢) ألا تقام بغير اتفاق سابق مع الحكومة المصرية أعمال رى أو توليد قوى ، ولا تتخذ إجراءات على النيل وفروعه أو على البحيرات التى ينبع منها ، سواء فى السودان أو فى البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية ، يكون من شأنها إنقاص مقدار الماء الذى يصل إلى مصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه على وجه يلحق أى ضرر بمصالح مصر .

(٣) تلقى الحكومة المصرية كل التسهيلات اللازمة للقيام بدراسة ورصد الأبحاث المائية (هيدرولوجيا) لنهر النيل فى السودان دراسة ورصداً وافية .

(٤) إذا قررت الحكومة المصرية إقامة أعمال في السودان على النيل أو فروعها أو اتخاذ أى إجراء لزيادة مياه النيل لمصلحة مصر تتفق مقدما مع السلطات المحلية على ما يجب اتخاذه من الإجراءات للمحافظة على المصالح المحلية . ويكون إنشاء هذه الأعمال وصيانتها وإدارتها من شأن الحكومة المصرية وتحت رقابتها رأساً .

(٥) تستعمل حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى وشمال إيرلندة وساطتها لدى حكومات المناطق التى تحت نفوذها لى تسهيل للحكومة المصرية عمل المساحات والمقاييس والدراسات والأعمال من قبيل ما هو مبين فى الفقرتين السابقتين .

(٦) لا يتخلو الحال من أنه فى سياق تنفيذ الأمور المبينة بهذا الاتفاق قد يقوم من وقت لآخر شك فى تفسير مبدأ من المبادئ أو بصدد بعض التفاصيل الفنية أو الإدارية فستعالج كل مسألة من هذه المسائل بروح من حسن النية المتبادل . فإذا نشأ خلاف فى رأى فيما يخص تفسير أى حكم من الأحكام السابقة أو تنفيذها أو مخالفته ولم يتيسر للحكومتين حله فيما بينهما رفع الأمر لهيئة تحكيم مستقلة .

٥ - لا يعتبر هذا الاتفاق بأى حال ماساً بمراقبة وضبط النهر فإن ذلك يحفظ به لمناقشات حرة بين الحكومتين عند المفاوضة فى مسألة السودان .

وإنى أنتهز هذه الفرصة لأجدد لفخامتكم فائق احترامى ؟

رئيس مجلس الوزراء

القاهرة فى ٧ مايو سنة ١٩٢٩

(محمد محمود)

مكتبة العرب

مديرها : صلاح الدين البستاني

٢٨ ش كامل صدقي (القجالة) القاهرة

دار المندوب السامي :

يا صاحب الدولة :

١ — أتشرف بأن أخبر دولتكم بأنى تسلمت المذكرة التى تكرمتم دولتكم بإرسالها إلى اليوم .

٢ — ومع تأييدى للقواعد التى تم الاتفاق عليها كما هى واردة فى مذكرة دولتكم فإنى أعبر لدولتكم عن سرور حكومة جلالة الملك من أن المباحثات أدت إلى حل لا بد أنه سيزيد فى تقدم مصر والسودان ورعايتهما .

٣ — وأن حكومة جلالة الملك بالمملكة المتحدة لتشاطر ~~الرأى~~ ^{الرأى} فى أن سرى هذا الاتفاق وجوهه هو تنظيم الرأى على أساس تقرير لجنة مياه النيل وأنه لا تأثير له على الحالة الراهنة فى السودان Status quo

٤ — وفى الختام أذكر دولتكم أن حكومة جلالة الملك سبق لها الاعتراف بحق مصر الطبيعى والتاريخى فى مياه النيل ، وأقرر أن حكومة جلالة الملك تعتبر المحافظة على هذه الحقوق مبدأً أساسياً من مبادئ السياسة البريطانية ، كما تؤكد لدولتكم بطريقة قاطعة أن هذا المبدأ وتفصيلات هذا الاتفاق ستنفذ فى كل وقت أيا كانت الظروف التى قد تطرأ فيما بعد .

وإنى أنتهز هذه الفرصة لأجدد لدولتكم فائق احترامى ؟

(لويد) Lloyd.

القاهرة فى مايو ٧ سنة ١٩٢٩

المندوب السامى

on't,

في هذا اليوم
أستبذل الحياة
في هذا اليوم
أستبذل الحياة

أستبذل الحياة
في هذا اليوم
أستبذل الحياة
في هذا اليوم

أستبذل الحياة
في هذا اليوم
أستبذل الحياة
في هذا اليوم

أستبذل الحياة
في هذا اليوم
أستبذل الحياة
في هذا اليوم

أستبذل الحياة
في هذا اليوم
أستبذل الحياة
في هذا اليوم

أستبذل الحياة
في هذا اليوم
أستبذل الحياة
في هذا اليوم


محمد، محمد عوض

نهر النيل

AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT LIBRARIES



01048378



AMERICAN
UNIVERSITY OF BEIRUT

