

BASIM

TARBIYAT DUDAT AL-QAZZ  
WA ASHJAR AL-TUT

2267  
· 1605  
· 389

2267.1605.389

Basim

Tarbiyat dūdat al-qazz wa  
ashjār al-tūt

RATE

**ISSUED TO**

DATE ISSUED

DATE DUE


DATE ISSUED

DATE DUE

Princeton University Library



32101 073545673



# تَرْبِيَةُ دُودَةِ الْقَزْ وَشَجَارِ التَّوْتِ

تأليف  
محمد على بسم

الخائز لشهادة الزراعة من مدرسة دمنهور الزراعية . وشهادتي علم المساحة  
من مدرسة فينا الزراعية العليا . والخائز لدبلوم اختصاصي في تربية  
دودة القز من مدرسة تربية دودة القز العليا بفرنسا  
والموظف الآن بوزارة الزراعة بفرع الحرير .

الطبعة الأولى

سنة ١٩٣٠


حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

١٢٥ - ٤ - ٣٠

المطبعة العسكرية

شارع الخياج الناصري رقم ٦ بالفجالة بمصر







Basim, Muhammad Ali

Tarbiyat dūdat al-qazz

# تَرْبِيَةُ دُودَةِ الْقَزْزَفِ وَشَجَارِ التَّوْتِ

تأليف  
محمد علي بسيم

الخائز لشهادة الزراعة من مدرسة دمنهور الزراعية . وشهادتي علم المساحة  
من مدرسة فنا الزراعية العليا . والخائز لدبلوم اختصاصي في تربية  
دودة القرن من مدرسة تربية دودة القرن العليا بفرنسا  
والموظف الآن بوظيفة الزراعة بفرع الحرير .

» الطبعة الأولى «

سنة ١٩٣٠

» حقوق الطبع محفوظة للمؤلف «

٣٠ - ٤ - ١٢٥

المطبعة العصمتية

شارع الخليج الناصري رقم ٦ بالفجالة بمصر



65-14

2267  
·1605  
·389




حضره صاحب الجلالة ، فؤاد الاول ، ملك مصر

اہم دعاء الکتاب

بِسْمِ اللَّهِ وَبِاسْمِ وزَارَةِ الزَّرْعِ الْمَصْرِيَّةِ وَقَسْمِ وِقاَيَا النَّبَاتَاتِ وَبِاسْمِ فَرعَ الْحَرَيرِ  
وَبِاسْمِ شَخْصِي الْضَّعِيفِ أَتَقْدُمُ إِلَى حَضْرَةِ صَاحِبِ الْجَلَالَةِ مَلِيكِ الْبَلَادِ فَوَادِ الْأَوَّلِ  
بَاهْدَاءِ هَذَا الْكِتَابِ الَّذِي قَتَ بِعَمَلِهِ وَوَضَعَهُ فِي زَرْاعَةِ أَشْجَارِ التَّوْتِ وَتَرِيَّةِ دُودَةِ  
الْفَزِّ الَّتِي سَتَكُونُ بِفَضْلِ رِعَايَةِ جَلَالَتِكَمْ أَجْلُ مُورَدٍ وَأَعْظَمُ ثَرَوَةً فِي الْبَلَادِ . وَإِنِّي أَمْحَدُ  
اللهَ عَلَى أَنْ يَسِّرَ لِي الْقِيَامَ بِوَضْعِ هَذَا الْكِتَابِ الَّذِي سَيَكُونُ بِفَضْلِ عِنَايَةِ جَلَالَتِكَمْ  
مَرْشِدًا وَعَوْنًا لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَخْدُمَ قَطْرَنَا ، وَيَبْحَثَ عَنْ مَوَارِدِ ثَرَوَةِ بَلَادِنَا ، وَكَانَ اللهُ تَعَالَى  
جَلَتْ قَدْرَتَهُ أَرَادَ أَنْ يَسْعُدَ الْبَلَادَ بِتَعْدِيدِ ثَرَوَاتِهَا فِي عَهْدِ جَلَالَةِ مَلِيكَنَا حَيْثُ وَفَقَ  
وزَارَةِ الزَّرْعِ لِاَنْشَاءِ فَرعَ لَتَرِيَّةِ دُودَةِ الْفَزِّ وَالْعَمَلُ بِمَجْدِ عَلَى تَعْمِيمِ الْمَشْرُوعِ فِي الْأَنْهَاءِ  
الْقَطْرِ لِيَكُونَ لِبَلَادِنَا مِنْ ذَلِكَ السَّعَادَةِ وَالْأَهْنَاءِ ، وَإِنِّي أَبْتَهَلُ إِلَى اللهِ سَبِّحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ  
يُعِينَ الْأَمَّةَ الْمَصْرِيَّةَ عَلَى اِقْتِحَامِ الصَّعَابِ فِي سَبِيلِ الْوَصْولِ إِلَى اِنْفَعِ الْمَشْرُوعَاتِ  
وَدَفَائِقِ الْمَصْنُوعَاتِ وَأَنْ يَاهْمِهَا الصَّوَابُ وَيَوْقِفُهَا لِلْعَمَلِ لِمَا فِيهِ مَصْلَحةُ الْبَلَادِ فِي عَهْدِ  
مَلِيكِهَا الْمَفْدِيِّ فَوَادِ الْأَوَّلِ وَأَنْ يَؤْيِدَ وَلِي عَهْدِ الْأَمِيرِ فَارُوقَ وَيَمْدُهُ بِرُوحِ مِنْ  
عَنْدِهِ حَتَّى يَبْلُغَ فِي خَلْ أَيَامِهِ الْإِزَاهَرَةَ أَمَالَهُ وَأَمَانَيْهِ وَأَنْ تَسْعُدَ بِمَجَالَتِهِ الْبَلَادَ بِفَضْلِ  
عِنَايَتِهِ بِالْمَشْرُوعَاتِ إِنَّهُ عَلَى مَا يَشَاءُ قَدِيرٌ

محمد علی بیگم



( ١ )

رسم المؤلف في معمل مدرسة تربية دودة القز العليا بفرنسا

## مقدمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله الهم إني استفتح باسمك الجليل كتاب تربية دودة الحرير وزراعة أشجار التوت وأسألك ان تجعله كتاباً مباركاً وارشاده مثمناً وأن تنفع به المربين والبلاد انك على ماشاء قادر.

وإنى مع هذا اتقدم بخالص الشكر وجزيل الثناء لحضرات إخوانى الاجلاء الذين أولونى عطفهم وحيوني بشقهم وتشجيعهم حتى أخرجت كتابى هذا الى الأمة، راجياً أن يعم نفعه البلاد . وقد حلية بالرسوم والصور التي قمت برسم بعضها واستعارة البعض الآخر ليكون ذلك أكمل للفهم وأوفى للتجارب العلمية والعملية .

ولقد دعاني إلى القيام بعمل هذا الكتاب احتياج المربين إلى ما يرشدهم إلى تربية دودة الحرير وزراعة أشجار التوت ، واهتمامى بمصلحة بلادى التى ولدت فيها ونشأت تحت سماها وتغذيت بخيراتها . وما وجدته من اهتمام حكومتنا السنية فى العمل على تربية هذا المشروع بكل وسائل التشجيع مما تستحق عليه الثناء الجزيل والشكر العظيم ، ولقد دل على عظيم اهتمامها ما فصلته فى المذكرة المرفوعة الى مجلس الوزراء عن ميزانية ١٩٢٨ - ١٩٢٩ حيث قالت : ان ما أصاب ثروتنا المصرية فى السنين الأخيرة من جراء اعتمادنا على محصول القطن وحده - الذى تبلغ قيمة ما تصدره مصر منه ومن توابعه كالبذرة والكسب ٩٠٪ من الصادرات جميعها - وبينت المذكرة في غير موضع وجوب الاهتمام بالحاصلات الأخرى وتحسين أنواعها لتخالص مصر من الأزمات التي تصيبها بين آن وآخر في أسواق القطن التي تؤثر فيها عوامل كثيرة ربما لا يخطر ببعضها على الأذهان - وجاء في فقرة من المذكرة ما نصه :

« وهكذا كان شأننا في الماضي وسوف يكون في المستقبل ما دام القطن وحده أساس ثروتنا ، وما دامت الجهد المؤدية لاستنبط موارد جديدة لا تزال كما عهدها محدودة ، وما دامت العوامل المهيمنة على سوق القطن لا سيطرة لنا عليها ، فسيبقى رخاؤنا أو اعساينا تحت رحمة الطوارئ التي تؤثر في وفرة المحصول وارتفاع أسعاره من آفات زراعية أو قلة في المياه أو وفرة في الحصول الأميركي أو نقص في المقطوعية » وقد جاء في خطاب العرش عند افتتاح البرلمان يوم ١١ يناير سنة ١٩٣٠ (ونعني بترية دودة القز وصناعة الحرير) .

اذن قد أصبح من واجبنا ونحن أفراد هذه الأمة والأيدي العاملة في ثروتها أن نعمل في غير صنف وننجح غير مورد وفتح أبواباً كثيرة من الأسباب حتى نأمن جانب الأزمات المؤثرة في ثروتنا التأثير الذي يخف ويُقلّل تبعاً لـ الكثرة الموارد وقلتها وربما أدتـى بـنا يوماً ما إلى الفقر المرذول . ولكن بفضل عناية حضرة صاحب الجلالة مـلكـناـ المعـظـمـ فـؤـادـ الـأـوـلـ وـرـجـالـ الـإـبـطـالـ الـذـيـنـ اـهـتمـواـ بـهـذـاـ المـشـرـوعـ فـانـهـ سـيـعـودـ عـلـىـ الـبـلـادـ بـالـخـيـرـ الـعـظـيمـ وـالـنـفـعـ الـجـزـيلـ .

وقد رأيت أن أضع كتاباً في ترية دودة القز ، ولا أشك بـرهـةـ فيـ أنـ مـصـرـ قدـ أـهـمـتـ هـذـاـ مـوـرـدـ الـمـنـتـجـ زـمـنـاًـ طـوـيـلاًـ كـانـ يـجـدـرـ بـهـاـ لـوـثـابـرـتـ عـلـىـ تـقـيمـتـهـ أـنـ تـصـبـحـ هـاـ مـكـانـتـهاـ الـلـائـقـ بـهـاـ بـيـنـ مـالـكـ الـعـالـمـ فـيـ اـصـدـارـ الـحـرـيرـ .

ولعل السبب في اهمال المصريين هذا المورد من الثروة يرجع إلى المرض الذي أصاب دودة القز وجهم أسبابه أبان زراعة التوت في مصر بكثرة قصد ترية دودة القز بأمر من رئيس الأسرة العلوية وأساس النهضة المصرية المغفور له محمد على باشا الكبير ، فرغـبـ عنـهـ المـصـريـونـ لـأـنـهـ قـرـيبـ الـعـهـدـ بـهـ فـظـنـواـ أـنـ سـبـبـ الـضـرـرـ وـهـوـ عـدـمـ موافـقةـ هـوـاءـ هـذـهـ الـبـلـادـ لـهـ عـلـىـ الرـغـمـ مـنـ أـنـ كـانـ قـدـ أـوـشـكـ أـنـ يـاتـيـ بـثـرـتـهـ المـرجـوةـ . ولكن ذلك لا يـثـنـيـناـ عـنـ الـعـودـ إـلـىـ هـذـاـ الـبـابـ مـاـ دـامـ الـأـمـلـ كـبـيرـ فـيـ النـجـاحـ ، وـاـنـ نـرـىـ أـنـ نـبـيـنـ بـادـيـ ذـيـ بدـءـ فـوـائـدـ زـرـاعـةـ التـوتـ قـبـلـ أـنـ تـكـلـمـ عـلـىـ أـدـوـارـ حـيـاتـهـ الزـرـاعـيـةـ وـكـيـفـيـةـ اـسـتـثـمارـهـ لـاتـاجـ الـحـرـيرـ - فـلـعـلـ نـتـيـجـةـ أـمـرـ مـاـ هـيـ أـمـ الـبـوـاعـثـ عـلـىـ الـاقـبـالـ عـلـيـهـ ، وـالـيـكـ مـجـمـلـ هـذـهـ الـفـوـائـدـ :ـ

أولاً - ما يكتسبه الفلاح من الحالات الأخرى التي تزرع في الأرض  
المزرعة توتن كالخضروات والحبوب

ثانياً - ان مصر لجودة تربتها وغزارة مياهها وطمي نيلها تستطيع أن تنبت  
أشجاراً من التوت تعطي محصولاً وافراً من الأوراق

ثالثاً - فضلات الورق التي تختلف من غذاء الدود وبرازه لو أضيف جافاً  
إلى التبن كان علفاً جيداً للأبقار في فصل الربيع.

رابعاً - ورق التوت يقوم مقام البرسيم في علف البهائم في فصل الخريف.

خامساً - أغصان التوت المفصولة عن الشجرة بالتقليم كل عام تباع حطباً  
للوقد وفمهما يكون نوعاً جيداً

سادساً - خشب التوت لصلابته وقوته تصنع منه الأدوات الخشبية الثمينة  
ولاندماجه تصنع منه السفن والسوقى .

سابعاً - يصنع من ثمرة التوت شراب معروف باسمه ويستخرج منها نوع من  
الحمر ويحففوتها ببلاد العجم في الفل ويأكلونها كالزيتون أو  
يطبخونها كالمشمش .

ثامناً - لا تحتاج هذه الزراعة إلى عمال كثيرين .

تاسعاً - التوت بعد غرسه بثلاث سنوات لا يحتاج إلى ماء ولا سما في مصر  
في الأراضي الزراعية لقدرة جذوره على الامتداد في جوف الأرض  
إلى مدى بعيد حيث توجد التربة الرطبة .

عاشرًا - لون سجنه في بلادنا وهو اللازم أمكن أن يكون لنا منه دخل عظيم .

هذا وإن الأمل لعظيم في أبناء مصر الناهضين بها ولا سما الأغنياء منهم أن  
يبدأوا بالعمل لعملي ، عيوننا نوراً وقلوبنا سروراً ، واليهم أقدم بهذا المؤلف الذي أرجو  
أن يكون نواة لمشروع جليل يفتح على مصر مورد ثروة جديدةً كثيرة الغلة والخيرات



( - )

# المبحث الأول

في

## زراعة التوت

أقر علماء النبات ان التوت من نباتات المناطق الحارة ، وهو في الواقع لا ينمو نماء جيداً في المناطق الباردة كما ينمو في الارجاء الحارة أو المعتدلة ولو أنه اليوم أصبح يزرع في إقاليم أخرى عدا تلك التي نشأ فيها . والموطن الأصلي للتوت هو بلاد الصين ثم انتقل منها إلى باقى بلاد القارة الآسيوية ، وكذلك انتشر في أمريكا والجزء الجنوبي من أوروبا وأفريقيا الشمالية .

وليس من المستطاع تحديد العهد الذي أدخل فيه التوت إلى مصر غير أن زراعته كانت معروفة في مصر من زمن قديم جداً، ويزرع حول السوق وعلى شواطئ الترع للاستظلال والاستئثار واستعمال أخشابه في صنع الآلات الزراعية ، وأخيراً لتغذية دود الفرز بأوراقه عند الأفراد الذين كانوا على علم بتربية هذه الديدان .

وقد اتجهت العناية الآن في المناطق التي انتشرت فيها تربية دودة الفرز إلى اختيار أصلح أنواع شجر التوت والأكثر من أصنافه ذات الورق الكبير الحجم . ولا يخفى على كل من له دراية بتربية هذه الديدان ان ورق التوت هو الغذاء الرئيسي الوحيد للدود الفرز وليس هناك أى غذاء آخر يقوم مقامه اذا استثنينا ورق الخروع الذى يتغذى به نوع خاص من أنواع دودة الحرير .

### أنواع أشجار التوت

تجبود زراعة أشجار التوت وتتوافق جيداً في جميع المناطق التي يزرع فيها ، وأنهم أنواعه ثلاثة هي :-

١ - التوت الأبيض

٢ - التوت الاسمر

٣ - التوت الاحمر الحبشي

١ - التوت الايض : يزرع هذا النوع في جميع أنحاء العالم تقريباً وموطنه الأصلي آسيا (الصين والهند) ثم انتقل الى ايطاليا في القرن الثالث عشر ثم الى فرنسا في سنة ١٥٩٤ في حكم الملك شارل الثامن والنزي أحضره في ذلك العهد هو جوبي حاكم مقاطعة الان بفرنسا ، ويشمل ستة أصناف .

١ - توت ايض وردي

» كولباس

٢ - » كولباسينا

» رومانا

٣ - » موريتي

٤ - » غير مطعم

» لانيفاليا

٥ - » لوه

٦ - » ترتريكا

الترابة : ينمو شجر التوت في جميع الاراضي تقريباً ويتحمل الجفاف في المناطق الحارة ، الا انه لا ينمو جيداً في الاراضي الكثيرة الرطوبة اذ تنتشر فيها الامراض الفطرية التي يخشى منها أن تقضي على حياته .

والاصناف الجيدة من التوت تكون أوصاف أوراقها كالتالي :

رفيعة ملساء ذات لون أخضر داكن وسطحها الاعلى لامع وأما الاسفل فيكون باهتاً وشكلها قابي مشرشة الحافة أو مقصصبة سهلة الانفصال عند قطعها .

٢ - التوت الاسمر : كان هذا النوع منتشرأً في فرنسا قبل ظهور التوت الايض

الذى حل محله منذ القرن السابع عشر .

(أوراقه) غالباً كاملاً قلبية الشكل غليظة خشنة ذات رغب على السطح الأسئفل فكان من أجل ذلك غذاء غير صالح لدود القرف فأهمل أمره  
 ٣ - التوت الاحمر الحبشي - هو أمريكي الأصل شجره جميل المنظر يبلغ طوله في بعض الاحيان ٢٥ متراً تقريباً.

(أوراقه) خشنة ولا يرغب الدود في التغذية منه ولذلك لم يتم بزراعته وأما ثمرة فغض الطعم.

### اكتار أشجار التوت

يتكاثر التوت اما بالبذور او التقطيع او التزقييد او بالعقل وسنتكلم على التكاثر بالبذور.

### الاكتار بالبذور

للحصول على بذور جيدة يجب مراعاة الشروط الآتية :

- ١ - انتخاب أشجار التوت الجيدة ذات الورق العريض الأملس .
- ٢ - أن لا يقل عمر الشجرة عن ١٥ خمسة عشر سنة
- ٣ - أن تكون هذه الاشجار خالية من كل أنواع الامراض التي تصيب التوت
- ٤ - أن تكون هذه الاشجار ناضجة وقت الشروع في أخذ البذور منها .

### كيفية تجربة البذور

في شهرى ابريل ومايو تؤخذ الثمار بعد جمعها على اكياس من الخيش أو حصر من البردى وتعصر في آنية حتى تنفصل البذور من لحم الثمر وتغسل بالماء مراراً حتى يزول عنها كل ما هو عالق بها من أجزاء الثمر التي تطفو على وجه الماء (فيبيق بها) وتكرر هذه العملية حتى يتم تنظيف البذور ولا يبقى فيها شيء من لحم الثمر وقشره ثم تصفي البذور نهائياً وتوضع على قطعة قماش في محل طلق بعيدة عن الشمس والرطوبة

والدخان بحيث لا تزيد طبقة البذور على ثالث مليمترات وتقلب ثلاث مرات أو أربع يومياً حتى يتم جفافها في مدة ثلاثة أيام أو أربعة على الأكثـر.

ثم توضع في كيس من القماش داخل صندوق من الخشب يحفظ في محل جاف  
مهوى بعيداً عن الحشرات الى أن يحين موعد الزرع، وبهذه الطريقة يمكن حفظ  
البذور لأكثر من سنة دون أن يلحقها أي ضرر، ولكن يحسن زراعة البذور في  
نفس السنة التي جمعت فيها فترزع في يوليه وأغسطس وسبتمبر أو في شهر يناير  
وفبراير ومارس

افتیار الارضی و اعترافها المزور

يجب اختيار قطعة من الأرض تكون مخدومة جيداً لعمق ٤٠ أربعين سنتيمتراً على الأقل ومضافة إليها أسمدة بلدية قدية تكون قد مضى عليها نحو الثلاث سنوات، ولتكون الأرض هشة خفيفة يضاف إليها قليل من الرمل وتقسم حيضاً صغيرة لا يقل كل منها عن متراً مربع يمكن أن تبذر فيها ما يقرب من ألفي بذرة يحصل منها على نحو ١٣٠٠ - ١٤٠٠ شجيرة في شهر نوفمبر.

وإذا أريد زراعة مساحة أوسع فيمكن جعل عرض الحوض متراً وطوله خمسة أمتار مثلاً وتزرع البذور في صفوف تبعد عن بعضها نحواً من عشرة سنتيمترات وتفطلي بالتراب الناعم بطبقة لا يزيد سمكها على بضعة مليمترات حتى لا تعيق هذه الطبقة النبت عن الظهور على وجه الارض ثم تروى رياً خفيناً (بالشاش) حتى تشبع الارض ومن ثم تروى كل ثلاثة أيام في الصيف وإذا احتاج الامر فكل يومين دفعه بلا بأس وهذا يتوقف على قوة جفاف الارض ، حتى تبدأ النباتات في الظهور بعد عشرين يوماً من تاريخ زراعة البذور .

أما زراعة البنور في صفوف فهي تسهل استئصال الأعشاب من الأرض إذ أن هذا أمر واجب عمله من حين لآخر.

### الخلف




رسم رقم (١)

بعد ظهور خمسة أوراق أو ست من بادرات التوت كالرسم رقم (١) يجب اجراء عملية الخلف وبعدها قد يشاهد ضعف في الشجيرات فلأجل استعاضة هذا الضعف يضاف الى الماء نترات الصودا بنسبة  $\frac{3}{4}$  جرام لكل لتر ماء.

ويجب الاعتناء باستئصال الحشائش دائمًا ورى الارض مرارًا وخاصة في فصل الصيف مرة كل أسبوع على الأقل مع مراعاة طبيعة الارض والجedo.

### الزرع



رسم رقم (٢) - ذور الشجرة قبل تقاميمها

تجهز الارض بعمل خطوط تبعد عن بعضها بقدار متراً تقريرًا وذلك بعد خدمة الارض الخدمة الالزامية ثم تجهيز الحفر (الجور) في الخطوط على بعد نصف متراً من بعضها ويكون عمقها نحو ٥ سنتيمترًا تقريرًا وأحسن الأوقات المناسبة لعملية الشتل أواخر شهر فبراير وشهر مارس - والطريقة في ذلك هي :-  
تروي أولاً الشتلة رياً غزيرًا حتى يسهل زرع النباتات التي يكون طولها وقتمذنحو ٦٠ - ٧٠ سنتيمتراً كافٍ رسم نمرة ٢ وتقلم جذورها

ثم تغمر هذه الجذور في حفرة بها زرب (روبه) مغطى بتراب جاف نوعاً  
ثم تؤخذ هذه النباتات وتزرع في مواضعها بحيث تكون النباتات مائلة جهة  
الجنوب قليلاً وبعد اتمام الزراعة (أي زرع جميع النباتات التي اقتلت في هذا اليوم)  
تروى الخطوط رياً معتدلاً.

ويحسن ألا يزيد عدد النباتات المقلعة عن المقدار الذي يمكن زراعته في يوم واحد حتى لا يلحق الشتلة ضرر ويجب موالة الأرض بالعزق كلاما دعت الحاجة فإذا نبت النباتات نمواً كافياً تستأصل بعض من الأفرع الجانبية ويترك الساق الرئيسي وبعض الأفرع الجانبية حتى يأتي وقت التطعيم.

### الاكتار بغير البذور

يمكن الاكتار من التوت بوسائل أخرى غير وسيلة البذور وهذه الوسائل هي التطعيم أو العقل أو الترقيد.


### الوقت المناسب

وأنسب الاوقات لهذه العمليات هو شهرى أغسطس وسبتمبر أو فبراير ومارس وهذان الشهيران الاخيران هما أنساب الاوقات لعملية التطعيم والعقل والترقيد. وتجري هذه العمليات حسب المتبوع في الاكتار من الفواكه وهذه الطرق معروفة ولا حاجة للالفاظة في شرحها

### اعراض الارض

خدم الارض المراد غرس الاشجار فيها خدمة جيدة الى عمق ٣٥ سنتيمتراً تقريباً وتنصف اليها مقادير من الاسمنت البلدية القديمة لتكون هاشة خفيفة تنتشر فيها جذور الاشجار لامتصاص المواد الغذائية اللازمة لها من مجال أوسع ثم تحفز الحفر على ابعاد منتظمة بحيث يكون اتساعها متراً مربعاً وعمقها ٧٥ سنتيمتراً كالمسم رقم (٣)

كذلك قبل الزرع بثلاثة اسابيع على الاقل لتعريف الحفر الى المؤشرات الجوية والشمس ، أما بعد الحفر (الجور) بعضها عن بعض فيختلف باختلاف نوع الأشجار وطريقة تربية السيقان



رسم رقم (٣)

كيفية وضع الشجر في محله الدائم بعد تفاصيل جذوره

ويجب عند الفرس مراعاة النقط الآتية —

اولاً - يقلم جذر الشجرة الرأسى بحيث يكون طوله من ٢٥ الى ٤٥ سنتيمترًا وكذلك تقليل الجذور الجانبية تقليلًا خفيفًا كافٍ رسم رقم (٣)

ثانياً - تغرس قاعدة خشبية بجانب ساق الشجرة لتكون كدعامة لها تقييمها عصف

الرياح القوية بحيث تغوص في الأرض أكثر من نهاية الجذر بحو ٣٠ سنتيمتراً  
ويكون طرفها العلوي مساوياً لطول الشجرة كافٍ رسم غرة ٣  
ثم تردم الحفرة أولاً بطين مائع (روبه) بقدر ٣٠ سنتيمتراً ثم بتراب جاف حتى  
يتم ردم الحفرة ويربط ساق الشجرة مع الدعامة المذكورة .



### العناية بأشجار التوت

#### ﴿تربية سيقان الشجرة﴾


توجد طرق كثيرة لتربية سيقان الشجر  
تلخص في ثلاثة طرق كما يلي :  
 ذات الساق الطويل (متر ونصف إلى  
مترين) وتكون مسافة الأبعاد بين الأشجار  
سبعة أمتار - وذات الساق القصيرة (٧٥  
سنتيمتراً إلى ١٠٠ سنتيمتراً) وتكون مسافة  
البعد بين الأشجار مترين

### التقطيع

التقطيع هو من العمليات الفضفورية لنمو  
الأشجار غواً منتظمًا ، وله طرق وأشكال  
كثيرة غير أن أفضلها هي الطريقة المسماة  
(جوبليه) أي التي تجعل الشجرة في شكل  
كأس كالرسم المبين في غرة ٦ بأن تقطع  
الاغصان على طول ١٥ إلى ٢٠ سنتيمتراً

مع ترك من عينين الى ٣ عيون كى تنمو وتخرج في الربيع القادم براعم وفروعًا جديدة  
كارسم غرة ٤ و ٥ وهذه الفروع والبراعم اذا تكررت عليها هذه العملية نفسها مدة

سنتين أو ثلاثة سنوات انتجت فروعًا جديدة وهكذا تكرر هذه العملية كل عام الى ان تصبح فروع الشجرة متناسبة مع قوتها (كارسم نمرة ٦)



رسم رقم (٥)  
تقليم ثانى سنة

### آراء التقليم

يجب القيام بهذا العمل بدقة وعناية كبيرة ويجب على الأخض ان تكون الآلات التي تستعمل في التقليم حادة جداً لأن القطع له تأثير عظيم في قوة الشجرة وصحتها.

### فوائد التقليم

لتقليل اشجار التوت كل عام ( بعد اخذ أوراقها لتفريزية دودة القرف موسم التربية ) جملة فوائد تختص بالذكر منها خمسة فوائد فنية هي :

أولاً - ازالة الفروع والبراعم الميتة والتي تكسرت اثناء جنى أوراقها في موسم التربية أى في شهري مارس وابريل  
ثانياً - ازالة الفروع التي تكون

قوة انباتها ضعيفة وازالة الافرع التي تنبت حول الساق


ثالثاً - بواسطة التقليم نوقف نمو الافرع التي تكون قوة انباتها قوى خصوصاً في الجزء الذي يعلو الشجرة حتى لا تستمر في الارتفاع الزائد .

رابعاً - يمكن تقصير الأفعى التي تنمو وتمتد أفقاً ويمكن أيضاً إزالة جميع الأفعى التي تتدلى

خامساً - إذا تغير اتجاه فرع من أفرع الشجرة فيمكن وضع الفرع الذي تغير وضعه (أثناء جنى الأوراق مدة الموسم) في مكانه .

#### أما الفوائد العملية

فهي : -



رسم رقم (٦)  
تقليم السنين الأخرى

لا يخفى أن الفروع  
التي تتحصل عليها من  
التقطيم تستعمل ل الوقود  
وإذا كانت الأفعى كبيرة  
فيستعمل منها بعض  
أدوات زراعية وأيدي  
للآلات اليدوية و غيرها  
و خشب التوت خصوصاً  
نوع التوت الأبيض ،  
مندمج ذو لون أصفر  
لطيف يشبه لون الليمون

ويصلاح في عمل الخراط ويصنع منه أنواعاً كثيرة من الأثاث المنزلي كما أنه ينفع  
لعمل العربات والبراميل ، وكثيراً ما يستعملونه مزارعى السكرورم فى عمل التكعيب  
لألعاب لأنها تمتلك زمناً طويلاً

#### التسميد

يجب تسميد أشجار التوت إما بالسماد البلدى وذلك فى فصل الخريف ببعد  
عشرة إلى خمسة عشر كيلو جراماً لكل شجرة نشراً فوق كل المساحة المنزرعة توائماً

أو في حفر حول أصول الشجر يكون عمقها ثلاثة سنتيمترات، وأما بالسماد الكيماوى فى شهرى فبراير ومارس بالنسبة الآتية :-

سلفات النشادر	٣٠٠ جرام لكل شجرة توت
سوبر فسفات الكلسيوم	٤٠٠ « « « «
سلفات أو كاورور البوطاں	٣٠٠ « « « «
المجموع	١٠٠٠ الف جرام لكل شجرة

يوضع هذا المقدار من السماد الكيماوى في حفر حول اصول الشجرة عمقها نحو خمسة عشر سنتيمترات، ولا يوضع هذا السماد للشجرة قبل أن تبلغ المائة سنوات ويجب منزح الأسمدة الكيماوية بعضها بعض قبل استعمالها مباشرة . ما عدا السوبر فسفات الكلسيوم فإنه ينشر حول اصول الشجر قبل التسبيخ بأسبوع على الأقل ويكون استعمال الكيكيات المبنية آنفًا بوجه عام في جميع أنواع الأرضى الا اذا كان التحليل الكيماوى للأرض يدل على أنها غنية في مادة من المواد أو فقيرة في مادة أخرى فتعدل الكيكيات حسب ما يتقتضيه الحال .

والأفضل في التسميد أن يكون بالسماد البلدى القديم الذى مر عليه مئتان على الأقل .


### محصول ورق التوت

سبق أن ذكرنا أن سيقان أشجار التوت تربى على طرق ثلاثة :

١ - فالأشجار ذات السيقان الطويلة يؤخذ ورقها بعد غرسها في محلها الدائم بأربع أو خمس سنوات ويعطى الفدان الواحد ( بفرض انه يحتوى على ٨٥ شجرة ) نحوًا من الفين الى ثلاثة آلاف كيلو جراماً من الورق تقريرًا كل عام حتى يبلغ عمر الشجرة حوالي عشر سنين ثم يزداد المحصول عاماً بعد عام حتى يصل الى اثنى عشر الفاً وقد يبلغ سبعة عشر الفاً من الكيلو جرامات تبعًا لمبلغ العناية ومعدن الأرض

٢ - أما الأشجار ذات السيقان المتوسطة فيؤخذ ورقها بعد غرسها في محلها الدائم بستين أو ثلث ويعطى الفدان الواحد ( بفرض انه يحتوى على ٢٦٢ الى ٢٧٠ شجرة ) نحواً من ٤٠٠٠ الى ٥٠٠٠ كيلو جراماً تقربياً من الورق كل عام في المتوسط حتى يبلغ عمر الشجر نحو ستة سنوات أو سبعة ويزداد المحصول بعد ذلك حتى يصل أحياناً الى ١٣ او ١٤ الف كيلو جرام وذلك تبعاً للعنابة ومعدن الأرض .

أما الاشجار عديمة الساق فأصلها من العقل المأخوذة منأشجار مطعمه وتزرع مباشرة في خطوط يبعد الواحد عن الآخر بمترين وتبعد العقلة عن الأخرى بثلاثين سنتيمتراً أو ثلث متر كالرسم نمرة ٧٩٨٧٥ بحيث يكون في كل متر طولي ٣ عقل في محلها الدائم ويؤخذ ٣ ورقها بعد غرسها بستين فقط .



رسم رقم (٧)  
الأشجار الفضيلة الساق



رسم رقم (٨)

ويعطى الفدان الواحد ( بفرض انه يحتوى على ٧٨٧٥ عقلة ) نحو ٩٠٠٠ كيلو جراماً تقربياً من الورق كل عام في المتوسط وقد يصل محصول الفدان الى ١٦٠٠ ك . م

وذلك تبعاً إلى مبلغ العناية بالأشجار وكذلك حسب معدن الأرض وحالة الجو .  
( انظر الرسم رقم ٨ و ٩ )

ويرجع أساس هذه التقديرات إلى الhecattar من الأراضي الأوروبية في الجهات التي تعنى بتربية دودة القرن والتي يختلف معدنها وتركيبها عن معدن وتركيب الأرض المصرية الغنية في المواد الغذائية المتوافر فيها نظام الري والصرف .

### ولا يغيب من الذاكرة

انه يوجد بين خطوط أشجار التوت سواء كانت من ذوات السوق الطويل أو المتوسط أو القصير مساحات غير مزروعة ومعرضة للشمس ويمكن استغلالها بزرعها بمحاصيل إضافية كالذرة أو الكتان أو الخضر ، كالفاصولية واللوبياء والطاطم وما ماثل ذلك .

٣ - وأما الأشجار ذات السيقان القصيرة فيؤخذ ورقها بعد غرسها

رسم رقم ( ٩ )

في محلها الدائم بستين أو ثلث ويعطى الفدان الواحد ( بفرض انه يحتوى على ١٠٥ شجرة ) نحوًا من ٦٠٠٠ الى ٨٠٠٠ كيلو جرام تقريرًا من الورق كل عام في المتوسط حتى يبلغ عمر الشجر نحو ثمانى سنوات ثم يزداد المحصول بعد ذلك حتى يصل أحياناً إلى ١٤ أو ١٥ الفاً من السكيلو جرامات .



والأشجار ذات الساقان القصيرة أفضل عملياً من وجهاً المهمولة والسرعة في جمع الأوراق واجراء عمليات التقليم وفي قلة الأيدي الازمة والأجور المطلوبة لاجراء هذه العمليات وهي تعطى في نفس الوقت مخصوصاً جيداً.

يستدعي جنى ورق التوت عناء عظيمة فلا يجوز أن تترك أجزاء من الورق على الشجرة بعد قطفه كما انه يجب أن تجرب الأوراق العتيقة لشجر التوت قبل الاوراق الحديثة وذلك لكن تجد زمناً متسعًا لتجدد فيها أوراقها النامية .

وبعد جنى أوراق التوت تجرى عملية التقليم فيزال ما اتلف من الفروع أثناء عملية جنى الورق ويجب العناية بنظافة الأوراق فتوضع في أقبية أو سلات نظيفة بحيث لا تتلوث بالغبار أو بغيره منعاً لما يحدث من ضعف الديدان أو مرضها عند ما تتغذى على هذه الأوراق كما انه يجب ألا يجني الورق الا بعد تطوير الندى لأن الرطوبة على الأوراق تحدث فيها تخمراً فتفسدها فضلاً عما تحدثه من التخمر في أحشاء الديدان اذا ما تغذت وهي ما تزال رطبة وينسب عن ذلك مرض يقضى على حياة الديدان .

### الاصراض التي تصيب شجر التوت

تصاب أشجار التوت بأمراض طفيلية تسبب عن جروح في الشجر أو أمراض ميكروية ، وكذلك تصاب بأمراض أخرى لا داعي لذكرها اذ انها غير معروفة في مصر .

اما الحشرة الخطيرة التي تصيب أشجار التوت في هذا القطر فهي (البقر الدقيق) فانها تحدث بها تلفاً عظياً ، ولمقاومة هذه الحشرة يجب رش الأشجار بالمحاليل التي تستعملها وزارة الزراعة خصيصاً لهذه الحشرة، ويجرى البحث الان عن وسيلة ناجعة تمنع انتشار هذه الحشرة وتکاثرها وتفادي عليها القضاء المبرم فإذا تحقق ما نرجو أتينا على نبذة اضافية على ذكر هذه الطريقة وكيفية التغلب على هذه الحشرة التي تعتبر من أهم آفات شجر التوت .

## المبحث الثاني

في


### تربية دودة القز

ان تربية دودة القز فرع من اهم فروع الزراعة جدير بالعناية لا سيما اذا سار العمل فيه على نظام محكم مؤسس على القواعد العملية والعلمية ، ورغبة في الوصول الى هذه النتيجة فاننا نبدأ بشرح اطوار حياة هذه الدودة كي يطلع عليها القارئ .

دودة القز حشرة من الفصيلة الحرشفية الاجنحة واسمها العلمي بوميكس موري وأول طور من حياتها حين تكون بوبيضة . والبوبيضة صغيرة الحجم يبلغ متوسط طولها نحوها من مليمتر وعرضها نحوها من ٨ و من المليمتر وتفرخ ديداناً صغيرة تعيش في درجة حرارة تختلف من ٢٠ الى ٢٥ سنتigrad لمدة تتراوح بين ٣٥ - ٤٥ يوماً تتغذى فيها على ورق شجر التوت الذي سبق الكلام عليه .

فإذا قمت المدة اللازمة لتغذيتها تصوم وتتساقط على بعض الأفرع النباتية الجافة أو ما يقوم مقامها مما يوضع لهذا الغرض ، وتشعر في عمل الشرنقة التي هي عبارة عن نسيج مكون من فثالة واحدة يبلغ طولها من ٤٠٠ الى ٨٠٠ متر وأحياناً يصل طولها ١٢٠٠ متر ، وتحبس نفسها داخله أو بعبارة أخرى تحمى نفسها داخل هذا النسيج لمدة تتراوح من عشرة أيام الى ١٥ يوماً تبعاً لدرجة الحرارة وفي أثناء هذه المدة تحول هذه الدودة الى عذراء كما هو مبين في الشكل رقم ٢٧

وبعد اقضاء حوالي اسبوعين تتحول هذه العذراء الى فراشاة تقب الشرقة بقسم جزء من النسيج كا في الشكل رقم ٢٩ وذلك بافراز مادة سائلة من فمها تسهل عملية التقب ابتعاء الخروج ، وبعد تخلصها من الشرقة تظل ساكنة لبعض ساعات ثم تستعيد نشاطها ، ويبحث الذكر عن الانثى لاقيام بعملية التلقيح كاسياً الكلام على ذلك فيما يلي



بويضات دودة القر رقم ٢٣

وبعد بعض ساعات تضع الانثى بويساتها كا في الشكل رقم ٢٣ ، وتسمى هذه البويسات في عرف مربي دودة القر بالبذور وقوت بعد الوضع بضعة ايام لا تزيد على اسبوع وبذلك تم دورة حياة دودة القر  
ومن شرح بالتفصيل كل طور من اطوارها فيما بعد

### أصل موطنها ونار نحرها

أصل موطن هذه الحشرة هو شرق آسيا أي بلاد الصين حيث وجدت تتغذى على ورق التوت في حالة بريّة ، وأول من اعنى بتربيتها وكانت ذلك منذ خمسة وأربعين قرنا الامبراطورة ( سى ينج شى ) زوجة الامبراطور ( هوانج تى ) في سنة

٢٦٥ . قبل الميلاد ، وكانت هذه الامبراطوره تنسج ملابسها من الحرير الذى ينتجه الدود ، وزاد الشغف بتربيه دودة الفز حتى اطلق عليها آلهة دود الحرير وفي ذلك العهد انحصرت مسألة تربيتها في البلاط الامبراطوري فقط وسار الامراء والاميرات وبنات رجال الجيش والوزراء يربونها تحت اشراف الامبراطوره . وزادت طرق التحسين في تربيتها فتكتاثر الحصول سنة بعد أخرى ، وبلغ حرص الامبراطورة على البوبيضات مبالغًا عظيمًا حرمت نفه إلى جهات أخرى وفرضت عقاباً صارماً على كل من يجرؤ ويحاول نقل البوبيضات إلى بلاد أخرى وجعلت الاعدام جزاء كل من يخالف ذلك ، ولكن حدث في القرن الخامس آى سنة ٤١٩ أن اميرة من أميرات الصين تزوجت باحد ملوك الاقطان المجاورة في جهة تدعى كوتان وكان شغفها بتربيه دودة الحرير عظيماً فأخذت بين جدائل شعرها بعض البوبيضات كى تفلت من الرقابة الشديدة التي كانت مصروبة بصرامة في ذلك العهد .

وفي القرن الخامس - الثامن اشتعل العرب بتربيه دودة الفرز في بلاد الاندلس (اسبانيا) وصارت تنتقل تربيتها من بلد إلى أخرى حتى انتقلت إلى القطر المصري . الحرير في مصر . كانت تربية دودة الحرير في مصر شائعة من زمان بعيد جداً يرجع إلى عهد قدماء المصريين ولكن العناية به لم تكن كبيرة وكانت الصعوبات التي تعترض نجاحه من أمراض أو غيرها من بين العوامل في اندحاره .

### تربيه دودة الحرير في اوروبا

ادخلت تربية دودة الحرير في اوروبا في القرن الثاني قبل الميلاد حيث كان ينسج الحرير في ذلك العهد ، ثم صارت تربية تنتقل في أنحاء اوروبا . فشلا في سنة ١٢٠ الى ١٣٠ ميلادية كان يربى هذا الدود في أعلى ايطاليا وفرنسا ، وفي سنة ١٣٠ ميلادية كان منتشرأً في مدن وبولونيا فلورنسا وافنيون ومنتبلية الخ . . . . .

وكانت أوفر السينين انتاجاً في فرنسا في عهد هنري الرابع سنة ١٥٩٩ لأن في هذا الحين استورد نحوأً من عشرين ألف شجرة من التوت لزرعها في فرنسا وجعلها

وقفاً لغذاء الدود، وفي زمن لا يتجاوز الأربعين سنة صار تعداد شجر التوت المنزوع في المناطق التي تربى فيها دود القز في فرنسا في ذلك المهد يزيد على أربعة ملايين من شجر التوت ، وازداد مقدار محصول الحرير زيادة مطردة حتى أتت الثورة الفرنسية ومنذ ذلك المهد صار المحصول يتناقص حتى قبيل سنة ١٨٩٤ وفيها ازداد المحصول بعض الزيادة ثم هبط ثانيةً ثم ابتدأ ينبعش تدريجياً إلى وقتها هذا . واليكم البيان موضحاً بالارقام الحقيقة ابتدأ من سنة ١٧٦٠ إلى ١٩٠٣ ميلادية .

من سنة الى سنة	كيلوجرامات	من سنة الى سنة	كيلوجرامات
١٧٨٠ - ١٧٦٠	٦٦٠٠٠٠٠	١٨٥٩ - ١٨٦٠	١٢٠٠٠٠٠
١٧٨٨ - ١٧٨٠	٦٢٠٠٠٠٠	١٨٦١ - ١٨٦٠	١١٥٠٠٠٠٠
١٨٠٠ - ١٧٨٩	٣٥٠٠٠٠٠	١٨٦٢ - ١٨٦١	٨٥٠٠٠٠٠
١٨٠٧ - ١٨٠١	٤٢٥٠٠٠٠	١٨٦٣ - ١٨٦٢	٩٧٠٠٠٠٠
١٨١٢ - ١٨٠٨	٥١٤٠٠٠٠	١٨٦٤ - ١٨٦٣	٥٥٠٠٠٠٠
١٨٢٠ - ١٨١٣	٥٢٠٠٠٠٠	١٨٦٥ - ١٨٦٤	٨٥٠٠٠٠٠
١٨٣٠ - ١٨٢١	٦٩٠٠٠٠٠	١٨٦٦ - ١٨٦٥	٥٥٠٠٠٠٠
١٨٤٠ - ١٨٣١	١٤٧٠٠٠٠٠	١٨٦٧ - ١٨٦٦	١٦٩٤٠٠٠٠
١٨٤٥ - ١٨٤١	١٧٥٠٠٠٠٠	١٨٦٨ - ١٨٦٧	١٤١٠٠٠٠
١٨٥٢ - ١٨٤٦	٢٤٢٥٠٠٠٠	١٨٦٩ - ١٨٦٨	١٠٦٠٠٠٠٠
١٨٥٣ - ١٨٥٢	٢٦٠٠٠٠٠٠	١٨٧٠ - ١٨٦٩	٨١٠٠٠٠٠
١٨٥٥ - ١٨٥٤	٢١٥٠٠٠٠٠	١٨٧١ - ١٨٧٠	١٠١٠٠٠٠٠
١٨٥٦ - ١٨٥٥	١٩٨٠٠٠٠٠	١٨٧٢ - ١٨٧١	١٠٣٢٠٠٠
١٨٥٧ - ١٨٥٦	٧٥٠٠٠٠٠	١٨٧٣ - ١٨٧٢	٤٨٧٠٠٠
١٨٥٨ - ١٨٥٧	٧٥٠٠٠٠٠	١٨٧٤ - ١٨٧٣	٨٣٦٠٠٠
١٨٥٩ - ١٨٥٨	١١٥٠٠٠٠٠	١٨٧٥ - ١٨٧٤	١١٠٧٥٠٠٠

من سنة الى سنة	كيلو جرامات	من سنة الى سنة	كيلو جرامات
١٨٧٦ - ١٨٧٥	١٠٧٧٠ و ٠٠٠	١٨٩١ - ١٨٩٠	٧٧٩٨ و ٤٢٣
١٨٧٧ - ١٨٧٦	٢٥٣٩٠ و ٠٠٠	١٨٩٢ - ١٨٩١	٦٨٣٣ و ٥٨٧
١٨٧٨ - ١٨٧٧	١١٤٠٠ و ٠٠٠	١٨٩٣ - ١٨٩٢	٧٦٨٠ و ١٦٩
١٨٧٩ - ١٨٧٨	٧٧٢٠ و ٠٠٠	١٨٩٤ - ١٨٩٣	٩٩٨٧ و ١١٠
١٨٨٠ - ١٨٧٩	٤٧٧٠ و ٠٠٠	١٨٩٥ - ١٨٩٤	١٠٥٤٤ و ٤١١
١٨٨١ - ١٨٨٠	٩٤٩٠ و ٠٠٠	١٨٩٦ - ١٨٩٥	٩٣٠٠ و ٧٢٧
١٨٨٢ - ١٨٨١	٩٢٥٥ و ٠٠٠	١٨٩٧ - ١٨٩٦	٩٣١٨ و ٧٦٥
١٨٨٣ - ١٨٨٢	٩٦٦٠ و ٠٠٠	١٨٩٨ - ١٨٩٧	٧٧٦٠ و ١٣٢
١٨٨٤ - ١٨٨٣	٧٦٦٠ و ٠٠٠	١٨٩٩ - ١٨٩٨	٦٨٩٣ و ٠٣٣
١٨٨٥ - ١٨٨٤	٦٢٥٦ و ٩٦٨	١٩٠٠ - ١٨٩٩	٣٩٩٣ و ٣٣٩
١٨٨٦ - ١٨٨٥	٦٦١٨ و ٠١٤	١٩٠١ - ١٩٠٠	٩١٨٠ و ٤٠٤
١٧٨٧ - ١٨٨٦	٨٢٦١ و ٥٣٧	١٩٠٢ - ١٩٠١	٨٤٥٠ و ٨٣٩
١٨٨٨ - ١٨٨٧	٨٩٨٠ و ٠٨٢	١٩٠٣ - ١٩٠٢	٧٢٨٧ و ٥٤١
١٨٨٩ - ١٨٨٨	٩٥٤٩ و ٩٠٦	١٩٠٤ - ١٩٠٣	٦٩٨٥ و ٤٨١
١٨٩٠ - ١٨٨٩	٧٤٠٩ و ٨٣٠		

وبعد هذا النار يخ تزايد المحصول زيادة كبيرة بهمة الاهالي وتشجيع الحكومة ومنح الجوائز المالية ، وكثرة محطات التجارب واقامة المعارض في كل اتجاه فرنسا، وانتشار الطرق الحديثة والاساليب ، ومدهم بكل ما في وسعها من المعلومات العلمية والعملية حتى بلغ مخصوصها الى قبل الحرب العظيم ... ر ٩٩٦ كيلو جرام، وصارت فرنسا هي الدولة الثانية في اوروبا بعد ايطاليا من حيث كمية محصول الحرير وجودة صنفه. ثم ضعفت في سنين الحرب بطبيعة الحال ثم ابتدأت في الزيادة بعد ما وضعت الحرب اوزارها ولا تزال محافظة على درجتها الى وقتنا هذا

### حياة دودة الفرز وأدوارها

تتألف حياة دودة الفرز من أربعة أدوار وهي :-

١ - الدور الأول . البيضة ( البذرة )

٢ - الدور الثاني . البرقة ( الدودة )

٣ - الدور الثالث . العذراء

٤ - الدور الرابع . الفراشة

### ﴿ الدور الاول ﴾

#### البيضة ( البذرة )

البيضة مستطيلة نوعاً طوّلها ميلمتران وعرضها ٨٠ من المليمتر، وهي مفاطحة قليلاً من الجانبين وأحد طرفيها مستدير نوعاً والآخر أقل استدارة وفي الطرف الآخر نقطة سوداء تفتح وقت التفقيح لتمر خلاها المادة المنوية إلى داخل البيضة بواسطة الانبوبة اللقاحية، ولون البيض حينما تضعه الفراشة يكون أصفر ثم يتغير لون الملحق منه بعد مضي ثلاثة أيام أو أربعة إلى لون رمادي ضارب إلى الزرقة إذا كانت شرائطه بيضاء، أو إلى رمادي ضارب إلى الحقرة إن كانت شرائطه صفراء.

أما البيض غير الملحق فيكون لونه أصفر فاتحًا لا يتغير، وبطبيعة الحال لا يكون فيه الجنين. ويجب وضع البيض الملحق في علب مصنوعة من الورق المقوى (كرتون) مشقوبة من أعلى وأسفل عدة ثقوب ليتحمّلها الهواء إذ يحتاج البيض في الأيام الأولى لمقدار عظيم من الهواء ثم تقل الحاجة إلى الهواء تدريجياً حتى إذا ما حل الشهر التاسع ازدادت شدة الحاجة إلى الهواء إلى أن يوضع البيض في صناديق الفقس كاسيات الكلام عليه


### نَسْرَجُ الْبُوِيْضَةِ

ان بوبيضة دودة القرز تتألف من قشر يابس داخله مادة شبهاً بـ مائية وهذا القشر عبارة عن غشاء شفاف رقيق ذو مسام كثيرة ترى تحت (المicroscope) وكلها عبارة عن مجاري هواء للتنفس ويرى أن باحدى طرق البوبيضة من الجهة المفلطحة قليلاً انخفاضاً خفيفاً وهو

إشارة لوجود ثقب تمر منه المادة المنوية كما سبق الكلام عليه فعند عملية التلقيم تدخل مادة التلقيم بداخل البوبيضة من هذا الثقب وعند خروج البوبيضة من جسم الفراشة يسد ذلك الثقب المسمى بالميكروبيل ولكن يبقى أثره ظاهراً للعيان ويبيّن كذلك حتى وقت تفريح البذر فتخرج منه الدودة بعد ثقبه كافية الجزء ٤

من رسم رقم ١٢


والبذور أو البوبيضات عند خروجها من الفراشة تكون مطلية ومغطاة بطبقة من المائع اللازم كالصمع ولذلك تراه يتتصق حينما يسقط ، وهذه المادة تذاب بالماء ولذلك لا ضرر مطلقاً اذا غسلت البذور بالماء نظيف ، ويلاصقها من الداخل غشاء رقيق يسمى غشاء الفتلين وهو يضم المادة المائعة السابقة ذكرها ، وهذه المادة المائعة المسماة



رسم رقم (١١)

(فيتالوس) مكونة من عدة كرويات عائمة ضمن مائع زلالي هذه المواد المائعة يتغذى منها الجنين طول مدة وجوده داخل البويبة.

ويشاهد داخل هذا المائع الجنين وهو على شكل شريط ذو حلقات يبلغ عددها ١٧ حلقة كافية لجزء (١) من رسم رقم ١٢ هذا يستمر بأخذ غذاء من هذا المائع (الفيتالوس) حتى يكمل الجنين ويصير تاماً التكوين وفي هذه الحالة يتغير لون البويبة.



رسم رقم (١٢)

تكوين الجنين من الابتداء حتى نزوله من البويبة

إذا أردنا معرفة تركيب بويبة الدودة وما تحتويه كما لو أن تركيبها مشابهاً جداً لتركيب القمع وعند فحص ١٠٠ جرام منه يحتوى على التركيب وبالنسبة الآتية:-

حامض الفوسفور ٥٣ غرام

بوتاسيوم ٢٩٥ «

مانانيزيا ١٠٣ «

كلاسيك ٦٩٤ «

١٠٠

ملحوظة - اذا أخذت كمية صغيرة من بويضات دودة الفرز وسحقتها ثم اختبرتها ميكروسكوبياً رجاءً احياناً عدا الأقسام السالفة الذكر بعض أجسام بيفية الشكل شفافة ليست من المواد الداخلية في تركيب البويبة في الأصل وإنما هي عبارة عن مكروب المرض المسمى (بيرين) كما سيأتي الكلام عنه فيما بعد

### تأثير الهواء على البويات

سبق أن شرحنا أن البويبة تحتوى على قشرة يابسة ذو مسام كثيرة (ترى عند اختبارها بالميكروسكوب) يدخل الهواء منها بإجراء عملية التنفس، وبواسطة دخول الهواء بالتنفس بالطريقة الفسيولوجية يتناقص أوزان البذور تدريجياً من وقت تكونه إلى حين تفريجه . فالمالية غرام من البويات تتناقص وتزداد بالنسبة الآتية :-

في الشهر الأول      ٢ غرام

في الشهر الثاني      ١ «

في الستة أشهر بعدها      ١ «


قرب التفريج       $\left. \begin{matrix} \text{في الشهر العاشر أى} \\ ٩ \end{matrix} \right\}$

١٣

ويجب ألا يبدأ بعملية التفريج حتى تكون أوراق التوت قد بلغت من الحجم نمواً من ثلاثة سنتيمترات مربعة وتكون أذاك مناسبة لتغذية الديدان .

ويوضع البيض بعد ذلك في صناديق خاصة تعمل لهذا الغرض تصنع كا يأتي :

### صندوق الفقس



( دسم رقم ( ١٣ ) ) ( ١ )

هذا الصندوق يصنع من الزنك الایض وتكون قاعدته وسقفه وجوانبه مزدوجة  
كي يوضع بين هذه الجدر المزدوجة ما يمكن تسخينه الى درجة الحرارة المطلوبة ، وفي  
أحد جوانبه باب يفتح ويغلق وفي جانبي من جوانبه توجد ستة ثقوب صغيرة  
منتظمة . وأما السقف في يوجد فيه فتحتان يوضع في احداهما الترمومتر وهي واقعة في  
وسط السقف ، أما الأخرى فواقعة في احدى زوايا السقف لصب المياه من خلالها  
كي يلاً الفراغ الموجود في الجدر والقاعدة . ويوجد داخل الصندوق رفان او أكثر  
تبعاً لحجم الصندوق توضع عليها العلب المشتملة على بويصلات دودة القز المراد

تفريغها . وهذا الصندوق مربع الشكل طول احد ابعاده ٣٥ سنتيمتراً ومحول على أربعة قوائم طولها ما بين عشرين وخمسة وعشرين سنتيمتراً .

ويوجد تحت الصندوق مصباح صغير يوقد بالبترول أو البنزين أو الزيت والماء (أى قنديل به فتيلة من الشمع توجد على سطح سائل - ثلثي ماء والثلث الباقى زيتاً) ويفضل عادة المصباح الذى يوقد بالبنزين أو القنديل المقدم ذكره - ولا ريب انه من المستطاع ضبط درجة الحرارة برفع شريط المصباح أو خفضه وبزيادة أو نقص عدد فتائل القنديل ، ويجب أن يلاحظ ألا تتجاوز المسافة بين هبيب المصباح وبين قاعدة الصندوق سنتيمترتين بأى حال ويراعى ألا يحدث هذا السراج عند انارته سناجاً (هباباً) لأنه ضار بالفقس .

وهذا الصندوق الذى أتينا على وصفه هو المستعمل كثيراً في فرنسا . ولا ريب أن هناك عدة أنواع أخرى من الصناديق متباعدة في أشكالها مختلفة في أحاطتها، ولكن أنسابها هو الذي وصفناه . والصندوق السالف الذكر يسع ثمانية علب أى مائتا جرام من بويلصات دود الفرز .

### معيار التفريغ

سبق أن ذكرنا أن أحسن وقت لعملية التفريغ حينما يبلغ حجم ورق التوت نحو ثلاثة سنتيمترات - وهناك عدة طرق للتفريج غير أنها للأسف ضارة للجذين وتؤدي تلفاً لجزء عظيم من البيض .

فنحن بين الذين يربون الدود في مصر وخصوصاً في مديرية المنوفية من يضع البيض بمجرد ظهور بعض المتفرج تحت ابطه داخل كيس صغير يسع بضعة دراهم ويستمر على هذه الحالة حتى يفرخ البيض الموجود كله أو بعده، ثم يبدأ بعد ذلك في تغذيته إلى النهاية . وأنى قد حارت هذه الطريقة حتى أصبح المربى لا يستعملها بعد ذلك ضرر استعمال هذه الطريقة - من المعلوم ان حرارة جسم الانسان لا تقل عن

---

٣٦ سنتيمترات في حين أن درجة الحرارة المطلوبة لعملية التفريغ يجب ألا تتجاوز درجة ٢٣ سنتيمترات، فهناك اذاً فرقاً عظيم في درجة الحرارة حيث تحدث بلا ريب ضرراً بليغاً للفقس

على أنه من الواجب أن ترفع درجة حرارة الصندوق تدريجياً . أما بثيل هذه الطريقة فإن البعض سيصبح في درجة حرارة مرتفعة دفعة واحدة ، وأيضاً فقد لا يمكن باستعمال هذه الطريقة معرفة ما أفرخ في وقت واحد حتى يمكن عزل كل اليرقات التي تكون من عمر واحد

كل هذا مما يحدث ضرراً عظيماً للجذين سواء كان داخل البعض أو في حالة خروجه منها .

الطريقة الثانية - يوضع البعض من البوopies في غرفة صغيرة تعرف عند الفلاحين بالقاعة وبهذه الغرفة فرن للخبز وقد تبلغ درجة حرارتها ٣٨ و ٣٩ سنتيجراد ، ثم لا تثبت وقتاً طويلاً على هذه الحالة بل تهبط درجة الحرارة تدريجياً حتى تصل ٣٤ أو ٣٥ سنتيجراد فيعودون إلى نقل هذه البوopies إلى داخل هذا المكان الذي تكون قد هبطت درجة حرارته إلى ٢٥ سنتيجراد . فكل هذه التقلبات والتغيرات العنيفة في درجة الحرارة لا يتحملها الجنين سواء كان داخل البيضة أم خارجها .

وبثيل هذه الطريقة يصاب جانب عظيم من البعض بالتلف ثم لا يعلمون السر في هذا النقص مع أنه من عمل أيديهم

أما طريقة استعمال صندوق التفريغ سالف الذكر فهي خير الطرق وأفيدها وأحسنها نظاماً وضماناً لحياة الجنين . ويجهز صندوق القدس بملئه بالماء وإيقاد السراج تحته حتى ترتفع الحرارة داخل الصندوق إلى أن تصل إلى درجة حرارة الغرفة لتكون مثلاً ١٧ سنتيجراد ، فتوضع علب البذور عارية من غطائهما داخل الصندوق ثم يقفل وتنظم الحرارة بحيث ترتفع نصف درجة أو درجة كل يوم حتى تصل إلى ٢٢ سنتيجراد ويمكن في الأيام الأخيرة زيادة درجة الحرارة إلى ٢٣ سنتيجراد حتى تفرخ الديدان .

ويراعى في هذه العملية بنوع خاص النقط الآتية :

- أولاً - لا تزيد الحرارة يومياً أكثر من درجة واحدة بحال ما
- ثانياً - لا تزيد الحرارة عن ٢٣ سنتيجراد في الأيام الأخيرة

- ثالثاً - لا تختنق درجة الحرارة مطلقاً في يوم ما عما كانت عليه في اليوم السابق، فإذا كانت الحرارة مثلاً في يوم من الأيام ١٩° سنتيجراد فيجب ألا تكون في اليوم التالي ١٨° سنتيجراد أو ١٨٥° سنتيجراد
- رابعاً - يجب من وقت لآخر أن تزداد المياه الموجودة في الفراغ الواقع في جوانب الصندوق خامساً - يجب تقليب البويلات وذلك بهز العلب هزاً خفيفاً من وقت لآخر حتى ظهور الأفراخ.
- سادساً - يجب ألا يكون البيض داخل العلبة متراكماً مكدساً بعضه فوق بعض بل يجب تفريده بريشة دجاجة

### الطور الثاني من حياة دودة القر

التفرنج ( ظهور اليرقة ) ( انظر شكل ١٢ في الجزء ٤ )

عند ابتداء ظهور الفقس يجب في الحال وضع قطع من التل ( نوع خرم من القماش ) فوق علب البويلات ويقطع ورق التوت الى قطع كبيرة وتوضع فوق هذا التل الموضوع على علب البويلات، فإذا ما شمت الميدان الصغيرة رائحة ورق التوت اتجهت اليه باحثة عن غذائها فتصعد اليها من ثقوب التل حتى اذا اجتمع جانب من الميدان على هذه الاوراق التي على التل في أول يوم اخذت بكل رفق ووضعت على أطباق صغيرة تكون مفروشة بورق نظيف . وما اتبع في اليوم الأول يتبع في اليوم الثاني والثالث ، أما ما يبقى من البيض بدون فقس بعد هذا التاريخ فيترك، وبديهي أن الميدان ( اليرقات ) المتولدة في هذه الأيام الثلاثة تكون مختلفة الاعمار ، ومن الحتم على المربي أن يجعل ديدان كل طبق من عمر واحد للأسباب الآتية :

- أولاً - لتكون عملية توزيع الغذاء منظمة ودقيقة
- ثانياً - لتكون صوماتها منتظمة أى في وقت واحد
- ثالثاً - لتكون تغذيتها بعد الصوم في وقت واحد

رابعاً - ليكون صعودها لعزل خيطانها في موعد واحد ولذلك يجب مساواة الديدان في الاعمار بطريقة توصلنا الى هذه النتائج وهذا يلزم اتباع ما يأتي :

اولاً - توضع الديدان التي تظهر في أول يوم في طبق التربة في الدور السفلي والتي تظهر في اليوم الثاني في الدور الثاني والتي تظهر في اليوم الثالث في الدور الثالث. والسبب في ذلك أن درجة الحرارة في الدور العلوي أى الثالث تكون مرتفعة عما هي عليه في الدور الثاني ودرجة الحرارة في الدور الثاني مرتفعة عما هي عليه في الدور الأول ، ومن المعلوم أن زيادة الحرارة تزيد في شهية الطعام وبذلك تزداد شهية الديدان التي في الطابق الثالث عن شهية الديدان التي في الطابق الثاني والثالث .

### توزيع الاعداد

يجب أن تكون عدد الاعدادات التي تعطى للديدان الموجودة في الطابق الثالث أكثر من الاعدادات التي تعطى للديدان الموجودة في الطابق الثاني ، والتي في الثاني تعطى اعدادات أكثر من الموجودة في الطابق الأول ويلك اليك البيان :

هذا الجدول يبين اعدادات ستة ايام في نهايتها تتساوى الديدان كأنها من عمر واحد

دفعتات الفقس	المساحة اللازمة	أول يوم	ثاني يوم	ثالث يوم	رابع يوم	خامس يوم	سادس يوم	عدد الاعدادات في ستة ايام
دفعه أول يوم	٣٠ سنتيمتر	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٢٤
« ثانى »	٦٠ سنتيمتر	—	٤	٥	٥	٥	٥	٢٤
« ثالث »	٩٠ سنتيمتر	—	—	٦	٦	٦	٦	٢٤

ويقدم الغذاء للديدان حسب البيانات المدونة بالجدول سالف الذكر حتى يتم عمرها الاول الذي يستغرق ٦ أيام تقريباً من يوم الفقس الى أول دور من صومها ثم تنقل الديدان بعد ذلك الى محلات أوسع ، وفي اثناء هذه الايام تتغذى بورق توت مفروم فرما متواسطاً وينشر على جميع الاطباق حتى يسهل على كل دودة أن تتناول

غذاءها منه، وينبع ذلك في اليوم الأول والثاني من حياتها، أما بعد ذلك فتعطى أكلة من ورق مفروم وأخرى من ورق مقطع إلى نهاية العمر الثالث وبعد هذا تعطى الديدان الورق بأكمله أربع مرات في كل أربع وعشرين ساعة وتزداد إلى ست أكلات وذلك تبعاً لتقدير الدود في النمو واليكم بيان وزن ورق التوت اللازم لعلبة من الدود في كل دورة من حياتها ابتداءً من اليوم الذي تأكل فيه إلى وقت صعودها لغزل خيطانها، وكذلك المساحات الازمة لها

المساحة الازمة	المدد	وزن ورق التوت اللازم	الدور
٥ متر مربعاً المساحة	من ابتداء الفقس الى الصومة الأولى	٣ كيلو وزن	الدور الاول
١٠ متراً مربعاً العمر الثاني	من ابتداء الصومة الأولى الى الثانية	» ٩ »	» الثاني
٢٠ متراً مربعاً العمر الثالث	من ابتداء الصومة الثانية الى الثالثة	» ٣٠ »	» الثالث
٤٠ متراً مربعاً العمر الرابع	من ابتداء الصومة الثالثة الى الرابعة	» ٩٠ »	» الرابع
٦٠ متراً مربعاً في وسط العمر الخامس	من ابتداء الصومة الرابعة الى وقت الصعود	» ٥٧٠ »	» الخامس

أوصافها : الدودة عند خروجها من البيوضة لا تزيد عن ثلاثة مليمترات طولاً ونصف مليجرام وزناً ، وتكون رأسها سوداء اللون شفاف وفيها أبيض وعلى ظهرها وجوانبها قليل من الشعر الصلب نوعاً يشبه الشوك، وكلما تقدمت في العمر يزول شيئاً فشيئاً ، وجسمها ينحو يوماً عن يوم وتفقد شهيتها للأكل بل تمتنع كلية بعد أربعة أو خمسة أيام حسب درجة حرارة المخل فترتفع رأسها وتبقى ساكنة بلا حركة كأنها نائمة، حتى اذا سلخت جلدتها استيقظت وجاءها النشاط واستأنفت الأكل وهو الدور الأول من حياتها الذي يتراوح ما بين ٥ و ٦ أيام .

وعندما تخرج من صومتها الأولى يلاحظ أن رأسها كبيرة وقل "الشعر الذي كان على جسمها وتكثُر شهيتها للأكل حتى يأتي ميعاد الصومة الثانية فتقل شهيتها ثم تقطع عن الأكل فتدخل في الصومة الثانية وتبقى ساكنة بلا حركة كلمرة الأولى حتى اذا سلخت جلدتها استيقظت واستعادت نشاطها وذلك بعد سلخ جلدتها . ومن

الدور الثاني الذي يستمر من ٤ - ٥ أيام وبعد الصومة الثانية يتدلى الدور الثالث ويُكثَّ ما بين ٦ - ٧ أيام حتى إذا انقضت الصومة الثالثة دخلت في الدور الرابع ويُكثَّ نحو ٧ - ٨ أيام حتى انتهاء الصومة الرابعة ثم يدخل في الدور الخامس فيدوم من ١٠ - ١٦ يوماً حسب درجة الحرارة حتى تتدلى الدودة في غزل شرقيها وتحبس نفسها بداخلها

ملحوظة - يبلغ طول جسم الدودة في آخر عمرها من ٨ - ٩ سنتيمترات طولاً ومن ٤ إلى ٥ جرامات وزناً أى تكون أكبر من وقت خروجها من البوية بقدر ٨ أو تسعة آلاف مرة وزناً كافياً في رسم (١٣ ب)

كيفية إنسلاخ الدودة - عملية إنسلاخ الدودة أي نزع جلدتها ، عملية طبيعية جداً ولا بد منها ما دامت الجلدمة التي ستزعم غير نامية ولا تتسع مع جسم الدودة كما تقدمت في العمر حتى إذا كبرت بدرجة يضيق عليها ذلك الجلد تصبح مضطربة بحكم

الضرورة للتعرى منه، ولذلك

تجد الدودة تتنعم عن الأكل

ويبدأ توريم جسمها إلى أن



ينشق هذا الجلد من وراء عاتقها وتخرج منه رأسها في

الاول ثم تنسج عليه قليلاً

من خيطانها الحريرية من

وجه بطنها لزيادة ثباته على أوراق التوت الجافة المختلفة من غذائهما ثم تزحف بجسمها

إلى الإمام قليلاً قليلاً من وقت لآخر حتى تتخلص منه تماماً.


الاعضاء الخارجية للدودة الفرز - إذا تحققت تماماً الدودة تامة العمر ترى جسمها

مؤلفاً من ١٣ حلقة ماء العادا الرأس والذنب ، وعلى جانبي كل من الحلقات الصدرية

الثلاثة يوجد أربع ذوات أظافر حادة وذلك للقبض على ورقة التوت، ثم تجد أربعها


الغير حقيقة الموجودة على جانبيها في أربعة حلقات ( من السادسة إلى التاسعة ) على

أسراء أصوات المروءة الخامسة



(一四)


شكل في الثدي ذو أظافر صغيرة لثبت نفسها بواسطة هذه الأرجل أيها حلت، ثم ترى على كل جانب من جانبي الدودة تسع ثقوب ووظيفة هذه الثقوب هي عملية التنفس وتسمى (بالاستجمانات) مغطاة بقشر رقيق اسود اللون وهي عبارة عن أفواه مجازي، وعلى الحافة الخادية عشرة عضو صغير على شكل قرن ويسمى (هيماوز) وعلى كل من الحلقة الخامسة والثامنة يقعان كالملاجئ يزول كل منها مع جلد الدودة وقت تغيير جلدها . انظر رسم ( ١٣ ج )



رسم ( ١٤ )  
تشرح الرأس وأسماء أجزائه

الرأس - تتألف رأس الدودة من أعضاء كثيرة أكبرها الجمجمة وعلى جانبيها توجد ستة أعين للبصر ، وفي مقدمة الرأس توجد الاسنان والفكان والشفتان والزانة

الشفوية وقرن الاستشعار والفك العلوي والفك السفلي والزايدة الفكية والمغزل الذي بالشفة السفلية والجزء الجبهى كا هو موضح برسم تشرح الرأس .



( رسم ١٥ )

### تشرح الدودة

- ١ — ا شريان أو مجرى الدم
- ب — ب الجهاز الهضمى
- ج — الفخد الحريرية (خزن الحرير)
- د — الفخد العصبية
- ن — أنابيب البول
- ه — أعضاء التناسل
- و — الغدتان العبيتان

الاعضاء الداخلية المهمة للدودة— ان أهم الاعضاء الداخلية للدودة الفرز والذى يهمنا

هو الجهاز الغذائي أو الهضمى كرسم ١٥ من ب الى ب وهو الذى يمتد من فها حتى  
منتهاها بشكل قناة مستقيمة، فالقسم الأول من هذه القناة (رسم ١٥) هو المجرى وعلى  
جانبى هذا المجرى غدتان وهاتان الغدتان تفرزان الطعام ، والثانى (المعدة) وبطبيعة  
الحال تكون أكبر اعضاء الدودة

وهذه المعدة تفرز عصارة قلوية لتساعد على عملية الهضم وكل ما تأكله هذه  
الدودة من ورق التوت

والجزء الثالث هو عبارة عن الامعاء التى تراها متدة من نهاية المعدة الى مؤخر  
الدودة وتتألف من ( الاعور وأنابيب البول ) ، ويحيط بجميع هذه الاحداث خارجاً  
غشاء رقيق يجري بين طياته مائع وهو ( الدم ) الذى يحول مع تقلص العضلات  
أما الدورات الحقيقية فتحصل في قناة طويلة تتدلى بظاهر الدودة تحت الجلد وهى منها  
بثابة القلب، ويمكن رؤية التموجات التي تحدث من ضربات نبضها كا انه يمكن عدها

حيث تكون من ٤٥ - ٥٥ دقيقة ، هذا اذا كانت محلات الترية مهواة وبها النواذ الكافية وصحبة الدودة جيدة . وعند ما يمر الدم بقصبات الهواء في مجاري التنفس يأخذ منها الاوكسوجين ويعود منها نقىًّا .

أما الغدتان الحريريتان فتوجد تحت المعدة كا هو مبين بالرسم في تشريح الدودة، وتكون كلا من الغدتين الحريريتين من ثلاثة أجزاء :

١ - الاسفل هو عبارة عن مجرى طوليه يبلغ طولها من ١٤ - ١٦ سنتيمتراً وقطرها مليمتراً واحداً وهذا الجزء يتكون به الحرير في حالة ميعان .

٢ - يبلغ طوله من ٧ الى ٨ سنتيمتراً وقطره ثلاثة سنتيمترات وهو اسمك من الأول وهذا الجزء يفرز ادة ( طلاء ) بيضاء أو صفراء حسب جنس الدودة وبذلك يصبح خيطان الحرير بأحدى اللوين ، ولذلك تجد لون الحرير الطبيعي أما ايض أو أصفر ( ذهبي )

٣ - والقسم الثالث هو عبارة عن مجرى رفيعة طولها من ٤ - ٥ سنتيمترات وقطرها أقل من نصف مليمتر وكلما اقتربت هذه المجرى من فم الدودة يضيق ويرفع ، وعند خروج الحرير من الغدتين الحريريتين يوجد غدتان صغيرتان تفرزان مادة صبغية تطلى خيطي الحرير فتلتصقهما بعضهما ليخرجان من فم الدودة ( في حالة سائلة ) وب مجرد خروج هذه المادة الحريرية المطلالة وتعرضها للهواء تجمد وتصير خيطاً واحداً ولكن تتحقق من أن الخيط الذى تراه يخرج من فم الدودة بأنه خطيتين متلتصقين فأت جاء حار جداً لدرجة الغليان والتى فيها قطعة خيط من خيطان الدودة تجد أن هذا الخيط انفك كل خيط على حدة ، كما وأنك اذا أردت أن تزيل اللون الأصفر من الحرير المستخرج من الدودة فأت جاء مغلى مع صابون وضع هذه الخيطان الأصفر اللون أو الإيض في هذا محلول نحو نصف ساعة وهو في حالة الغليان تجد أن الطلاء قد زال ويعود حريراً خالصاً شفافاً ساطعاً اللون وفي هذه الحالة يسمى ( فيبروين ) .

ملحوظة - الحرير سواء كان لونه أبيض أو أصفر فان بووضعه في محلول الصابون المغلى تزال المادة الصبغية واللون الطبيعي وبصير لونه أيضاً ساطعاً ناعماً الممس



رسم (١٦) أماكن التربية

### أماكن التربية وأدواتها


#### حجرة التربية

يجب أن تكون حجرة التربية فسيحة رحبية وبها نوافذ كافية لتجديد الهواء اللازم ودخول النور أو منعهما حسب الاحتياج، ويكون سقفها مرتفعاً ارتفاعاً كافياً، ويجب أن تكون نظيفة نظافة تامة وأن ترش أرضيتها بكية من النشراء المبتلة قبل الالتساح حتى لا يتتساع الغبار في جو الحجرة، ويستحسن أن تكون الأرضية خشبية أو مبلطة. أما المساحة اللازمة للتربية ٢٥ جرام من البذرة (أى علبه) فيلزم أن تكون من ٥٠ إلى ٦٠ متراً مربعاً (حسب جدول نورة ٢)

### الأدوات المطلوبة لحجرة التربية

يوجد أشكال وأنفاق كثيرة للأدوات المعدة للتربية دود القز غير أن أحسنها وأحدثها وأدقها هي الآتية : كرسم ١٦

- ١ - رفوف من الخشب والسلك ويفضل الأخير ويستحسن أن يكون طوله متراً ونصف متر وعرضه ٨٠ سنتيمتراً
- ٢ - حالات للرفوف التي يلزم أن يبعد أحدها عن الآخر ٥ سنتيمتراً إذا كان الدود يتغذى بالورق بغير عيدان أو ٨٠ سنتيمتراً إذا كان الدود يتغذى على الورق بعيدانه .
- ٣ - منضدة ( تراييز ) لوقت تغيير الورق الجاف الذي تركه الديدان ويسمى عند الشوام بالجزء ويسميه بعضهم بالفرشه
- ٤ - سلم من الخشب على نسق خاص .
- ٥ - مفرمة للورق . كرسم ١٧



رسم ( ١٧ ) — آلة افرم ورق التوت

- ٦ - سلال لوضع ورق التوت فيه عند التوزيع وقت الغذا ، كما هو مبين بالرسم السابق
- ٧ - مقياس للحرارة « ترمومتر » لكل حجرة ولوحة لرصد الحرارة عليها .
- ٨ - صناديق فارغة لوضع مخلفات دودة القز « الجزء » وهذا يكون غالباً في المدن أما في القرى فمن السهل وضع المخلفات في غير الصناديق .

- ٩ - أفران ( دفایات ) لتدفئة حجر التربة وقت الالزوم .  
 ١٠ - أوراق مثقوبة ثقوبًا مستديرة بعضها متسع الثقوب وبعضها متوسط والآخر أضيق لاستعمال في تنظيف الفرشة حسب أعمار الدودة .

هذا وبعد توزيع الديدان على الرفوف في حجرة التغذية لا بد أن يلاحظ مسألة توسيع المساحة التي تحتاجها إثناء نموها كما هو مبين بالجدول رقم ٢ ومن الواجب أن تكون الديدان غير متراكمة بعضها فوق بعض بل لا بد أن يكون هناك اتساع كاف لها منعًا من حدوث الامراض التي تنجم من تراكم الديدان بعضها فوق بعض فتنتشر هذه الامراض بينها وعند ما تصوم الدودة يجب أن يمنع عنهم الغذاء وهناك علامات يمكن بها معرفة ما إذا كانت الديدان قد اقترب وقت صيامها أو هي صائمة فعلاً أو هي أفطرت .

### **علامات اقتراب وقت صيامها**

من علامات قرب صيامها : -

- ١ - امتناعها عن الأكل
- ٢ - رفعها رأسها مع دورانها ذات اليمين وذات اليسار كأنها تبحث عن شيء .
- ٣ - أن تخرج من فمها بعض خيوط حريرية لثبت بها نفسها ولتساعدها على التخلص من جلدتها القديم .
- ٤ - أن يوجد على رأسها شكل الرقم ٨ تقريرياً ويكون لون هذه العلامة أدقن

### **علامات صيامها بالفعل**

من علامات صيامها بالفعل : -

- ١ - امتناعها عن الغذاء كلية .
- ٢ - عدم تحركها مطلقاً .

- ٣ - وجود العلامة ٨ على رأسها .
- ٤ - يكون جلد جسمها شفافاً تقريباً .

### علامات افطارها بالفعل

من علامات الافطار أو اليقظة : -

- ١ - نزعها جلدتها القديم واستبدلها بجلد جديد أوسع من الاول حتى تستطيع النمو فيه .

٢ - زوال العلامة ٨ الآنفة الذكر .

وبعد نزع جلدتها تكث مدة قليلة تستغرق ساعات تستريح فيها وتسعید قواها مما قاسته من العناء في الصيام والانسلاخ ثم تشرع في التغذی بشراهة عظيمة ومن ثم تنمو وينتفخ جلدتها لامتلائه بالمواد الغذائية حتى اذا ما حان ميعاد انسلاختها الثاني والثالث والرابع تكون حافظة لقوها تماماً وبعد انسلاختها في المرات الاربع تغذى بشراهة كما يتضح ذلك (في الجدول السالف رقم ٢) .

ومن العلامات التي تدل على ان الديدان جيدة وخالية من الامراض عند كل افطارة او بعد خروجها من الصومة هي :

١ - اذا نفخت الديدان بفمك نفخاً اطيفاً تجدتها تحرکت كلها لأن كل دودة تشعر بهذا النفخ تتوهج قليلاً .

٢ - انها « الديدان » بعد خروجها من الصومه تأخذ حيزاً اكبر من ذى قبل

٣ - ان الديدان تكون جميعها في حجم واحد في الطول والضخامة . كالرسم

شكل ١٨


٤ - ان الديدان لا تترك الأطباق ولا تصعد على جدرانها بل تبقى دائمًا في داخلها

٥ - لا يوجد عند تغير الجزء « الفرشة » ديدان ضعيفة ولا ميتة .

وعند ما يكمل نموها بعد الصومه الرابعة تتأهب لنسيج الحرير فتقل شهيتها وتقتنع عن الغذاء فيصبح لونها شفافاً تقريباً وترفع رأسها وتحركها يميناً وشمالاً كأنها تبحث عن شيء ثم تصعد على الأفرع « العشش »



رسم ( ١٨ ) — الديدان وهي متساوية العمر وحيدة



رسم ( ١٩ ) — كيفية عمل التعشيش ومنظر الشرانق بعد اختفاء الدودة بداخلها  
مأخوذة من محل تربية الخواجہ تراسیل فتحا المهندس الزراعي بالمنصورة والذي أصبح بفضل  
جهود فرع الحرر بوزارة الزراعة المصرية من كبار المربين وينتظر له مستقبل زاهر في هذا  
المشروع في القطر المصري على أنظم الطرق الحدیدة

### نظيف الفرشة (الجزء)

يجب على المربى أن يعتنى بتنظيف الفرشة حسب الجدول الخاص بذلك في آخر الكتاب .

### كيفية التنظيف

يضع المربى ( فوق الدود ) ورقاً مثقوباً بثقوب حسب عمر الدودة في أعمارها الأولى توضع أوراق ضيقة الثقوب وفي أعمارها الوسطى توضع أوراق متوسطة الثقوب وفي أعمارها الأخيرة توضع عليها أوراق متسعه الثقوب حسب حجم الدود ثم توضع على هذه الأوراق غذاء جديد فيخرج الدود من الثقوب طلباً للغذاء حتى اذا تجمع فوق الورق المثقوب بعد أن يترك الفرشة يحمله المربى ويضعه اما على صينية أخرى واما على المنضدة الموجودة بمحجرة التربية ثم ينظف هذه الصينية من أوراق التوت المختلفة ومن براز الدود ثم يعيد الديدان اليها وهكذا لأن النظافة من الفضوليات لنجاح عملية التربية ومن وقاية الدود من الأمراض .

### كيفية عمل العسسه

تعمل العشش من فروع الصفاصاف أو الاتل أو الجوزرينه أو عراجين البلح مثلاً ووضعها بين الأطباق على حافتها أو في وسطها بحيث تكون هذه الأفرع متقابلة ومشتبكة على شكل قنطر أو شكل ٨ فتسلقها اليرقات وتنسج شرائطها وتستمر على اخراج الحرير مدة أربعة أيام تقريباً وبعد ذلك تحول الدودة الى عذراء داخل نسيجها كالرسم نمرة ( ١٩ ) وبذلك يبتدئ تطورها الثالث .

### امدادات ضرورية يجب اتباعها أثناء التربية

١ - يجب أن تكون درجة حرارة غرف التربية منتظمة بقدر ما يمكن فلا تقل درجة جرارتها عن الأيام السالفة . ( ٢٣ - ٢٢ سنتigrad )

- ٣ - وان تكون زيادة درجة الحرارة تدريجية
- ٤ - الاعتناء التام بنظافة الصواني «الاطباق» وعدم ترك الأوراق الجافة والبراز متراكمة تحت الديдан وخصوصاً في المدة الأخيرة حيث يجب تنظيف الصواني حسب الجدول الخاص بذلك في اخر الكتاب .
- ٥ - يجب ألا تمس اليرقات باليدي في أثناء التغذية أو وقت دخوها في الصيام أو في حالة صيامها أو عند صعودها لعمل نسيجها .
- ٦ - يجب توزيع الغذاء للديدان في مواعيد منتظمة وأن توزع الأوراق بالتساوي في الصينية .
- ٧ - ألا تكون أوراق التوت مبللة بالندى أو المطر أو الرطوبة وألا تكون ساخنة من الشمس أثناء توزيعها للديدان بل تجفف من البال أو تحفظ في أماكن مخصوصة تسمى «مخازن ورق التوت» حتى تنخفض درجة حرارتها لأن كلامها يسبب أمراضًا للديدان الناشئة من التخمر داخل الدودة
- ٨ - أن تكون اليرقات الموجودة في كل طبق (صينية) متساوية في الحجم وفي الأعمار وفي الصومات والانسلاخات حتى تبتدئ في التشرنق كلها في وقت واحد على قدر الامكان . ولذلك يلزم عزل الديدان التي يلاحظ أنها غير متساوية مع بقية اليرقات .
- ٩ - أن تكون درجة حرارة غرفة التربية مرتفعة (٢٣° سنطigrad) عند ابتداء التشرنق وتستمر كذلك إلى أن يتم صنع الشرتقة (منظارها) كالرسم نمرة (الشرتقة) ١٩

## جمع المحصول

بعد أن تم الشرقة (أى بعد عشرة أيام تقريباً من تاريخ صعود اليرقه لغزل) يبدأ في جمع الشرائق وذلك بانتزاع الشرقة من الاماكن الملتصقة بها على الأفرع أو غيرها ثم تنظف مما علق بها من النسيج الخارجى وتوضع في سلالات كبيرة أو ما شاكلها ولكن السلالات أفضل من غيرها.

### وصف آلة تنظيف الشرائق وكيفية استعمالها

وصف آلة تنظيف الشرائق وكيفية استعمالها : هذه الآلة عبارة عن صندوق مستطيل الشكل ذو ثلاثة جوانب أحدها مرتفع بمقدار ٤٥ سنتيمتر أما الجانبان




رسم (٢٠) آلة تنظيف الشرائق

الآخران فيما منحدرا الارتفاع وعلوهما يتدلى من جهة الجانب الأول المرتفع ٤٥

ستيمتر وينتهي بارتفاع ٥ سنتيمتر على طول متر أما القاعدة المثبتة عليها هذه الجوانب فيبلغ طولها ٢٠١ متر وعرضها يبلغ نحو ٧٠ سنتيمتر ويثبت على سطح هذه القاعدة في ثلثة الأخير من نهايته أربعة عمدان من الحديد ممتد بعرض القاعدة وهي مملوقة بأستان صغيرة مدينة وكل عود يبعد عن الآخر بحوالي ٥ سنتيمتر وتدور العidan حول نفسها بواسطة عجلة ( تارة ) تدار بجانب هذا الصندوق المرتفع عن الأرض من الامام بقدار ٨٠ سنتيمتر وهي ( الجهة التي توضع فيها الشرانق ) ومن الثانية ( التي يتتساقط منها الشرانق ) بقدار ٥٠ سنتيمتر لكي تسهل عملية انحدار الشرانق على تلك العيدان الأربع وهذا الصندوق مقام على أربع قواعد من الحديد الاماميـان منها مرتفعة عن الخلفيتين . كـا في رسم ٢٠

### كيفية استعمالها

توضع الشرانق المراد تنظيفها في الجهة الامامية ذات الجوانب المرتفعة ثم تدار تلك العجلة ( الطارة ) بـاليد اليمـنى فـتـدار العـيدـان الـارـبع ثـم تـجـذـبـ الشـرـانـق بـالـيد



رسم ( ٢١ ) — طريقة فرز الشرانق :-

اليسرى لـتقـريـبـها إـلـىـ تـلـكـ العـيـدانـ التي تـجـذـبـ جـمـيعـ المـوـادـ الغـرـيـبةـ والـخـيـطـانـ التي تـشـبـهـ القـطـنـ فـيـ لـوـنـهـاـ وـشـكـلـهـاـ مـنـ كـلـ مـاـ عـلـىـ سـطـحـ الشـرـانـقـ حـتـىـ تـصـيرـ الشـرـانـقـ نـظـيفـةـ جـدـأـ ثـمـ تـتـسـاقـطـ فـيـ السـلـةـ الـتـيـ تـوـضـعـ عـنـ نـهـاـيـةـ الـآـلـةـ هـذـاـ الغـرـضـ . كـاـ فيـ رـسـمـ ٢ـ٠ـ

### عملية فرز الشرانق

عملية فرز الشرانق : ثم تبدأ

عملية فرز الشرانق بوضع كل نوع على حدة وهـاـكـ بـيـانـ الـأـنـوـاعـ :-

- ١ - الشرقة اللامعة
- ٢ - الشرقة الملينة الضعيفة
- ٣ - الشرقة ذات العذريتين أو أكثر
- ٤ - الشرقة الملوثة
- ٥ - الشرقة المراد أخذ البذور منها ويجب أن تكون منتفقة خالية من كل العيوب
- ٦ - الشرقة المراد خنق عذريتها لحل خيطها

### فتن العذراء وقتلها

#### الطرق المتبعه


- هناك طرق ثلاثة لقتل العذراء داخل الشرقة وهي :-
- ١ - قتلها بعرضها للشمس
  - ٢ - قتلها بالبخار
  - ٣ - قتلها بالهواء الجاف

### طريق فتنها أو قتلها بالشمس

هي مسألة بسيطة جداً يكتفى فيها بوضع الشرائق بعد عملية الفرز في الشمس على حصر أو نحوها مدة ثلاثة ساعات في اليوم ما بين الساعة العاشرة صباحاً والساعة الواحدة والنصف مساءً ) وتكرر هذه العملية يومين أو ثلاثة اذا كانت حرارة الشمس قوية ، وتطول المدة اذا كانت حرارة الشمس ضعيفة ، ثم تجمع وتوضع داخل حجرة حفظاً لها من اصابتها بالرطوبة الجوية . وللتتأكد من أن العذراء أيدت يحسن فتح عدة شرائق حتى اذا كانت كلها قد ايدت فانها تجمع وتوضع في اماكن جافة هاوية حتى يأتي وقت الحاجة اليها . انظر رسم ٢٢



رسم ( ٢٢ ) — كيفية خنق العذراء بالشمس




رسم ( ٢٣ ) — آلة خنق العذراء بالبخار  
وهي مفتوحة لوضع الشرانق

### الطريقة الثانية لقتارها بالبخار


هناك طريقة بسيطة وهي وضع  
الشرانق في وعاء به جملة ثقوب  
بحيث لا يزيد عمقه عن عشرة  
سنتيمترات ويوضع هذا الوعاء على  
انا مملوء ماء ساخن بحيث لا تقل  
درجة حرارته عن ٦٠ سنتيجراد ،  
ولحفظ هذه الدرجة يجب أن يوضع  
الأناء على النار

ثم توجد أجهزة خاصة لقتل  
العذراء بالبخار كا هو مبين بالشكل



ويكفي لقتل العذراء مدة  
نصف ساعة على الأكثـر ثم  
تستخرج الشرافق بعد ذلك وتنشر  
على أكياس أو حصر بحيث لا يزيد  
سماك طبقة الشرافق على ثلاثة  
سنتيمترات وذلك كي تجف من  
البخار، ويجب أن يكون وضعها  
في مكان ظليل، وتكرر هذه العملية  
يومياً حتى تجف تماماً، و تستغرق  
هذه العملية نحو شهر ونصف تقريباً  
إلى شهرين

رسم ( ٢٣ ) — ب — إلة خنق العذراء بالبخار  
وهي مقلوبة بعد وضع الشرافق بداخلها



رسم ( ٢٤ ) — طريقة خنق العذراء بالهواء الجاف

### الطريقة الثالثة لقتلها بالهواء السام

توجد عدة أجهزة خاصة لذلك فتوضع الشرائط في أدراج وهناك مروحة تدور إما بالبخار أو بالكهرباء لتوليد تيار هواء يمر من الانبوبة داخل فرن درجة حرارته من ٨٠ إلى ١٠٠ سنتيمترات متصلة بذلك الأدراج فإذا مر الهواء داخل هذه الانبوبة سخن وارتقت درجة حرارته إلى درجة حرارة الفرن، ثم ينتهي الهواء بالأدراج التي توجد بها الشرائط فتقتل العذراء في زمن لا يتجاوز خمسة دقائق . ويتكلف هذا الجهاز أكثر من الأجهزة الأخرى غير أنه أكثر اسراعاً في العمل وتوفيراً للوقت وأكثر نظافة إذ يمكن خنق العذراء التي تقتل بهذه الأجهزة في مدة قصيرة دون أن تصاب بأى ضرر كما يحدث في الشرائط التي تقتل عذراوها بالبخار .

### الارتفاع بالشرقة

ينقسم الارتفاع بالشرقة إلى قسمين :

- ١ — للحصول على حريرها
- ٢ — للحصول على بوبيضات دودة القرز

### ١ — للحصول على حريرها

الغرض الأول من الشرقة هو الحصول على حريرها للارتفاع بها ولذلك يجب قطفها (جمع الشرائط) في نهاية الأسبوع الأول من نسج دودة القرز خيطانها أي بعد مضي عشرة أيام تقريباً من تاريخ صعودها على التعشيشة ثم تنظف بواسطة آلة التنظيف التي سبق الكلام عليها ثم تفرز الشرائط بالطريقة المتقدمة ثم تخنق عذراوها بأحدى الحالات التي تقدم ذكرها ثم تباع الشرائط أو تحمل بواسطة آلة حل الشرائط التي سيأتي الكلام عليها .

### نَكْوَبَنِ الْحَرِيرِ

الحرير يتكون من المادة السائلة التي تفرزها الديدان في نهاية حياتها (في نهاية العمر الخامس) بعد أن تصعد على التعيشية وذلك من الغذتين الحريريتين الموجودتين بداخل الدودة احداهما في الجهة اليمنى والثانية في الجهة اليسرى ، وهذه المادة السائلة بمجرد خروجها من فم الدودة ولامستها للهواء تجمد فت تكون الخيطان الحريري المعروفة

### مَرْكِبُ الْخَيْطِ الْحَرِيرِ

يتركب الخيط الحريري من مادة ليفية وتسمي فيروين بنسبة ٧٠٪ / وهذه المادة مغطاة بطبقة صبغية وتسمي ( سيرسين أو زلال الحرير ) بنسبة ٣٠٪ / وهذه الطبقة الصبغية تظهر لنا في الحرير ملونة بألوان مختلفة فتارة يكون ذهبياً وطوراً يكون أصفر وثالث يكون أبيض .


ويمكن ذوبان المادة الصبغية بواسطة الماء المثلث أو بحلول قلوي خفيف كما انه يمكن ترسيبها بواسطة الكحول . أما المادة الليفية فلا يذيبها الماء المثلث ولا الاهاض ولا القلويات الضعيفة . أما الألوان التي تظهر بها خيطان الحرير وهي الموجودة في المادة الصبغية فهي عبارة عن كاوروفين النبات الأخضر بعد حصول بعض تحويلات بسيطة فيه وكذلك بعد اخراج العنصر الأزرق منه .

### هُلِّ السُّرَانُقُ

توجد عدة آلات لحل الشرانق وأفضلها الآن الحديثة الموجودة بوزارة الزراعة ( كالرسم المبين بعد ) ٢٥ و ٢٦

وهي مركبة من حوض من الزهر وقد يكسي بالصيني ، يحتوى على وعاء لطبع الشرانق وبه جزء خاص لوضع الشرانق بعد طبعها ، ومثبت به عدة ( جيت بوأى آلة تلقط الفتلة ) أربعة أو ستة أو ثانية حسب كبر وصغر الآلة ( كالمبين بالرسم ) وبقرب من كل جيت بوبكرة صغيرة تقابلها وفوق كل جيت بوبكرة ثانية تبعد عنه بسحو ثلاثة أرباع متر يقابلها بكرة صغيرة على خط افقي تبعد عنها بسحو نصف متر .

ثانيًا - دولاب من الخشب والزجاج ومثبت على أربعة قوائم حديدية وله جوانب وغطاء، وداخله دولاب أو عدة دواوين من الحديد والخشب تدور كالعجل وبه




رسم ( ٢٥ ) — آلة حل الشرائط التي تدار بالبخار والكهرباء

زجاجات ملتوية كرسم الحرف **S** نفرييًّا عددها بعدد الجيت بو الموجودة في الآلة وتسمى الزجاجة بالمكوك وعملها تنظيم (تفرييد وتوزيع الفتل على الدواوين بأبعاد متناظمة) ويوجد فوق الدولاب الخشب في آلة الخل الصغيرة خزان المياه الباردة اللازم للعمل كالرسم ( ٢٦ ) وأيضاً يوجد بجانب الحوض السالف الذكر محل لاوقد (غاز أو فحم أو خشب أو غير ذلك) الذي يستعمل لتسخين المياه لطيخ الشرائط. أما الآلات الكبيرة فتتألف لها المياه الباردة من الموسير العمومية بواسطة حنفيات مثبتة في الحوض وتسخن لها المياه بواسطة البخار الآتي من غلاية خاصة لذلك .

### كيفية حل الشرائق

كيفية حل الشرائق : توضع الشرائق في وعاء الطبخ الذي به ماء مغلي أما بالبخار كالموجود بالآلة الخل الكبيرة الآلية المذكورة (شكل ٢٥) أو الفحم أو الخشب

أو المحطب كما في الآلة الصغيرة (شكل ٢٦) ثم تحرك الشرائق تحريراً كالطيفاً حتى يتم طبخها ثم توضع الفرشة فوق الشرائق وتحريك بقدر دقة أو اثنين بفرشة يد أو بفرشة أوتوماتيكية (كالمبين بالرسم المتقدم في الآلة الكبيرة من جهة اليسار) فيتعاقب بالفرشة أطراف الشرائق مع ما على سطح الشرائق فيمسك العامل يده ويستمر في جذبها حتى ترى أن أطراف فتل الشرائق قد زال كل ما علق بها من الحرير الزائد المعلق بظاهر



رسم (٢٦) — آلة حل الشرائق التي تدار باليد

الشرائق المسمى (ديشيه) وحينئذ يسهل أخذ طرف فتل الشرقة المنتظم . ثم يفصل الديشيه من الشرائق بواسطة مقص وتحمل الشرائق بواسطة مصفاة ييد وتوضع في الحوض المعد لها وترتبط أطراف فتل الشرائق في سمار خاص لذلك . فيتسامها العامل القائم بعملية الخل ويكون الفتل إما من خمسة شرائق أو من عشرة أو من اثني عشرة شرقة حسب العيار المطلوب للنسج أو للبيع . ثم يقدمها (لبيت بو) بواسطة سلاك

رفيع يدخله في ثقب الجيت بو فتعلق الفتلة به (فتوخذ الفتلة) ويرفع السلاك الى أعلى وتوخذ الفتلة وتوضع فوق البكرة الثانية العليا ثم تجذب الى اسفل ثم تمر من تحت البكرة الأولى فتصنع الفتلة مثلكما ، فيلف طرفها على الصاع الأول المقابل للعامل القائم بعملية الحل نحو خمسة عشر مرّة الى ٣٠ مرّة (والغرض من لفها هذه اللفات نثر المياه العالقة بالفتلة ولتكون الفتلة مبرومة) ثم توضع الفتلة فوق البكرة الثالثة وتمر من الزجاجة (المكوك) وترتبط بالدولاب وتدار الآلة فتدور الدواليب .

كيفية ادارة الآلة : تدار الآلة الصغيرة باليد بواسطة عامل أما الآلة الكبيرة فتدار بطريقة ميكانيكية اما بالبخار او بالتيار الكهربائي .

الوقت المناسب لبيع السرائر

بعد	ا	ایام	بعد	کیلو	ا	ایام	کیلو	بعد
۲	»	۹۵,۲	»	۷	»	۹۸,۲	»	۹۶
۳	»	۹۳,۳	»	۸	»	۹۷,۵	»	۹۷
۴	»	۹۳,۴	»	۹	»	۹۷	»	۹۲
۵	»	۹۲,۵	»	۱۰	»	۹۶,۶	»	۹۶

وزن الشرائق وعدها : يختلف وزن الشرائق باختلاف أجنباسها فمنها ما يحتاج وزن الكيلو جرام الى ٦٠٠ شرقة ومنها ما يحتاج الى ٤٠٠ شرقة كالبغدادي مثلاً

ومنها ما يحتاج الكيلو الى ٨٠٠ شرتقة كالبابي، وعلى العموم فوزن الشرتقة المتوسطة الحجم لا تقل عن ٥٢ الى ٣ جرام

شرائق الذكر والانثى : ذات التجارب على ان شرتقة الذكر تحتوى على حرير بنسبة ١٤ الى ١٦ في المائة والانثى تحتوى على حرير بنسبة ١١ الى ١٣ في المائة واذا تساوى وزن كميتين من شرائق الذكر والانثى بصرف النظر عن العدد فيكون الاول اكثراً حريراً، أما اذا تساوى عدد الشرائق بصرف النظر عن الوزن ف تكون الانثى اكثراً حريراً .

الشرائق بعذرائها : تتركب المائة كيلو جرام من الشرائق المتوسطة الحجم قبل قتل عذرائها من جنس « ميلان » حسب تجارب العلامة داندلو كما بالجدول الآتى

٢٠٠	كيلو عذراء
٤٥٠	كيلو أغشيتها
٣٥٠	كيلو حرير
٠٠٠	ر

### الغرصه الثاني من السرنقة

٢ - للاحصل على بوبيضات دودة القرز

توجد طريقتان للحصول على بوبيضات دودة القرز وهى :

ا - جعل الشرائق على شكل سبع متديلة وكذلك بادخال الخيط في الشرائق بواسطة (ابرة)

ب - توضع الشرائق الواحدة فوق الاخرى بطريقة منتظمة محصورة بين قطعتين من سلك الشبك ذو الثقوب الواسعة مقدار سنتيمتر مربع ومحاطة كل قطعة بربعات من جهاتها الاربعة بقطعة من الخشب (على شكل برواز)

ج - بعد مضى أسبوع من جنى المحصول وبعد اجراء عملية تنظيف الشرائق يوثق بالشرائق وتوضع بالحاليتين السالفتين وتترك حتى تحول العذراء التي بداخل الشرقة الى فراشة بداخلها وتخرج منها .

## نحو بل الدودة الى عذراء

يطلق على الدودة بعد نسجها خيطاتها باسبوع تقريباً حسب درجة الحرارة بالعذراء وتسمي عند اللبنانيين ( بالزيز أو الجيز ) فإذا أخذنا شرقة بعد هذه المدة وشققناها نصفين مع الاحتراس ( بالا يمس ما بداخلها ) نرى داخلها الدودة في حالة

سكون منكشة ونرى جسمها ذو حلقات وذو لون أبيض اذا كانت سليمة أما اذا كانت مصابة بمرض البيرين فيشاهد ( اما بالعين المجردة اذا كانت الاصابة شديدة او بالمنظار المعلم اذا كانت الاصابة خفيفة ) نقط سوداء على جسمها ولا يشاهد لها ارجل امامية ولا خلفية تقريباً ولكن الذي يشاهد ويلفت النظر هو وجود تورم في الحلقتين الاولى والثانية من حلقات جسمها وهذا ينبيء بأن هناك اعضاء من اعضاء جسمها يظهر قريباً وهو « الاجنحة » وبما انه حصل تغيرات في اعضاء جسمها الخارجية اثناء وجودها داخل الشرقة فبطبيعة الحال


رسم ( ٢٧ ) — العذراء

يمحصل كذلك تغيرات في اعضاء جسمها الداخلي ولنضرب مثلاً لذلك يصغر كل من الجهازين الحريريين ( الغدد الحريرية ) كما انه يقصر الجهاز الهضمي وبعد كل هذه التغيرات السالفة الذكر يشاهد تحت الجلد الخارجي للدودة جلداً آخر أخذ في النمو وهذا يدل على قرب دخولها في حالة جديدة تختلف حالتها السابقة وهذه الحالة هي « العذراء » وهي لا تأكل ولا تشرب ولا تتحرك وتكون على شكل يضيق مستطيل واحد طرف هذا اكبر حجماً من الطرف الثاني كافي الشكل ( ٢٧ )



### كيفية تخلصي العذراء من الجلد الخارجى

ينتفخ جسمها ثم تقطعه ثم يهبط وينكمش مراراً كعملية التنفس عند الانسان وقت استنشاقه الهواء، فتنتفخ الرئتان وتعملاً البطن وعند خروج التنفس تهبط هذه الرئة والبطن ) حتى ينسالح الجسم من الغثاء، ويبيق الجسم محصوراً بالجزء الامامي من الجلد وتستمر عملية الانتفاخ والهبوط والانكماش الى أن يصبح الجسم خالياً من كل التصاق كالرسم ( ٢٨ ) ثم تشقه من الحلف وتدفعه الى الوراء على شكل كيس صغير



رسم ( ٢٨ ) — تخرج العذراء

أ — القناة الظاهرية أو مجرى الدم ب — الحصبة الشمالية ج — الكيس المعدوى د — الكيس الاعور ه — السلة المصبية و — أنابيب البول

ويشاهد عليه فتحات «قوّات» التنفس أي الاستججاتات التي عددها ١٢ اثناعشر وأجزاء الجمجمة والفم وفي هذه الحالة يكون جسم العذراء بين الملامس مبلولاً يائعاً ذو لون أصفر فاتح، وإذا تأملت الى نبضها تجد تارة يضرب الى الامام وأخرى للوراء ولا يمضى بضعة ساعات على البولولة حتى يجف هذا المانع عن جسم العذراء ويصدر سميكاً ذو لون نحاسي، ويلاحظ أيضاً أن الجزء الأعلى من جسم العذراء لا يتحرك ويرجع السبب في ذلك الى سماكة القشرة وهذا يعكس الجزء الأسفل منها فتراه يتحرك ذات اليمين وذات اليسار وذلك عند لمسه «لمس العذراء» أو معاكستها، وترى انها مركبة من عدة حلقات ويمكن رؤيتها تولد القرون ( قرون الاستشعار ) والارجل الصدرية والاجنحة من جانبي الحلقات الثلاثة الاول وهي (الحلقات الصدرية) على سطحها وخصوصاً بمحاري التنفس فإنه يمكن رؤيتها بدون أي مجھود .

### نحويل العذراء الى الفرات

بعد مضى اسبوع تقريراً حسب درجة الحرارة من تكامل العذراء تبدأ هذه (اي العذراء) في عمليات تحويلات جديدة لكي تتحول الى فراشة وهذه التحويلات عظيمة جداً فيذوب منها الأنسجة الشحمية والأغشية والقصبات وكل العضلات الى أن تصبح جميع أحشائها مائعة ثم ينشأ من هذا المائع شحم وأغشية وعضلات وقصبات جديدة مختلفة في تركيمها الأولى حيث يتكون جسم الفراشة من هذه الوسائل والتغيرات الحيوية الجديدة وأول ما يظهر من أجزاء الفراشة من نتيجة هذه التغيرات هو الرأس والصدر ثم يحصل في باقي الأجزاء الباطنية تغيرات أيضاً ثم توجد أجزاء صدر الفراشة ابتداء من الحلقة الرابعة حتى السادسة وفي بعض الأحيان حتى أوائل الحلقة السابعة مخفية تحت الأجنحة وفي الجزء العلوي من العذراء ويرى جزء من جسمها مسطحة أليس اللون متصل بالرأس وعلى الجوانب ترى الأعين وباقى أعضاء الرأس كما ان العذراء تصبح على شكل كيس يضى، أما المريء فيبقى بشكل أنبوبة مستطيلة ويتولد على جانبه غدة صغيرة تحتوى على مادة سائلة تفرزها الفراشة وقت خروجها من الشرنقة لكي تساعدها على تقطيع خيوطها الحريرية.

أما أمعاء العذراء فهي عبارة عن جزئين الأول قناة طولية تلتقي بالأنبوبتين اللتين تنتهي بهما مجاري البول وعدهما ستة، والثانى على شكل كيس مخروط وهو عبارة عن الأعور يحتوى على المواد البرازية أما حجم الغدد المعاية فتصغر كما ان غدى الحرير تجف من السائل الموجود بهما ويقيان في الجهتين اليمنى واليسرى بشكل كيس أحمر اللون وأما القصبات فينذر بعضها ويقع البعض الآخر، وبطبيعة الحال كما تقدمت العذراء في السن تتحول الى فراشة وتتواءم أعضاء التناسل حتى تكمل قبل خروجها في شكل فراشة وتنظم الحركة الدموية فتتولد بعد ذلك عضلات الفراشة الجديدة مع القصبات الحديثة وبعد ذلك تكون الفراشة وتتكامل وتبقى بهذه الحالة حتى يأتي الزمن الذى ينشق فيه الجلد وتخرج الى الوجود بحالة فراشة كاملة بداخل الشرنقة.


### تنفس العذراء

تنفس العذراء داخل الشرتقة وهي حسارة جداً بدرجة أنها تشعر بالحرارة والبرودة وما يدل على تنفيمها وجود القصبات الهوائية الموجودة فيها المعدة بعملية التنفس، وإذا أردت أن تتحقق من هذا ضع العذراء في كوب به مملوئة نصفها بالماء مدة ساعة تقريباً تجد أن بعض الفقاعات تصاعد على سطح الماء ويشاهد أن هذه الفقاعات تخرج من أفواه القصبات الهوائية «فتحات الاستجابات» وأشد أجزاء العذراء تنفساً هو الجزء السميك الذي جهة الرأس والصدر وهي تنفس أكثر مما كانت دودة لذلك يجب صف الشرانق على شكل سبع الواحدة فوق الأخرى بواسطة خيطان وتعليقها في محلات فسيحة طلقة الهواء ولا ترك أكواناً على بعضها وهناك طريقة أخرى للتأكد من شدة احتياج العذراء إلى التنفس وهي الطريقة التي تستعمل في إثبات نفس النبات وهي أن يوضع أكثر من عذراء في أنبوبة من الزجاج مفتوح أحد طرفيها ثم تسدها سداً محكمأً بصمام من المطاط فترى بعد مضي بضعة ساعات بعض البخار على جدران الأنبوة. وهو نتيجة التنفس

سبق أن قلنا أن العذراء تتأثر وتشعر بالبرودة والحرارة لذلك تقول هنا أن الحرارة الخارجية تأثير مهم بحيث لو وضعت الشرانق الحية بعد جمعها بنحو أسبوع تقريباً تحت درجة  $30 - 35^{\circ}$  سنتيجراد مع وجود قليل من الرطوبة فإن الفراشة تخرج في ظرف خمسة عشر يوماً وإذا وضعت الشرانق تحت درجة  $20 - 25^{\circ}$  سنتيجراد مع قليل من الرطوبة فإن الفراش يخرج في ظرف  $18 - 20$  يوماً وبذلك يفهم أن كل ما كانت الشرانق موضوعة في محلات درجة حرارتها مرتفعة بعد جمعها بأسبوع كلما كانت المدة التي تستغرقها الفراشة الخروج أقل وكلما كانت درجة الحرارة منخفضة كلما زادت المدة التي تستغرقها الفراشة الخروج من الشرتقة وقد دلت التجارب على أن العذراء يمكنها أن تمر سنتة كاملة وهو في حالة عذراء داخل الشرتقة إذا وضعت هذه في محلات درجة حرارتها منخفضة لدرجة  $2^{\circ}$  سنتيجراد فوق الصفر.

### كيفية هروب الفراشة من الشرقة

بعد مضي بضعة أيام من تاريخ وضع الشرائق بالحالتين السابقتين ( انظر صفة ٦٤ - ب ) تحول العذراء إلى فراشة ( وقد سبق الكلام عليها في صحيفة ٦٥ ) داخل الشرقة ثم تجتهد في تقطيع طبقات الخيطان التي داخل الشرقة حتى إذا ما لحق رأس الفراشة جدار الشرقة المحيط بها أفرزت بعض نقط من المائع القلوى الموجود بعدها فيحصل شبه ارتخاء وذبول في خيطان الحرير ; ويساعد على تقطيع




رسم ( ٢٩ ) — الفراشات تقب الشرائق لتخريج منها

هذه الخيطان استعمال قرون الفراشة لتلك الخيوط حيث تنقلها ذات العين وذات اليسار ثم تستمر على هذه الحالة حتى تفتح لها مخرجاً وتخرج من الشرقة برأسها ثم صدرها وبطنها حتى آخر جسمها ، وفي هذه الحالة تكون منهوكه القوى من الجهد الذى أبدته وقت خروجها من الشرقة ، ثم تكون مبللة الجسم ناعمة الملمس وأجنحتها قصيرة ومدللة فلا يضى عليها ساعة من الزمن حتى يجف جسمها ويترعرع زغبها الذى على جسمها وتشتد أجنحتها فتبسطها ، وبالجملة تستعيض قواها وينجرى فيها النشاط ومتى جرى النشاط فى الفراشة فإذا كانت ذكرًا رفرف بأجنحته والتوى حول نفسه بهؤخر جسمه ذات العين وذات اليسار باحثًا عن الانشى لاجراء عملية التلقیح .




رسم (٣٠) — ١ — الذكر



رسم (٣٠) — ب — أعضاء الذكر  
١ — القضيب ٢ — قناتة فرز المني ٣ — جراب في المثانة مبوي  
٤ — ثنوات التدفق ٥ — الخصيتيين



رسم ( ٣١ ) — ١ — الالاتي



رسم ( ٣١ ) — ب — أعضاء التأثير


- ١ — قنوات المبيض
- ٢ — الكيس الاعور
- ٣ — المبيض
- ٤ — كيس التناقيح
- ٥ — كيس تابع
- ٦ — قناة معاوية
- ٧ — الغدد التي تفرز مادة لزجة لتكلسي البویضات عند خروجهما من انتی الفراشة

### التلقيح وكيفية

التلقيح هو اختلاط الذكر مع الأنثى كما في الرسم ٣٢ ويقيان على هذا الشكل ملتصقين مع بعضهما نحو ١٢ ساعة وقد دلت التجارب على انه يكفي لعملية التلقيح

٦ ساعات فقط ويمكن للذكر أن يلقيح أكثر من أنثى بمحبت لا تتعدي ثلاثة أو أربع على الأكثرب، وبعد اجراء عملية التلقيح ينفصلان عن بعضهما، ثم بعد ساعات معدودة تبتدىء الأنثى في وضع بيضها وبعد وضعه بأيام قليلة يموت الفراش ذكر كان أو أنثى.

رسم ( ٣٢ ) — الانثى والذكر في حالة تلقيح



رسم ( ٣٣ ) — الانثى وهي تضع بيضاتها

ملحوظة : يمكن للأنثى ان تضع من ٢٠٠ - ٨٠٠ بيضة


### كيفية وضع الفراشة بيضرها

والطرق المجدية لأخذ البوبيضات السليمة بطريقة باستور من الأمور المهمة في تربية دودة القرز هي مسألة العناية التامة بعملية التبذر وسلامتها من الأمراض الوراثية أو من أي علة أخرى لأن الأمراض الوراثية والصفات الريثية أو الجيدة تنتقل في جميع أطوار حياة الدودة بطريق الوراثة فمن هنا يظهر ما لعملية التبذر من الأهمية ولذلك قد قام العالم الشهير باستور وهو الذي

اكتشف هذا المرض واكتشف طريقة لمعرفة سلامة البذور من عدم سلامتها وهي كالتالي :

#### الطريقة الأولى

بعد عملية التلقيح توضع أنثى الفراشة في كيس صغير من الورق المتشوب أو القماش الرقيق أو الشاش وبعد أن تضع يضمها داخل هذا الكيس تفحص الفراشة خصاً (ميكروسكوبياً) فإذا ثبتت الفحص سلامة الفراشة من الأمراض الوراثية تحفظ بوبيضاتها داخل الكيس وإذا كانت الفراشة مصابة (بكورسكتول) أي بالمرض فيعدم البيض والفراشة بحرقها .



رسم (٣٤) — عملية التبذر بطريقة الأكياس

#### الطريقة الثانية (طريقة الانفاع)

وتوجد طريقة أخرى على قاعدة باستور وهي : بعد عملية التلقيح توضع أنثى الفراشة تحت اقاع مصنوعة من الزنك على شكل مخروط مفتوح ليس له قاعدة بحيث

تكون النتيجة العليا كافية لادخال وتجديد الهواء، أما القاعدة الثانية ف تكون طول نصف قطر دائريها ٢٥ سنتيمتراً . كالرسم رقم ٣٥



رسم ( ٣٥ ) — عملية التبخير بواسطة الاقاع

وهذه الأقاع تكون مرصوصة على طولات مصنوعة من الخشب طولها متر وعرضها من ٥٠ - ٧٠ سنتيمتر، وهذه الطولات مفروشة بالورق العادي لكي تضع الفراشات بويضاتها عليها حتى يسهل فصلها عن الورق ، وعندما تبيض الفراشة وتضع بويضتها بأي جسم يلمسه حيث أن بويضاتها محاطة بادة صناعية . وقد يوجد بعض أنواع لا تحيط هذه المادة ببويضاتها كذور دودة الفز البغدادي ولذلك يجب الاحتراس وقت عملية وضع الفراشة على هذه البويلات من الضياع وعليه يجب وضع مثل هذا النوع في أكياس حتى تفحص الانثى بالميكروسكوب

#### طريقة فصل البذور الملقحة

يؤتى بالورق الذي عليه بويضات دودة القرف في حالة التصاقه ويوضع في محلات هاوية نظيفة حتى يمداد عملياً بفصل البذور عن الورق الملتصق بها وتوضع هذه الأوراق في حوض عمقه ٣٠ - ٢٥ سنتيمتراً مملوءاً بالماء النظيف وتترك لمدة خمس أو عشر دقائق ثم يؤتى بسكين غير حادة مطلقاً وقطع من النشاف ، وبعد استحضار

هذه الأدوات يستخرج من الحوض الذى به الأوراق أو الأقشة التى عليها البذور (بويضات الدودة) وتوضع فوق منضدة ويمسك العامل السكين يده اليمنى وتكشط البذور كشطاً خفيفاً عن الورق أو القماش حتى تفصل البويضات تماماً ، وتكرر هذه



رسم (٣٦) — عملية التبيير على شكل سبع علبية ٢٥ جراماً أو ثلاثة على تلفم الشرانق على شكل سبع بحيث ان الفتلة والابرة المستعملة في لفم الشرانق لا تمس العذراء من الداخل الاكثر ولكن الاكثر استعمالاً (انظر صحيفه ٦٤ — ١) (ورسم ٢٩ بصحيفه ٦٩ هو ٢٥ جراماً فقط و therein هذه العلبة

يتراوح ما بين ثلاثة وأربعين قرشاً على الاكثر بما فيها المصاريف حتى حضورها الى القطر المصرى اذا وردت لنا من الخارج .

ملحوظة : هذه العملية (عملية فصل البذور) لا يبدأ بها الا في الشهر الثاني.

او الثالث من تاريخ وضع الغراشات ايضاً حتى الشهر السابع فقط

العملية في باق القطع التي عليها البويضات حتى تنتهي ثم تغسل بعد ذلك البويضات المتجمعة بعد فصلها مراراً حتى تصبح نظيفة من كل لصق بها .

بعد عملية الغسيل تنشر البذور على ورق النشاف في محلات يتجدد هواؤها بحيث لا توضع في تيار هواء وترك حتى تجف تماماً ثم يؤتى بالعلب المقوبة التي سبق الكلام عليها في الدور الاول من حياة الدودة بحيث توضع في كل

### النفثة

كلة تطلق على وضع هذه العلب المحتوية على بذور الدود في جهات تكون درجة حرارتها منخفضة بدرجة ٩ سنتيجراد فوق الصفر وهذه العملية لها أهمية عظيمة في تكوين الجذين وتأخير الفقس حتى يعاد خروج أوراق التوت، ففي فرنسا بعد انتهاء عملية التبذر ووضع البوopies في هذه العلب المتشوبة يرسلونها إلى أعلى جبال فرنسا مثل جبال الألب - حتى شهر فبراير تقريباً - وأحياناً حتى شهر مارس ثم يستحضرونها ويستعدون لعملية الموسم الجديد.

### أمراض الروحة

لدوحة القز عدة أمراض معروفة تعتريها في جسمها سنذكراها بعد فئها ما يصيبها لطارىء من الطوارىء كقلة الاعتناء بالنظافة ورداءة الغذاء أو تكون أوراق التوت ملوثة بالأتربة أو مبتلة بماء الندى أو بالماء المتاخر من كثرة الاوراق على بعضها الى غير ذلك كما سيبين بعد :

ومن الامراض


ما يكون وراثياً أو يكون  
كامناً في البويبة

وعند فقسها يظهر على  
جسمها في الاعمار

الثالثة الاخيرة، وإذا  
قاومت الدودة هذا

المرض في أطوارها  
وهي في حالة يرققة فظهور

وهي عذراء أو بعد




رم (٢٧) — المرض في البيض تحت المicroscope



( دم ( ٣٨ ) ) اصابة بالمرض المسمى البيرن  
الغدد الحريرية وهي في حالة

أن تتحول الى فراشة، وهكذا يكون هذا  
المرض في جميع أطوار حياتها وسيأتي الكلام  
عليه، وهذا من أخطر الامراض التي تصيب  
دودة القرز ولذلك وجب انتباه المريضين  
ويقطفهم أشد اليقظة لئلا يتبدلون خسائر  
فادحة وتضيع ثرة أتعابهم .  
وكما أن لدودة القرز أمراضًا فلهـا  
أعداء طبيعية أيضًا كالعصفافير ، والفيران  
والملـ .



دم ( ٣٩ ) — قطاع من الغدد الحريرية المصابة بالبيرن

### أَهْمَمُ الْإِصْرَافِيَّ الَّتِي تُصَبِّبُ الْبَرِّارَه

أولاً - مرض البرين : أي الفلفل وقد سمى بهذا الاسم نسبة الى البقع التي تظهر على جسم الدودة من الخارج بلون الفلفل .

وهذا المرض من أشد الامراض خطورة ووخيماً العاقبة اذا لم يكن المربى على علم منه حتى يفصل المصاب من الديدان ويحرقه أولاً فانياً لانه سريع الانتشار بالعدوى وينتشر بالوراثة ولذلك سمى مرض وراثي .



رسم (٤٠) — ظهور المرض على الديدان

### تَأْثِيرُ هَذَا الدَّاءِ عَلَى الْبَرِّقَه

ان هذا الداء خطير على البرقة يعيثها لا سيما في الطور الثالث أو الرابع أو الخامس لأن وطأته شديدة الخطورة في الأطوار الثلاثة الأخيرة من حياتها أي قبل أن تصير شرققة ، هذا اذا كانت الديدان مصابة وهي في حالة جنين داخل البوية ، أما اذا أصيبت البرقة وهي في العمر الخامس بطريق العدوى فانها لا تموت بل يمكنها مقاومة هذا الداء وتضع شرققتها (نسيجها) ولكن المرض يبقى فيها عندما تحول الى عذراء ثم فراشة ، وعند التبذر يبقى المرض كامناً في البوية ، ومن علامات هذا المرض أيضاً ارتجاع الدودة وقد شهيتها وعدم نموها بسرعة .

### الوقاية

١ - بتجنب تهوية محلات التربية من وقت لآخر .

٢ - نظافة الاغذيـة

٣ - عزل البرقات التي تظهر عليها علامات المرض وحرقها

٤ - تعفير أدوات التربية بعد وقبل ابتداء الموسم وذلك بغسل الادوات غسلياً جيداً وتركها في مياه الترعرع ونحوها مدة أسبوع ورش حجرة التربية بالجير .

### الفهرس

ثانية - الفلاشرى : هذا المرض معدى أيضاً وينتقل بالعدوى لكنه ليس وراثي

### أسباب المرض

- ١ - عدم تهوية أماكن التربية ٢ - تراكم الديدان على بعضها ٣ - عدم خفض درجة الحرارة ٤ - شدة الحرارة ٥ - شدة البرودة ٦ - رياح الخاسين ٧ - البرودة بعد الحرارة ٨ - تغذية الديدان بأوراق ملوثة بالازربة أو مبللة بمياه الندى أو مبللة بسبب التبخر الناتج من كثرة تراكم الأوراق على بعضها

### الوقاية

تتخذ الاحرامات التي تعمل في البيرين

### اعراض الفلاشرى

ينتشر هذا المرض عادة عند قرب نسجها خيطانها أى في العمر الرابع والخامس فتظهر في هذا الزمن بظهور الحمولة وتترك الغذاء وتصير مرنة ثم تموت وتكون ذو رائحة كريهة جداً، وفي بعض الاوقات يمكن للدودة مقاومة هذا المرض حتى وقت الصعود ثم تخور قواها فتكون رأسها تحت ومتناسكة بأرجلها الخلفية وجسمها يكون في حالة مرونة جداً ثم لا تثبت وفتقاً قليلاً حتى تموت، وتفرز مادة سائلة عفنة ثم يسود جسمها.

ثالثاً - مرض الانفاس او الاستسقا او المرض الشحري وهذا المرض قليل الانتشار، وقد لاحظت انه منتشر كثيراً في محلات التربية بالقطار المصرى وسببه شدة الحرارة التي تساعد على تبخر مياه الأوراق التي تعطى كفداء للديدان، فتنفسن اليرقة ويصفر طونها وتقل شهيتها وغلوها وينكش جسمها ولا تنمو غلوها الطبيعي وتنتفع عن الاكل ثم تموت

### المراجع

يجب عزلها في مكان آخر بعيد عن السليم من اليرقات

### المسكردين

رابعاً - مرض المسكردين هذا المرض ليس من الامراض المعدية في حالة حياة

الدودة المصابة به ولذلك فأن الدودة الحية المصابة بهذا المرض لا تعدى زمامتها اما بعد موتها فانها تعدى اليرقات التي بجانبها وهذا المرض مرض فطري . ويسمى هذا المرض عند السورين بمرض القرص الاحمر او الايض ، واليرقة بعد موتها يوضع ساعات يصير جسمها نحاسى ذو لون وردي قليلاً سريع الانكسار ، وبعد موتها بنحو اربع وعشرين ساعة تقريباً يحيط جسمها بطبيعة من غبار سائل الى البياض . واذا فرض وتمكنت اليرقة من غزل نسيجها وكانت شرنقته فلا بد وأن تموت داخلها بعد أن تتطوى على نفسها ثم تتصلب قبل أن تتحرك الى عذراء ، ويمكن معرفة ذلك برج الشرنقة فيشعر الانسان بأن حضا داخل الشرنقة .

وهذا المرض يصيب الدودة في جميع أطوارها وبالاكثر في الثلاثة أطوار الاخيرة من حياة اليرقة اي في العمر الثالث والرابع والخامس .

### الوقاية والعلاج

قد يوجد لهذا المرض علاج وهو علاج واق وذلك بتخمير حجرة التربة بمحامض الكبريتى فإنه يقتل جراثيم هذا الداء .



رسم (٤١) — أعداء الشرائق

### اعماد الدبرانه والشرائق

يوجد للديدان أعداء كما يوجد لباقي المخلوقات على اختلاف أنواعها وأجناسها ، فنها الطيور كالعصافير والحيوانات كالفيران والحيشات كالملل وهذا الاخير ألد اعدائها ، فإذا تسلط على محل التربية يميته عن آخره ، وإذا تسلط على الشرائق أفسدها بالثقوب التي يحدثها فيها – فالحذر كل الحذر من هذه الأعداء وبالاخص الأخير ولذلك توجد طرق كثيرة للاوقاية من هذه الطيور والحيوانات والحيشات المضرة باليرقات ( انظر الى أدوات التربية ) .

10

نطور طول وعرض المساحة السطحية لرسم الودة أثناء نموها	مساحة المساحة السطحية الذى من عليه الديان ( ٢٥ جرام )	كيلو جرام باليكيلو جرام من ورق التوت جثرة التربة	درجة الحرارة بالستجراد	من الفقس - الصومه الاولى
وزن الغدد الحريرية	طول مدة كل نطور من حياته	متر مكعب	كيلو جرام متر مربع	« الصومه الاولى - الثانية »
أقصى نموها	٦٠	٥	٥٣	٢٢
٧٠	٤	١	٣٢	٢٢
٧٠	٤	١/٢٥	١٩٥	٢٢
٧	٣	٢	٣٦	٢٢
٧	٣	٢٠	٣٦	٢٢
٧	٣	١٥	٣٦	٢٢
٧	٣	١٥	٣٦	٢٢
٧	٣	١	٣٦	٢٢
٧	٣	٢٨	٦٧٥	٢٢
٧	٣	٢/٣	٦٣٤	٢٢
٧	٣	٩٠	٦٣٤	٢٢
٧	٣	٢٣٠	٤٥	٢٢
٧	٣	٥٠	٤٥	٢٢
٦٠	١	١٠/٨	٥٨٤	٢٢

ملحوظة — كلاماً كان محل التربية ودرجة حرارته مرتفعة وجاف كلاماً وجب الاستئثار باعطاء الميدان .

( ٢ )

جدول عملية تساوى الاعمار في الديدان الحديثة الفقس

عدد العلاقات في مدة ٦ أيام							
جملة العلاقات	سادس يوم	خامس يوم	رابع يوم	ثالث يوم	ثاني يوم	اول يوم	ثانية
٢٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤
٢٤	٥	٥	٥	٥	٤	٠	
٢٤	٦	٦	٦	٦	٠	٠	

( ٣ )

جدول يبين علاقة المحصول باتساع المساحات للديدان أثناء التربية

قيمة حبر الشرانق بالتقريب	عدد الشرانق التي تزن كيلو	وزن شرانق علبه	ديدان تربت في مساحات صغيرة كانت النتيجة
١٤٣ او .	٥١٠ شرقة	٤٣ كث جرام	{ ديدان تربت في مساحات صغيرة كانت النتيجة
١٥٦ او .	٤٥٤	٤٨ « «	{ ديدان تربت في مساحات صغيرة ثم أوسع في النهاية
١٥٤ او .	٤٨٠	٦٠ « «	{ ديدان تربت في الابتداء في مساحات واسعة ثم ضيق في النهاية
١٦٠ او .	٤٤٣	٧٠ « «	{ ديدان تربت طول حياته في مساحات واسعة

( ٤ )

### جدول تكوين الشرانق

٪ ١٤ في	حرير . . .
٪ « ٧ و	بقايا جلد . .
٪ « ١٣ و ٨	عدراء . . .
٪ « ٦٨ و ٢	ماء . . .

ملحوظة — التجارب التي عملتها بنفسى فى مسألة الشرانق قبل وبعد التجفيف  
فوجدت غالباً النسب الآتية على حساب عشرة كيلو شرانق :-

( ٥ )

ازالة المواد الصifieية	حرير صافى بعد التجفيف		كمية الحرير المستخرجة الى من	شرانق قبل الحنق	شرانق بعد الحنق
	حرير صافى بعد التجفيف	شرانق قبل الحنق			
١٩٣٤ و ١	١٩١٦	١	٥٣ كيلو	١٠ كيلو	١٠ كيلو
١٣٧٧ و ٠	١٣٤٧	١٩٤١٧	٣٥ و ٣٥	٦ «	٦ «

وعلى كل حال الفرق ناتج من اختلاف في انواع الدود واختلاف في الطقس  
وكذلك في معاملة الديدان من جهة التغذية وأنواع أوراق التوت

ملحوظة — وزن الديدان التي تفتقس من ٢٥ جرام من البوopies (التي عددها  
٣٦ دودة) هي كالتالي :

ديدان وقت الفقس ١٧ جرام

قشر القيس ٥ «

ماء متناهٍ ٣ «

( ٦ )

### جداؤل تحليل ورق التوت لأشهر عاماء دودة القرز

الاستاذ ف. لمبير صحيفة ٥٥٣	الاستاذ وولف	الاستاذ موتزاكوناتسي صحيفة ٢٢٧	
-	٪ ٣٦	-	مغذياً . . .
٪ ٥٤٩	-	٪ ٥٣	ازوت . . .
٪ ١٩	٪ ٢٤	٪ ٥٨	اسيد فوسفوريك
٪ ٣٥	٪ ٧٣	٪ ٢٥	بوتاسي . . .
٪ ٤٩٩	٪ ٩٦	٪ ٣٣	جير . . . . .
	٪ ٦٧		ماء . . . . .

( ٧ )

### جدول وزن ديدان علبة ٢٥ جرام من ابتداء الفقس حتى الصعود

٢٠ جرام	من الفقس الى الصومة الاولى
٤٤ كيلو جرام	من الصومة الاولى الى الصومة الثانية
« « ١٠٨	« الثانية « « الثالثة
« « ٢٥٥	« الثالثة « « الرابعة
« « ٦٥٠	« الرابعة « الصعود

( ٨ )

### ١٠٠ كيلو جرام شرافق

شرافق قبل الختف	حرير صافى	حرير خام	بعد التخفيق
٨٥	١٠٦	٣٤	١٠٠

ملحوظة — متوسط محصول العلبة هو من ٤٥ الى ٥٥ كيلو شرافق بدون تخفيق وقد يصل المحصول الى ٧٥ كيلو جراما في بعض الاحيان

جدول لمعرفة كمية الغذاء الالوئي من ورق التوت لاجل ١٠٠٠ دودة

المجموع	جرام	يوم	المجموع	جرام	يوم
٢٣٤٠٠	٥٠٠	١٧	١٥	١٥	١
٣١١٠٠	٧٠٠	١٨	٤٠	٢٥	٢
٣٩٩٠٠	٨٠٠	١٩	٨٠	٤٠	٣
٤٤٤٠٠	٥٠٠	٢٠	١٠٠	٢٠	٤
٤٤٤٥٠	١٠٠	٢١	١١٠	١٠	٥
٤٤٤٥٠	—	٢٢	١٧٠	٦٠	٦
٥١١٠٠	٦٠٠	٢٣	٢٧٠	١٠٠	٧
٦١١٠٠	١٠٠٠	٣٤	٤٠٠	١٣٠	٨
٢٥٥٠٠	١٥٤٠٠	٢٥	٤٥٠	٥٠	٩
٩٣٣٠٠	١٢٨٠٠	٢٦	٦٠٠	١٥٠	١٠
١٢٢٠٠	٢٢٧٠٠	٢٧	٩٠٠	٣٠٠	١١
١٥٣٣٠٠	٣٣٣٠٠	٢٨	١٢٥٠	٣٥٠	١٢
١٨٣٣٠٠	٣٣٠٠	٢٩	١٤٤٠	٢٠٠	١٣
٢٠٥٥٠	٢٢٢٠٠	٣٠	١٥٥٠	١٠٠	١٤
٢٢٢٠٠	١٥٥٠	٣١	١٥٥٠	—	١٥
٢٣٢٠٠	١٠٠٠	٣٢	١٩٩٠	٣٥٠	١٦



فہرست

صحيفة		صحيفة
آلة التقطيم — فوائد التقطيم التسميد	٢١ ٢٢	صورة صاحب الجلالة فقد الأول ملك مصر
محصول ورق التوت الأشجار ذات الساق الطويل	٢٣ ٢٤	اهداء الكتاب رسم المؤلف في معمل مدرسة تربية دودة القر العليا بفرنسا
الأشجار ذات الساق المتوسط الأشجار عديمة الساق		دودة القر العليا بفرنسا مقدمة
الأمراض التي تصيب شجر التوت	٢٦	
المبحث الثاني	٢٧	المبحث الاول
في تربية دودة القرز أصل موطنها ونارينتها — الحرير	٢٨	في زراعة أشجار التوت — أنواع أشجار التوت
في مصر		التوت الأبيض: أنواعه — التربة
تربيه دودة الحرير في او ربا حياة دودة القر وأدوارها	٢٩ ٣٢	— التوت الأسر
الدور الأول (البيضة — البندرة)		التوت الأحمر الحبسى — اكتثار
لتريح البوبيضة	٣٣	أشجار — الاكتثار بالبذور — كيفية تجهيز البذور
رسم تكوين الحنين	٣٤	اختيار الأرض واعدادها للبذور
تأثير الماء على البوبيضات	٣٥	الحف — الروع والرى
صندوقي الفقس	٣٦	الاكتثار بغير البذور — الوقت
ميعد التفريخ — ضرر استعمال	٣٧	المناسب — اعداد الارض
طرق البلدية		العناية بأشجار التوت
الطريقة الثانية	٣٨	تربيه سيقان الشجرة — التقطيم

صحيفة		صحيفة	
٥٤	جمع المحصول—آلة تنظيف الشرائق	٣٩	الطور الثاني من حياة دودة القر
٥٥	كيفية استعمال آلة تنظيف الشرائق	التغريغ ( ظهور اليرقه )	
٥٦	عملية فرز الشرائق	توزيع الاكلات	
٥٧	حق العذراء وقتلها — طريقة خنقها أو قتلها بالشمس	جدول أدوار وزن التوت اللازم والمدد والمساحات اللازمة لعمله	
٥٨	طريقة خنقها أو قتلها بالشمس	وجدول الستة أيام	
٥٩	الطريقة الثانية لقتلها بالبخار — الطريقة الثالثة لقتلها بالهواء الساخن	كيفية اسلاج الدودة — الاعضاء الخارجية لدودة القر	
٦٠	الانتفاع بالشرفة	أسماء الاجزاء الخارجية لدودة القر	
٦١	تكوين الحرير — تركيب الخيط الحريري — حل الشرائق	تشريح الرأس	
٦٢	آلة حل الشرائق التي تدار بالبخار والكهرباء	تشريح الدودة	
٦٣	كيفية حل الشرائق	الاعضاء الداخلية المهمة للدودة	
٦٤	كيفية ادارة الآلة — الوقت المناسب لبيع الشرائق ووزن الشرائق وعددتها شرائق الذكر والاثي — الشرائق بعد رايتها	اماكن التربية وأدواتها — حجرة التربية—الأدوات الازمة لحجرة التربية	
٦٥	الغرض الثاني من الشرفة	آلة لفرم التوت	
٦٦	تحويل الدودة الى عنراتها	علامات اقتراب وقت حياتها —	
٦٧	كيفية تخلص العذراء من الجلد الخارجي	علامات حياتها بالفعل	
٦٨	تحويل العذراء الى فراشاة	علامات افضلارها بالفعل	
٦٩	تنفس العذراء	الديدان وهي متساوية العمر وجيدة	
	كيفية خروج الفراشاة من الشرفة	— كيفية عمل التعشيشة ومنظف الشرائق	
		بعد اختفاء الدودة بداخلها	
		تنظيف الفرشه (الجزء) — كيفية	
		التنظيف — كيفية عمل العشش —	
		ارشادات ضرورية يجب اتباعها	
		اثناء التربية	

صحيفة		صحيفة
أهم الأمراض التي تصيب الديدان	٧٨	رسم الذكر وأعضاء التذكير
- تأثير هذا الداء على البرقه - الوقاية		رسم الأنثى وأعضاء التأنيث
الفلاثرى - أسباب المرض -	٧٩	التلقيح وكيفيته - رسم الأنثى
الوقاية - أعراض الفلاثرى - العلاج		وهي تضع بوبيضاتها
- المسكرين		كيفية وضع الفراشة يضها وطرق
الوقاية - أعداء الديدان والشرائق	٨٠	الحصول على البيض - الطريقة
جدائل عمومية مهمة	٨١	الأولى - الطريقة الثانية
محصول العلبه من الشرائق	٨٤	طريقة فصل البندور الملتصقة
		التشته - أمراض الدوده

تہذیب النحل

تقدر تربية النحل في جميع المالك الراوية تقديرًا عظيمًا كعلمٍ ورياضةٍ وتسليمةٍ نافعةٍ . وهي جديرةٌ بأن تكون زميلةً ل التربية دودة الفرز في مصر المحتاجة أشدَّ الاحتياج إلى تكوين صناعات زراعية جديدة . وهذا ما حدا بالدكتور احمد زكي ابو شادي إلى إصدار مجلة ( مملكة النحل The Bee Kingdom ) باللغتين العربية والإنجليزية لأداء هذه الخدمة الوطنية فضلاً عن ربط مصر بغيرها من الأمم المهممة بالنحالات العصرية . ولذلك أصبحت هذه المجلة ممala يسقى عنده مزارع عصريٌّ فضلاً عن مكاتب جميع المدارس وخصوصاً الأولية والابتدائية منها ، لا سيما وفيها باب خاص ب التربية دودة الفرز ودواجن النحال .  
بدل الاشتراك السنوي ثلاثة قرشان مصريان ، والإدارة بضاحية المطيرية بمصر ،  
وتتابع المجلة كذلك في المكان الشهير بمصر والخارج .

## جدول يومي لخدمة الدوادل

نهر المورف = التغير في سياق توسيع الماءات  
نهر المورف = التغير في سياق توسيع الماءات نهر المورف  
نهر المورف = ماءات، الماء ولذلك نهر مورف افعى
















PRINCETON UNIVERSITY LIBRARY

THE ABU SHADI  
MEMORIAL LIBRARY

PRESENTED BY

CHARLES A. DANA, JR. '37  
H. H. PRINCE SADRUDDIN AGA KHAN  
COUNCIL ON ISLAMIC AFFAIRS



32101 073545673

(NEC)  
SF542  
.B375  
1930